

PAKKAUSSELOSTE

ALPOXEN 250mg tabletti

ALPOXEN 500mg tabletti

Naprokseeni

Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen.

- Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
- Jos Sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin puoleen.
- Tämä lääke on määrätty Sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heidän oireensa olisivat samat kuin Sinun.
- Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä selosteessa mainittu, tai kokemasi haittavaikutus (ks. kohta 4) on vakava, kerro niistä lääkärillesi tai apteekkiin.

Tässä selosteessa esitetään:

1. Mitä Alpoxen on ja mihin sitä käytetään
2. Ennen kuin otat Alpoxenia
3. Miten Alpoxenia otetaan
4. Mahdolliset haittavaikutukset
5. Alpoxenin säilyttäminen
6. Muuta tietoa

1. MITÄ ALPOXEN ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN

Alpoxen-tablettien vaikuttava aine, naprokseeni kuuluu ns. tulehduskipulääkkeiden ryhmään. Alpoxen-tabletit ehkäisevät ja lievittävät tulehdusta. Tableteilla on myös kipua lievittävä ja kuumetta alentava vaikutus. Alpoxenia käytetään kuumeen, erilaisten särky- sekä kiputilojen hoitoon mm. hammasleikkausten jälkihoitoon ja reumakipujen hoitoon sekä aikuisilla että lapsilla. Alpoxenia käytetään myös selkärankareuman, nivelrikon ja nivelkuluman hoitoon sekä akuuttien tulehdus-, kihtikohtaus- sekä kuukautiskipujen hoitoon. Tabletteja voidaan käyttää myös migreenin ennaltaehkäisyyn sekä kohtauksen hoitoon.

2. ENNEN KUIN OTAT ALPOXENIA

Älä käytä Alpoxenia:

- jos olet allerginen (yliherkkä) naprokseenille tai Alpoxen tabletin jollekin muulle aineelle.
- jos olet yliherkkä asetyylisalisyylihapolle tai muille tulehduskipulääkkeille
- jos sinulla on aktiivinen mahahaava tai pohjukaissuolihaava,
- jos sinulla on aiemmin ollut mahahaava tai pohjukaissuolihaava kahdesti tai useammin,
- jos olet saanut ruuansulatuskanavan verenvuotoa tai puhkeaman käytettyäsi jotain tulehduskipulääkettä,
- sinulla on lisääntynyt verenvuototaipumus (esim. hemofilia, verihiutaleiden vähäisyys tai veren hyytymistä estävä lääkehoito).
- jos sairastat vaikea-asteista sydämen vajaatoimintaa tai
- jos olet raskaana viimeisellä kolmanneksella.

Ole erityisen varovainen Alpoxenin suhteen:

Kysy lääkäriltä, voitko käyttää Alpoxenia, jos:

- sairastat hoitamattomia tai vaikeahoitoista verenpainetautiä,
- sairastat sydämen vajaatoimintaa
- sairastat sepelvaltimotautia,
- sinulla on ollut aivoverenkiertohäiriöitä
- sinulla on raajojen verenkiertohäiriöitä.

- sinulla on sydänsairaus tai aiemmin sairastettu aivohalvaus, tai jos luulet, että sinulla on näille sairauksille altistavia riskitekijöitä (esimerkiksi korkea verenpaine, sokeritauti eli diabetes, korkea veren kolesteroli, tupakointi).
- sinulla on astma. Tulehduskipulääkkeet voivat pahentaa joidenkin astmapotilaiden oireita.
- sinulla on heikentynyt munuaisten toiminta

Suuret Alpoxen-annokset lisäävät ruoansulatuskanavan haittavaikutusten esiintymisriskiä.

Lääkkeiden, kuten Alpoxenin käyttöön, voi liittyä hieman suurentunut sydäninfarktin tai aivohalvauksen riski. Kaikki riskit ovat suurempia käytettäessä suurta lääkeannosta ja pitkään käytettäessä. Älä ylitä suositeltua hoidon kestoa.

Muiden lääkevalmisteiden samanaikainen käyttö:

Muu samanaikainen lääkitys saattaa vaikuttaa Alpoxen-hoidon onnistumiseen ja turvallisuuteen. Myös Alpoxen voi vaikuttaa muiden lääkkeiden hoidon onnistumiseen. Kerro lääkärillesi tai apteekkiin, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt muita lääkkeitä, myös sellaisia, joita lääkäri ei ole määrännyt mukaan lukien rohdosvalmisteet ja luontaistuotteet.

- Muiden tulehduskipulääkkeiden sekä suun kautta otettavien tai injektiona annettavien kortisonivalmisteiden samanaikainen käyttö voi lisätä ruoansulatuskanavan haavaumien ja verenvuodon esiintymistä.
- Asetyyliisalisyylihappo nopeuttaa Alpoxenin vaikuttavan aineen, naprokseenin poistumista elimistöstä.
- Veren hyytymistä estävät lääkkeet (esim. varfariini) voivat yhtä aikaa Alpoxenin kanssa käytettynä lisätä ruoansulatuskanavan verenvuodon riskiä sekä naprokseeni voi lisätä veren hyytymistä estävien lääkkeiden kuten varfariinin, tiklopidiinin ja klopidogreelin vaikutusta.
- Mielialalääkkeinä käytettävät selektiiviset serotoniinin takaisinoton estäjät (SSRI/mielialalääkkeet) voivat lisätä ruoansulatuskanavan verenvuodon riskiä.
- Nesteenpoisto- ja verenpainelääkkeiden verenpainetta laskeva vaikutus saattaa heikentyä Alpoxenin käytön aikana.
- ACE:n estäjät tai angiotensiini II-antagonistit (verenpainelääkkeitä) yhdessä Alpoxenin kanssa käytettyinä saattavat johtaa munuaistoiminnan heikkenemiseen esim. munuaisten toimintahäiriöistä kärsivillä iäkkäillä potilailla.
- Kihdin hoitoon käytettävä probenisidi hidastaa Alpoxenin sisältämän naprokseenin poistumista elimistöstä.
- Naprokseeni vaikuttaa sydämen vajaatoiminnan hoitoon tarkoitetun digoksiinin pitoisuuteen veressä munuaisten vajaatoiminnan yhteydessä, minkä takia lääkäri voi muuttaa digoksiiniannosta.
- Litiumin poistuminen elimistöstä hidastuu Alpoxenia samanaikaisesti käytettäessä. Kysy lääkäriltä, voitko käyttää Alpoxenia, jos käytät litiumia.
- Metotreksaatin, siklosporiinin ja ns. aminoglykosidiantibioottien poistuminen elimistöstä voi hidastua niitä yhtä aikaa Alpoxenin kanssa käytettäessä.
- Takrolimuusin munuaishaittavaikutukset voivat voimistua Alpoxenia samanaikaisesti käytettäessä.
- Alpoxen voi häiritä lisämunuaisten toimintakokeissa käytettyjä lääkkeitä.

Raskaus ja imetys:

Alpoxenin käytöstä raskauden tai imetyksen aikana tulee aina neuvotella lääkärin kanssa.

Alpoxenin käyttö voi vaikeuttaa raskaaksi tulemistä. Kerro lääkärillesi jos suunnittelet raskautta tai jos sinulla on vaikeuksia tulla raskaaksi. Alpoxenia saa käyttää raskauden ensimmäisen ja toisen kolmanneksen (raskausviikkojen 0-25) aikana ainoastaan lääkärin määräyksestä. Alpoxenia ei saa käyttää viimeisen raskauskolmanneksen eli raskausviikkojen 26-40 aikana eikä ennen synnytystä.

Alpoxenia saa käyttää imetyksen aikana ainoastaan lääkärin määräyksestä.

Ajaminen ja koneiden käyttö:

Yleensä ei vaikutusta. Joskus voi esiintyä huimausta ja muita haittavaikutuksia (ks. kohta 4), jotka voivat heikentää suorituskykyä liikenteessä ja muissa tarkkuutta vaativissa suorituksissa.

Tärkeää tietoa Alpoxenin sisältämistä aineista:

Lääke sisältää laktoosia. Jos lääkärisi on kertonut, että sinulla on jokin sokeri-intoleranssi, keskustele lääkärisi kanssa ennen tämän lääkevalmisteen ottamista.

3. MITEN ALPOXENIA OTETAAN

Käytä Alpoxenia juuri sen verran kuin lääkärisi on määrännyt. Tarkista lääkäritäsi tai apteekistasi, mikäli olet epävarma.

Lääkäri määrää yksilöllisen annoksen, noudata aina lääkärin Sinulle määräämää annostusta. Annos vaihtelee yksilöllisesti ja käyttötarkoituksesta riippuen 250mg:sta aina 1000mg:an asti vuorokaudessa jaettuna aamu- ja ilta-annokseen.

lääkäillä, yli 70-vuotiailla, henkilöillä annostuksen tulee olla pienin mahdollinen ja hoitoajan mahdollisimman lyhyt.

Lapsille ja nuorille suositeltu vuorokausiannos on 10 mg / kg kahteen osa-annokseen jaettuna. Yli 50 kg painaville voidaan käyttää aikuisten annostusta.

Valmistetta ei suositella alle 5-vuotiaille.

Jos Sinusta tuntuu, että Alpoxenin vaikutus on liian voimakas tai liian heikko, kerro asiasta lääkärillesi tai apteekkiin.

Jos unohdat ottaa Alpoxenia:

Ota seuraava annos vasta sen normaalina ottoajankohtana. Älä ota kaksinkertaista tai suurempaa annosta korvataksesi unohtuneet annokset.

Jos otat enemmän Alpoxenia kuin Sinun pitäisi:

Alpoxenin yliannostuksen oireina voivat olla pahoinvointi, oksentelu, vatsakipu, korvien soiminen tai sydämen tykytys. Jos olet ottanut (tai joku muu on ottanut) liian suuren määrän Alpoxenia, ota yhteys Myrkytystietokeskukseen, puh. (09) 471 977 tai vaihde (09) 4711. Ensiapuna voidaan käyttää lääkehiiltä.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärisi tai apteekin puoleen.

4. MAHDOLLISET HAITTAVAIKUTUKSET

Kuten kaikki lääkkeet, Alpoxenkin voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät niitä kuitenkaan saa. Lääkkeiden, kuten Alpoxenin käyttöön, voi liittyä hieman suurentunut sydäninfarktin tai aivohalvauksen riski.

Yleiset haittavaikutukset (saattaa esiintyä useammalla kuin yhdellä sadasta käyttäjästä):

- väsymys
- huimaus
- päänsärky
- ihottuma
- tinnitus (korvien soiminen)
- ruuansulatushäiriöt, ripuli ja pahoinvointi.

Melko harvinaiset haittavaikutukset (saattaa esiintyä harvemmallakin kuin yhdellä sadasta käyttäjästä):

- ruoansulatuskanavan vuodot. Jos ilmenee ruoansulatuskanavan verenvuotoon liittyviä oireita (mahakipua, heikotusta, verioksennusta, mustia ulosteita tai verisiä ulosteita) hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon.
- nukahtamis- ja keskittymisvaikeudet (unettomuus, levottomuus)
- kuulon heikkeneminen
- näköhäiriöt
- lievä raajojen ääreisosien turvotus
- lämmön nousu

Harvinaiset haittavaikutukset (saattaa esiintyä harvemmallalla kuin yhdellä tuhannesta käyttäjästä):

- kohonnut maksa-arvot
- verenkuvan muutokset (muutokset punasolujen, valkosolujen tai verihiutaleiden määrässä)
- angioneuroottinen edeema
- anafylaktinen reaktio (äkillinen yliherkkyysoire, johon liittyy voimakas verenpaineen lasku, huonovointisuus ja mahdollisesti tajunnan menetys). Tällaisissa tilanteissa ota heti yhteyttä hoitavaan lääkäriin.

Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä pakkausselosteessa mainittu, tai kokemasi haittavaikutus on vakava, kerro niistä lääkärillesi tai apteekkiin.

5. ALPOXENIN SÄILYTTÄMINEN

Säilytä tabletit huoneenlämmössä (+15-25°C).

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä kysy apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. MUUTA TIETOA

Mitä Alpoxen sisältää:

- Vaikuttava aine on naprokseeni 250mg tai 500mg yhdessä tablettissa.
- Muut aineet ovat laktoosimonohydraatti, kroskarmelloosinatrium (E466), hypromelloosi (E464), vedetön kolloidinen piidioksidi (E551) sekä magnesiumstearaatti.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot:

Alpoxen 250 mg tabl.: Valkoinen kapselin muotoinen jakourallinen tabletti, tabletin toisella puolella koodi AL ja toisella N 250. Koko 12 x 7 mm.
Pakkauskoot: 20, 30, 100 tablettia.

Alpoxen 500 mg tabl.: Valkoinen kapselin muotoinen jakourallinen tabletti, tabletin toisella puolella koodi AL ja toisella N 500. Koko 18 x 8 mm.
Pakkauskoot: 10, 30, 100 tablettia.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Myyntiluvan haltija:

Actavis Group hf.
Reykjavíkurvegi 76-78
220 Hafnarfjörður

Islanti

Valmistaja:
Inpac AS
Gjellebekkstubben 10
3420 Lierskogen
Norja

Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja:

Actavis Oy
Klovinpellontie 3 02180 Espoo

Tämä seloste on tarkastettu viimeksi 21.1.2011

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

ALPOXEN 250 mg TABLETT

ALPOXEN 500 mg TABLETT

Naproxen

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.

- Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.
- Om du har ytterligare frågor vänd dig till din läkare eller apotekspersonal.
- Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symtom som liknar dina.
- Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

I denna bipacksedel finner du information om:

1. Vad Alpoxen är och vad det används för
2. Innan du tar Alpoxen
3. Hur du använder Alpoxen
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Alpoxen ska förvaras
6. Övriga upplysningar

1. VAD ALPOXEN ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

Alpoxen-tabletternas verksamma ämne naproxen hör till gruppen sk. anti-inflammatoriska analgetika. Alpoxen förhindrar och lindrar inflammation. Tabletterna har även smärtlindrande och febernedsättande verkan. Alpoxen används för vård av feber, olika typer av värk- och smärttillstånd bl.a. eftervård av tandkirurgiska ingrepp och vård av reumasmärtor både hos barn och vuxna. Alpoxen används även vid vård av ryggradsreumatism, ledbrott, ledslitage samt vid akuta inflammationstillstånd, giktanfall och menstruationssmärter. Tabletterna kan även användas profylaktiskt mot migrän och vård av migränanfall.

2. INNAN DU TAR ALPOXEN

Använd inte Alpoxen om du:

- är allergisk (överkänslig) mot naproxen eller något av övriga innehållsämnen i Alpoxen-tabletten
- är överkänslig mot acetylsalicylsyra eller andra inflammationshämmande och smärtstillande läkemedel
- har aktivt magsår eller sår i tolvfingertarmen,
- tidigare har haft magsår eller sår i tolvfingertarmen två eller flera gånger,
- har haft blödningar från matsmältningskanalen eller en bristning vid användning av något inflammationshämmande och smärtstillande läkemedel,
- har ökad blödningsbenägenhet (t.ex. hemofilia, minskad antal blodplättar eller läkemedel som hämmar blodets koagulation).
- lider av svår hjärtsvikt eller
- är i sista tredjedelen av graviditeten.

Var särskilt försiktig med Alpoxen:

Fråga din läkare om du kan använda Alpoxen, om du:

- har obehandlad eller svårbehandlad blodtryckssjukdom,
- har hjärtsvikt
- har kranskärslssjukdom, har haft störningar i hjärngenomblödningen eller har störningar i blodcirkulationen i armar och ben

- har hjärtsjukdom eller om du tidigare har haft hjärnförlamning eller tror att du har riskfaktorer som utsätter dig till dessa sjukdomar (till exempel hög blodtryck, sockersjuk eller diabetes, hög blodets kolesterol, rökning).
- har astma. Antiinflammatoriska medel kan förvärra symtomen hos vissa astmapatienter.
- har nedsatt njurfunktion

Stora Alpoxen-doser ökar risken för biverkningar i matsmältningskanalen.

Vid användning av läkemedel såsom Alpoxen kan det förekomma större risk för hjärtinfarkt eller hjärnförlamning. Alla risken är större vid användning av stora doser och vid långvarig användning. Överskrid ej rekommenderad behandlingen.

Användning av andra läkemedel:

Annan samtidig medicinering kan påverka resultatet och säkerheten med Alpoxen-behandling. Alpoxen kan också påverka resultatet av behandlingen med andra läkemedel. Tala om för din läkare eller apoteket, om du för närvarande använder eller nyligen har använt andra läkemedel, även sådana som läkare ej har ordinerat, inklusive naturläkemedel och hälsokostpreparat.

- Samtidig användning av andra inflammationshämmande och smärtstillande läkemedel samt av oralt eller injektion använd kortisonläkemedel kan öka förekomsten av sår i matsmältningskanalen och blödningar.
- Acetylsalicylsyra påskyndar utsöndringen av det verksamma ämnet i Alpoxen, naproxen, ur kroppen.
- Antikoagulerande läkemedel (t.ex. warfarin) kan vid samtidig användning av Alpoxen öka risken för blödningar i matsmältningskanalen. Dessutom kan naproxen öka effekten av antikoagulerande läkemedel som warfarin, tiklopidin och klopidogrel.
- Selektiva serotoninupptagshämmare (SSRI/antidepressiva läkemedel) kan öka risken för blödningar i matsmältningskanalen.
- Vätskedrivande läkemedel och den blodtryckssänkande effekten i blodtrycksmediciner kan minska vid samtidig användning av naproxen.
- ACE-hämmare eller angiotensin II-antagonister (blodtrycksmediciner) vid samtidig användning av Alpoxen kan leda till försvagning av njurfunktionen t.ex. hos äldre patienter som lider av njursvikt.
- Probenicid som användas i behandling av gikten fördröjer utsöndring av naproxen ur kroppen. Naproxen finns i Alpoxen.
- Naproxen påverkar digoxinets halten i samband med njursvikt, varför läkaren kan ändra digoxindoseringen (digoxin användas i behandling av hjärt insufficiens).
- Litiums utsöndring ur kroppen fördröjs vid samtidig användning av Alpoxen. Rådfråga din läkare om du kan ta Alpoxen när du använder litium.
- Utsöndring av metotrexat, ciklosporin och sk. aminoglykosidantibiotika kan fördröjas vid samtidig användning av Alpoxen.
- Biverkningar av takrolimus i njurar kan öka vid samtidig användning av Alpoxen.
- Alpoxen kan störa läkemedel som används vid binjurfunktionsprover.

Graviditet och amning:

Man bör alltid först med läkaren diskutera användning av Alpoxen under graviditet och amning. Alpoxen kan försvåra möjligheten att bli gravid. Informera din läkare om du planerar graviditet eller om du har problem med att bli gravid. Alpoxen kan användas endast enligt läkarens ordinerings under första och andra trimestern (graviditetsveckor 0-25). Alpoxen ska inte användas under den sista tredjedelen av graviditeten eller av graviditetsveckor 26-40 och inte heller före födsel.

Alpoxen får endast användas enligt läkarens ordinerings samtidigt med amning.

Körförmåga och användning av maskiner:

I allmänhet ingen inverkan. Ibland kan det uppträda svindel och andra biverkningar (se avsnitt 4), som kan försämra reaktionsförmågan i trafiken och förmågan utföra arbeten som kräver noggrannhet.

Viktig information om något av hjälpämne i Alpoxen:

Läkemedlet innehåller laktos. Om din läkare har informerat dig om att du lider av någon socker intolerans skall du konsultera din läkare innan du börjar ta av detta läkemedel

3. HUR DU ANVÄNDER ALPOXEN

Använd alltid Alpoxen enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Läkaren ordinerar en individuell dos. Iaktta alltid den dos som läkaren ordinerat dig. Dosen varierar från individ till individ och beroende på användningsändamål från 250 mg upp till 1000 mg fördelat på en morgon- och kvällsdos. För äldre personer, dvs. över 70-åringar, skall dosen vara den minsta möjliga och behandlingstiden så kort som möjligt. Den rekommenderade dygnsdosen för barn och unga är 10 mg/kg fördelat på två deldoser. För personer som väger över 50 kg kan doseringen för vuxna tillämpas. Preparatet rekommenderas inte för barn under 5 år.

Om du upplever att effekten av Alpoxen är för stark eller för svag vänd dig till din läkare eller farmaceut.

Om du glömmet att ta Alpoxen

Ta den följande dosen vid den normala tidpunkten. Ta inte dubbel dos för att kompensera för den glömda dosen.

Om du har tagit för stor mängd av Alpoxen

Symptom på överdos av Alpoxen kan vara illamående, uppkastning, magsmärtor, ringande öron eller hjärtklappning. Om du har tagit (eller någon annan har tagit) för stor mängd av Alpoxen, kontakta Giftinformationscentralen, tfn. (09) 471 977 eller växel (09) 4711. Som förstahjälpen kan medicinskt kol används.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

Liksom alla läkemedel kan Alpoxen orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem. Vid användning av läkemedel såsom Alpoxen kan det förekomma större risk för hjärtinfarkt eller hjärnförlamning.

Vanliga biverkningar (förekommer hos fler än en av hundra patienter):

- trötthet
- svindel
- huvudvärk
- eksem
- ringning i öron
- störning i matsmältning, diarré och illamående.

Mindre vanliga biverkningar (förekommer hos färre än en av hundra patienter):

- blödningar i matsmältningsskanalen. Om du får symptom som är förknippade med blödningar i magtarmkanalen (bl.a. ont i magen, svaghetskänsla, blodiga uppkastningar, svarta avföringar eller blodiga avföringar) skall du omedelbart uppsöka läkarvård.
- rubbning i sömn eller i koncentration (sömlöshet, orolighet)
- försämring i hörsel
- rubbning i syn
- mild svullnad i armar och ben
- uppgång i temperatur

Sällsynta biverkningar (förekommer hos färre än en av tusen patienter):

- förhöjda levervärden
- ändringar i blodbild (ändringar i antal av röda blodkroppar, vita blodkroppar eller blodplättar).
- angioödem
- anafylaktisk reaktion (akut allergisk reaktion med kraftig fall av blodtryck, illamående och möjlig slocknande). Vid överkänslighetsreaktioner kontakta din läkare omedelbart.

Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

5. HUR ALPOXEN SKA FÖRVARAS

Förvara tablettarna i rumstemperatur (+15-25°C).

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

- **Innehållsdeklaration:** Den aktiva substansen är naproxen 250 mg, eller 500 mg i en tablett.
- Övriga innehållsämnen är laktosmonohydrat, kroskarmellosnatrium (E466), hypromellos (E464), vattenfritt kolloidalt kiseloxid (E551) och magnesiumstearat.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Alpoxen 250 mg tablett: Vit, kapselformad tablett med delskåra. På ena sidan av tablettens finns koden AL och på andra sidan finns N 250. Storlek 12 x 7 mm.
Förpackningsstorlekar: 20, 30, 100 tabletter.

Alpoxen 500 mg tablett: Vit, kapselformad tablett med delskåra. På ena sidan av tablettens finns koden AL och på andra sidan finns N 500. Storlek 18 x 8 mm.
Förpackningsstorlekar: 10, 30, 100 tabletter.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning

Actavis Group hf
Reykjavíkurvegi 76-78
220 Hafnarfjörður
Island

Tillverkare:

Inpac AS
Gjellebekkstubben 10
3420 Lierskogen
Norge

Ytterligare upplysningar om detta läkemedel kan erhållas hos ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning:

Actavis Oy
Klovisåkersvägen 3 02180 Esbo

Denna bipacksedel godkändes senast 21.1.2011