

Hydrokortisonia ja deksametasonia sisältävien valmisteiden annostelu koirille ampiaisen- tai mehiläisenpiston ensiavussa

Koiran paino kg	Hydrokortisonitabletti 50 mg (hydrokortisoni 5 mg/kg)	Deksametasonitabletti 1,5 mg (deksametasoni 0,2 mg/kg)
5	1/2 tablettia	2/3 tablettia
10	1 tabletti	1 1/3 tablettia
20	2 tablettia	2 2/3 tablettia
30	3 tablettia	4 tablettia
40	4 tablettia	5 1/3 tablettia
50	5 tablettia	6 2/3 tablettia



Ensiapuna koira pidetään levossa ja purema-alue viilennetään esimerkiksi kylmäpakkauksella. Annostelun helpottamiseksi tabletit voidaan liuottaa pieneen määrään nestettä. Useamman ampiaisen tai mehiläisen pistoissa varsinkin pään alueelle on mentävä eläinlääkäriin.

Kyytabletteja ei tule antaa käärmeenpuremiin, sillä tabletit saattavat peittää reaktion vakavuutta ja lisäksi vaikeuttaa eläinlääkäriin vastaanotolla koiran kunnan arviointia ja jatkohoitoa. **Koira, jota kyy on purrut, on aina vietävä eläinlääkäriin.**

Lähde: Koponen A, Koiran ensiapu ja kotilääkintä, 2. lisäty ja tarkistettu painos, Tammi, 2004
TABU 2/2008: Kynpureman hoito koiralla, ss. 27-28

Valtakunnallinen
asiakaspalvelunumero
0300 20200
(0,4 €/min + pvm/mpm)

S U O M E N S U U R I N A P T E E K K I



**Yliopiston
Apteekki**