

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle

Zidoval 7,5 mg/g emätingeeli metronidatsoli

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

- Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
- Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
- Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
- Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

1. Mitä Zidoval on ja mihin sitä käytetään
2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Zidovalia
3. Miten Zidovalia käytetään
4. Mahdolliset haittavaikutukset
5. Zidovalin säilyttäminen
6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä Zidoval on ja mihin sitä käytetään

Zidoval-emätingeeli kuuluu antibakteeristen lääkkeiden ryhmään. Ne toimivat tappamalla monenlaisia bakteereita, jotka aiheuttavat tulehduksia.

Zidoval-emätingeelillä hoidetaan tulehdusta emättimessä (bakteerivaginoosi) aikuisilla. Zidoval-geeliä viedään suoraan emättimeen, jossa se tuhoaa bakteereita tulehdusalueelta.

On tärkeää hoitaa ja poistaa bakteerivaginoosi kunnolla, muuten tulehdus voi uusiutua. Käytä lääkekuuri loppuun lääkärin ohjeen mukaan, jotta välttyä tulehduksen uusiutumiselta.

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Zidovalia

Älä käytä Zidovalia

- jos olet allerginen metronidatsolille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6).
- jos olet allerginen muulle samankaltaiselle antibakteeriselle nitroimidatsoli-yhdisteelle
- jos olet allerginen parabeeneille (säilytysaine)

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa, jos jokin yllä mainittu koskee sinua.

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin käytät Zidovalia:

- jos sinulla on joskus ollut sairaus, joka vaikuttaa vereen
- jos sinulla on tai arvelet, että on hiivainfektio emättimessä. Hiivainfektion oireet voivat vahvistua, kun käytät Zidoval-geeliä. Voit silloin tarvita toisen lääkkeen hiivainfektion hoitoon.
- jos sinulla on kuukautiset
- jos sinulta otetaan verikokeita, koska metronidatsoli voi vaikuttaa joidenkin testien tuloksiin.
- Vältä tämän lääkkeen pitkäaikaista ja tarpeetonta käyttöä.

Kuten muidenkin emätintulehdusten aikana, vältä yhdyntää tulehduksen ja Zidoval-hoidon aikana.

Lapset ja nuoret

Zidoval-emätingeeliä ei suositella alle 18-vuotiaille lapsille tai nuorille, sillä lääkkeen turvallisuutta ei ole testattu tässä ikäryhmässä.

Iäkkäät potilaat

Zidoval-geeliä ei suositella iäkkäille potilaille, sillä lääkkeen turvallisuutta ei ole testattu tässä ikäryhmässä.

Muut lääkevalmisteet ja Zidoval

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä.

Zidoval-emätingeeli voi lisätä seuraavien lääkkeiden tehoa:

- kumariiniantikoagulantit (esim. varfariini) jotka ovat veren hyytymistä estäviä lääkkeitä
- litium, lääke psyykkiseen sairauteen
- siklosporiini, lääke autoimmuunisairauksien ja nivelreuman hoitoon
- 5-fluorourasiili, lääke iho-ongelmien ja syövän hoitoon
- muut lääkkeet, myös ilman reseptiä saatavat lääkkeet

Zidoval alkoholin kanssa

Alkoholin käyttö Zidoval-hoidon aikana voi aiheuttaa pahoinvointia, sekavuutta, päänsärkyä tai nostaa sydämen sykettä tavallista nopeammaksi. Jos näin käy, lopeta juominen ja ota yhteyttä lääkäriin tai apteekkihenkilökuntaan.

Raskaus ja imetys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Zidoval sisältää metyyliiparahydroksibentsoattia (E218) ja propyyliiparahydroksibentsoattia (E216), jotka voivat aiheuttaa allergisia reaktiota (mahdollisesti viivästyneitä).

Yksi gramma Zidoval-geeliä sisältää myös 30 mg propyleeniglykolia (E1520), joka voi aiheuttaa ihoärsytystä.

3. Miten Zidovalia käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma. Zidovalia tulee käyttää vain emättimeen.

Tärkeää:

Seuraa aina lääkärin määräystä sekä apteekin ohjelipukkeessa annettuja ohjeita. Jos olet epävarma, tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista.

Ennen kuin käytät Zidovalia

Zidovalin käytön aikana hygieniasta huolehtiminen on hyvin tärkeää.

- Pese kätesi aina ennen kun avaat tuubin tai kosket asettimeen.
- Käytä uutta asetinta jokaiseen annokseen.
- Heitä käytetty asetin heti roskakoriin.

Annostus aikuiselle

- Suositeltu annos on 5 g geeliä (1 täytetty asetin) vietyä emättimeen kerran päivässä, nukkumaan mentäessä, viitenä peräkkäisenä päivänä.

Käyttö lapsille ja nuorille


Tätä lääkettä ei suositella alle 18-vuotiaille lapsille.

Käyttö iäkkäille potilaille


Tätä lääkettä ei suositella iäkkäille potilaille.

Käyttöohjeet

- Zidoval-geelin mukana saat kertakäyttöisiä asettimia, jotka auttavat annostelevaan geelin emättimeen
- **Tuubin avaaminen:** Avaa tuubin korkki ja puhkaise tuubin pään sinetti korkin terävällä päällä.




- **Asettimen täyttäminen:** Kierrä asettimen avonainen pää tiukasti kiinni tuubin päähän. Täytä asetin puristamalla tuubia varovasti ja hitaasti pohjasta lähtien. Mäntä liikkuu asettimen täytyessä ja pysähtyy, kun 5 g annos Zidoval-geeliä tulee täyteen. Kierrä asetin irti tuubista ja sulje tuubi korkilla.



- **Asettimen vieminen emättimeen:** Pidä täytettyä asetinta pystyasennossa ja vie asetin varovasti emättimeen niin pitkälle kuin se vaikeuksitta menee. Sinun on ehkä helpointa viedä asetin emättimeen, kun makaat selälläsi polvet koukistettuina



- **Geelin vapautus:** Työnnä hitaasti asettimen mäntää sisään. Samalla geeli vapautuu emättimeen. Jatka työntämistä kunnes mäntä pysähtyy. Näin saat varmasti juuri oikean määrän geeliä emättimeen.



- Vedä asetin pois emättimestä ja heitä se roskakoriin välittömästi.

Toista tämä käsittely nukkumaan mennessä viitenä peräkkäisenä päivänä, tai kuten lääkäri on määrännyt, käyttäen joka kerta uutta asetinta. Jos et viiden päivän lääkekuurin jälkeen tunne oloasi paremmaksi, sinun tulee käydä uudelleen lääkärissä.

Jos käytät enemmän Zidovalia kuin sinun pitäisi

Älä käytä Zidoval-geeliä enemmän kuin sinun pitäisi. Liian suuri annos voi lisätä haittavaikutusten riskiä (katso alemmaa kohta 4).

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

Jos unohdat käyttää Zidovalia

Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen. Annostelee Zidoval-geeliä ennen seuraavaa nukkumaanmenoa.

Jos lopetat Zidovalin käytön

Älä lopeta Zidoval-geelin viiden päivän lääkekuuria kesken keskustelematta ensin lääkärin kanssa. On tärkeää käyttää lääkekuuri loppuun, jotta tulehdus häviää kokonaan.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Yleiset (voi esiintyä enintään yhdellä potilaalla 10:stä):

- Päänsärky ja huimaus
- Mahakrampit
- Oksentelu
- Epämiellyttävä maku suussa
- Epätavallinen tunne kielessä
- Kuiva iho
- Ihon punoitus (eryteema)
- Ihon kutina
- Epämiellyttävä tunne iholla (polttelu, kipu iholla / kirvely)
- Ihoärsytys
- Emättimen hiivasienitulehdus
- Emätinvuoto
- Epämukavuuden tunne lantion alueella
- Ruokahalun menetys

Melko harvinaiset (voi esiintyä enintään yhdellä potilaalla 100:sta):

- Huonovointisuus
- Masennus
- Väsymys
- Ärtäisyys
- Univaikeudet
- Epätavallinen tunne sormissa ja varpaissa
- Ripuli
- Ummetus
- Turvonnut tai kuriseva maha
- Kuiva suu tai janontunne
- Metallin maku suussa

- Lihaskrampit
- Tummunut virtsa
- Virtsatietulehdus, joka voi aiheuttaa kipua tai polttavaa tunnetta virtsatessa tai lisätä virtsaamistarpeen tiheyttä tai voimakkuutta
- Ulkosynnyttimien turpoaminen
- Muutoksia kuukautisissa, kuten tiputtelevaa tai runsaampaa verenvuotoa emättimestä kuukautisten välillä tai epämiellyttävää oloa kuukautisten aikana

Seuraavaa haittavaikutusta on myös raportoitu (yleisyys tuntematon):

- Kutiseva ihottuma (urtikaria).

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi
 Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
 Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
 PL 55
 00034 FIMEA

5. Zidovalin säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä kotelossa ja tuubissa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (EXP) jälkeen.

Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Säilytä alle 25°C.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Zidoval sisältää

- Vaikuttava aine on metronidatsoli. Yksi gramma geeliä sisältää 7,5 mg metronidatsolia.
- Muut aineet ovat karbopooli 974P, dinatriumedetaatti, metyyliiparahydroksibentsoaatti (E218), propyyliiparahydroksibentsoaatti (E216), propyleeniglykoli (E1520), natriumhydroksidi (E524) ja puhdistettu vesi.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko

Zidoval-emätingeeli on väritöntä tai vaaleankeltaista.

Alumiinituubi, jossa muovinen kierrekorkki, sisältää 40 g geeliä. Tuubi on pakattu pahvipakkaukseen, jossa on myös viisi kertakäyttöistä asetinta. Yhden asetimen avulla voi asettaa 5 grammaa geeliä emättimeen.

Myyntiluvan haltija

Viatrix Oy
 Vaisalantie 2–8
 02130 Espoo
 Puh. 020 720 9555
 S-posti: infofi@viatrix.com

Valmistaja
Meda Manufacturing
Avenue JF Kennedy
33700 Merignac
Ranska

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 22.1.2024.

Bipacksedel: Information till användaren

Zidoval 7,5 mg/g vaginalgel metronidazol

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.
- Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.
- Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.
- I denna bipacksedel kallas Zidoval 7,5 mg/g vaginal gel för Zidoval gel.

I denna bipacksedel finns information om följande

1. Vad Zidoval gel är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Zidoval gel
3. Hur du använder Zidoval gel
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Zidoval gel ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Zidoval gel är och vad det används för

Zidoval gel tillhör gruppen antibakteriella läkemedel. Dessa har en avdödande effekt på många typer av bakterier som orsakar infektioner.

Zidoval gel är avsedd för behandling av bakteriell infektion i slidan (kallad bakteriell vaginos, förkortas BV) hos vuxna. Zidoval gel appliceras direkt i slidan och dödar därmed bakterierna på infektionsstället.

Det är viktigt att bakteriell vaginos behandlas och läker ut fullständigt, annars kan infektionen komma tillbaka. Du måste ta hela läkemedelskuren som din läkare ordinerat ända till slut för att förhindra att en ny infektion uppstår.

2. Vad du behöver veta innan du använder Zidoval gel

Använd inte Zidoval gel

- om du är allergisk mot metronidazol eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).
- om du är allergisk mot liknande bakteriedödande medel baserade på nitroimidazoler.
- om du är allergisk mot parabener (en typ av konserveringsmedel).

Tala med din läkare eller apotekspersonal om något av ovanstående stämmer in på dig.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Zidoval gel:

- om du har eller har haft någon blodsjukdom.
- om du har eller misstänker att du har svampinfektion i slidan. Symptomen på svampinfektion kan bli mer märkbara när du använder Zidoval gel och du kan behöva en annan behandling för det.
- när du har menstruation.
- om du ska ta blodprov eftersom metronidazol kan inverka på vissa provresultat.
- Undvik långvarig och onödig användning av detta läkemedel.

Som vid alla vaginala infektioner bör samlag undvikas under infektionen och under behandlingen med Zidoval gel.

Barn och ungdomar

Zidoval gel rekommenderas inte för användning till barn och ungdomar under 18 år eftersom erfarenhet saknas från dessa åldersgrupper.

Äldre

Zidoval gel rekommenderas inte för användning till äldre eftersom erfarenhet saknas från den åldersgruppen.

Andra läkemedel och Zidoval gel

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel. Zidoval gel kan eventuellt öka effekten av följande läkemedel:

- Kumarin antikoagulanter (t. ex. warfarin), vilka är läkemedel som används för att minska blodets koagulation (levringsförmåga).
- Litium, ett läkemedel vid behandling av psykisk sjukdom
- Ciklosporin, behandling mot autoimmuna sjukdomar och reumatoid artrit
- 5-fluorouracil, ett läkemedel mot hudproblem och behandling av cancer
- Andra mediciner, även receptfria sådana.

Zidoval gel med alkohol

Intag av alkohol under behandling med Zidoval gel kan orsaka illamående, kräkning, förvirring, huvudvärk eller hjärtklappning. Om detta inträffar, upphör att dricka alkohol och ta kontakt med läkare eller apotekspersonal.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Zidoval gel innehåller metylparahydroxybensoat (E218) och propylparahydroxybensoat (E216) som kan ge allergiska reaktioner (eventuellt fördröjda).

Zidoval gel innehåller också 30 mg propylenglykol (E1520) per gram gel. Propylenglykol kan ge hudirritation.

3. Hur du använder Zidoval gel

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Zidoval gel är endast för vaginalt bruk.

Viktigt:

Följ alltid läkarens ordination samt anvisningarna på apoteketiketten. Om du är osäker, rådfråga din läkare eller apotekspersonal.

Innan du tar Zidoval gel

God hygien är mycket viktigt vid användning av Zidoval gel.

- tvätta alltid händerna innan du öppnar tuben eller rör vid applikatorerna.
- använd en ny applikator för varje dos.
- kasta den använda applikatorn direkt efter användning.

Dosering för vuxna

Rekommenderad dos av Zidoval gel är 5 g (en fylld applikator) införd i slidan en gång per dag, vid sänggåendet, fem dagar i följd.

Användning för barn och ungdomar


Detta läkemedel rekommenderas ej till barn under 18 år.

Användning för äldre


Detta läkemedel rekommenderas ej till äldre.

Bruksanvisning

- Engångs-applikatorer för införande av Zidoval gel i slidan tillhandahålls i förpackningen.
- **Öppna tuben:** Skruva av locket och tryck hål på öppningen med den spetsiga sidan av locket.



- **Att fylla applikatorn:** Skruva fast den öppna sidan av en applikator på den öppnade tuben. Kläm tuben försiktigt ifrån botten för att fylla applikatorn med gel. Kolven förflyttar sig samtidigt som applikatorn fylls och stannar när applikatorn innehåller rätta mängden med 5 g Zidoval gel. Skruva av applikatorn och sätt tillbaka locket på tuben.



- **Införandet av applikatorn:** Håll den fyllda applikatorn upprätt och för försiktigt in den i slidan så långt det går och känns bekvämt. Du kanske finner det lättast att göra detta om du ligger på rygg med benen böjda.



- **Tömma gelen:** Tryck sakta in kolven för att tömma gelen i slidan. Fortsätt trycka tills det tar stopp. Då först har du fått den korrekta dosen av gel.



- Dra ut applikatorn ifrån slidan och kasta applikatorn omedelbart.

Upprepa denna procedur med en ny applikator vid sänggåendet under fem dagar i följd, eller enligt läkarens anvisningar. Om du inte mår bättre efter behandlingens slut, ta kontakt med din läkare igen.

Om du använt för stor mängd av Zidoval gel

Använd inte mer Zidoval gel än vad som rekommenderats. Om du råkar använda för mycket läkemedel kan risken för biverkningar öka (se avsnitt 4 nedan).

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112 i Sverige, 0800 147 111 i Finland) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har glömt att använda Zidoval gel

Ta inte dubbel dos för att kompensera för en glömd dos. Applicera Zidoval gel nästa gång vid sänggåendet.

Om du slutar att använda Zidoval gel

Sluta inte ta Zidoval gel under en 5-dagars behandling utan att först tala med din läkare. Det är viktigt att du fullföljer behandlingen så att infektionen läker ut fullständigt.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)

- Huvudvärk och yrsel
- Magkramper
- Kräkning
- Obehaglig smak i munnen
- Ovanlig känsla på tungan
- Torr hud
- Hudrodnad (erytem)
- Hudklåda (pruritus)
- Obehag i huden (brännande känsla, smärta i huden/stickande känsla)
- Hudirritation.
- Svampinfektion i slidan
- Onormala flytningar
- Känsla av ökat tryck i bäckenområdet
- Minskad aptit

Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)

- Illamående
- Depression
- Trötthet
- Irritationskänsla
- Sömnsvårigheter
- Ovanlig känsla i fingrar och tår
- Diarré
- Förstoppning
- Bullrig mage/väderspänningar/gaser
- Muntorrhet eller törst
- Metallsmak i munnen
- Kramper
- Mörkfärgad urin
- Urinvägsinfektion som kan orsaka smärta eller en brännande känsla när du kissar, eller öka behovet av att kissa oftare eller mer akut
- Svullnad i vulvan (utsidan av vaginan)
- Förändrad menstruation såsom stänklödning eller ökat obehag under menstruation.

Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):

- Kliande utslag (urtikaria).

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

www-sidan: www.fimea.fi

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea

Biverkningsregistret

PB 55

00034 FIMEA

5. Hur Zidoval gel ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen och tuben efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Förvaras vid högst 25 °C.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

- Den aktiva substansen är metronidazol. Varje gram gel innehåller 7,5 mg metronidazol.
- Övriga innehållsämnen är Carbopol 974P, dinatriumedetat, metylparahydroxybensoat (E218), propylparahydroxybensoat (E216), propylenglykol (E1520), natriumhydroxid (E524) samt renat vatten.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Zidoval vaginalgel är färglös eller halmfärgad. Den är förpackad i en aluminiumtub innehållande 40 g gel med ett skruvlock av plast i en kartong. Kartongen innehåller också 5 st engångsapplikatorer, vardera för 5 g gel.

Innehavare av godkännande för försäljning

Viatriis Oy

Vaisalavägen 2–8

02130 Esbo

tel: 020 720 9555

E-mail: infofi@viatriis.com

Tillverkare

Meda Manufacturing, Avenue JF Kennedy, 33700 Merignac, Frankrike

Denna bipacksedel ändrades senast 22.1.2024.