

Pakkausseloste: tietoa käyttäjälle

Felodipin HEXAL 5 mg ja 10 mg depottabletit

felodipiini

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

- Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
- Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
- Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
- Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen, vaikka kokemiasi haittavaikutuksia ei olisikaan mainittu tässä pakkausselosteessa.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

1. Mitä Felodipin Hexal on ja mihin sitä käytetään
2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Felodipin Hexal –depottabletteja
3. Miten Felodipin Hexal –depottabletteja käytetään
4. Mahdolliset haittavaikutukset
5. Felodipin Hexal –depottablettien säilyttäminen
6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä Felodipin Hexal on ja mihin sitä käytetään

Felodipin Hexalilla hoidetaan **kohonnutta verenpainetta**.

Felodipin Hexal kuuluu kalsiuminestäjien lääkeryhmään. Nämä lääkeaineet alentavat kohonnutta verenpainetta laajentamalla pieniä valtimoita (verisuonia) ja helpottavat näin sydämen pumppaustyötä.

Felodipiinia, jota Felodipin Hexal –tabletit sisältävät, voidaan joskus käyttää myös muiden kuin tässä pakkausselosteessa mainittujen sairauksien hoitoon. Kysy neuvoa lääkäriltä, apteekista tai muulta terveydenhuollon ammattilaiselta ja noudata aina heiltä saamiasi ohjeita.

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Felodipin Hexal –depottabletteja

Älä käytä Felodipin Hexal –depottabletteja

- jos olet **allerginen**
 - felodipiinille tai
 - tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6) tai
 - muille samankaltaisille kalsiuminestäjille (nk. dihydropyridiinijohdoksille).
- jos verenvirtaus kudoksiin on riittämätöntä, mikä voi aiheuttaa esim. verenpaineen laskua, sydämen hidas- tai tiheälyöntisyyttä, **sokin** tai vakavasta sydämen toimintahäiriöstä johtuvan **kardiogeenisen sokin**.
- jos sinulla **on ollut sydäninfarkti edeltävien 2 kuukauden aikana**.
- jos sinulla on rintakipua myös levossa tai lievässä rasituksessa (**epävakaa angina pectoris**).
- os sinulla on vaikea sydänsairaus
- jos olet **raskaana**.

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin kanssa ennen kuin käytät Felodipin Hexal -depottabletteja. Kerro lääkärillesi, jos sinulla on tai on ollut jokin seuraavista:

- maksasairauksia

- sydänsairauksia (esim. nopeampi sydämen syke, korkea ja/tai matala verenpaine).
- Jos epäilet jonkin edellämainituista koskevan sinua, keskustele lääkärisi kanssa.

Muut lääkevalmisteet ja Felodipin Hexal

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat joutua käyttämään muita lääkkeitä

Felodipin Hexalin teho voi muuttua, jos käytät samanaikaisesti eräitä muita lääkkeitä. Felodipin Hexal voi myös vaikuttaa muihin lääkkeisiin. Näitä ovat esim.:

- takrolimuusi (elinsiirron jälkeen käytettäviä lääkkeitä)
- digoksiini (sydänlääke).

Seuraavat lääkkeet voivat suurentaa felodipiinin määrää veressä:

- simetidiini (mahahaavalääke)
- tietyt antibiootit kuten erytromysiini
- ketokonatsoli tai itrakonatsoli (sienilääkkeitä)
- HIV-proteasainestäjät (HIV-infektioiden hoidossa käytettävät viruslääkkeet kuten ritonaviiri).

Seuraavat lääkkeet voivat pienentää felodipiinin määrää veressä:

- fenytoiini, karbamatsepiini tai fenobarbitaali (epilepsialääkkeitä)
- barbituraatit (rauhottavia lääkkeitä ja epilepsian hoitoon käytettäviä lääkkeitä)
- rifampisiini (antibiootti)
- efavirensi tai neviraiini (HIV-lääkkeitä)
- mäkikuismaa (*Hypericum perforatum*) sisältävät rohdosvalmisteet .

Seuraavat lääkkeet voivat vahvistaa Felodipin Hexal -depottablettien vaikutusta:

- muut verenpainelääkkeet, esim. beetasalpaajat, ACE:n estäjät ja diureetit
- masennuslääkkeet (trisykliset masennuslääkkeet)
- hydroklooritiatsidi (diureetti).

Felodipin Hexal –depottabletit ruuan ja juoman kanssa

Greipit ja greippimehu voivat muuttaa Felodipin Hexalin vaikutusta. Greippimehun samanaikaista käyttöä on vältettävä.

Raskaus ja imetys

- Felodipin Hexalia **ei saa** käyttää raskauden aikana. Raskaus on suljettava pois ennen Felodipin Hexal -hoidon aloittamista.
- Felodipin Hexalin käyttöä ei suositella imettäville naisille.

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Jos sinua huimaa tämän lääkkeen ottamisen jälkeen, älä aja tai käytä koneita.

Lääke voi heikentää kykyä kuljettaa moottoriajoneuvoa tai tehdä tarkkaa keskittymistä vaativia tehtäviä. On omalla vastuullasi arvioida, pystytkö näihin tehtäviin lääkehoidon aikana. Lääkkeen vaikutuksia ja haittavaikutuksia on kuvattu muissa kappaleissa. Lue koko pakkausseloste opastukseksi. Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa, jos olet epävarma.

Felodipin Hexal –depottabletit sisältävät laktoosia

Jos sinulla on todettu jokin sokeri-intoleranssi, keskustele lääkärisi kanssa ennen tämän lääkkeen käytön aloittamista.

3. Miten Felodipin Hexal –depottabletteja käytetään

Ota tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Felodipin Hexalia otetaan kerran vuorokaudessa. Tabletit niellään kokonaisina vesilasillisen kera eikä niitä saa murskata tai pureskella. Tabletit voidaan ottaa joko tyhjään vatsaan tai kevyen aterian yhteydessä, ei kuitenkaan rasvaisen aterian yhteydessä.

Tabletteja ei saa rikkoa.

Suositteltu aloitusannos on 5 mg kerran päivässä. Tarvittaessa annosta voidaan suurentaa jos lääkäri katsoo sen tarpeelliseksi 10 mg:aan kerran päivässä. Enimmäisannos on 10 mg päivässä.

Lapset ja nuoret (ikä alle 18 vuotta)

Felodipin Hexal -depottablettien käytöstä lapsilla (alle 18-vuotiailla) on kokemusta rajallisesti. Felodipin Hexal -depottabletteja ei näin ollen saa antaa lapsille.

Iäkkäät potilaat

Suositteltu aloitusannos on valittava iäkkäille potilaille. Jos annos on 2,5 mg, on käytettävä sellaista lääkevalmistetta, josta löytyy tämä vahvuus.

Maksan vajaatoiminta

Annosta muutetaan lääkärin määräysten mukaan.

Jos otat enemmän Felodipin Hexal –depottabletteja kuin sinun pitäisi

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 09 471 977 Suomessa, 112 Ruotsissa) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

Potilas on asetettava makuuasentoon kädet ja jalat kohotettuina (esim. tyynyille). Yliannostuksen oireita ovat voimakas huimaus ja/tai pyörrytys, joka johtuu liian matalasta verenpaineesta, hengitysvaikeudet ja lisääntynyt virtsaamistarve.

Jos unohtat ottaa Felodipin Hexalia

Ota unohtunut annos heti muistaessasi, mutta älä koskaan ota kahta annosta samana päivänä.

Jos lopetat Felodipin Hexal –depottablettien käytön

Lääkärisi kertoo sinulle, miten kauan Felodipin Hexal -hoitoa jatketaan. Jos lopetat hoidon äkillisesti, oireesi voivat uusiutua. Älä lopeta hoitoa sovittua aikaisemmin keskustelematta lääkärisi kanssa.

Felodipin Hexalia käytetään yleensä pitkäaikaiseen hoitoon.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Jos havaitset jonkin seuraavista haittavaikutuksista, lopeta Felodipin Hexalin käyttö ja ota heti yhteys lääkäriin:

- Rintakipu ja samanaikainen huimaus
- Allerginen reaktio, jonka merkkejä voivat olla esimerkiksi kohollaan olevat paukamat ihossa tai kasvojen, huulten, suun, kielen tai kurkun turvotus.

Muita mahdollisia haittavaikutuksia:**Hyvin yleisiä** (voi esiintyä yli 1 potilaalla 10:stä)

- ääreisosien turvotus (nilkkojen turvotuksen vaikeusaste riippuu annoksesta).

Yleisiä (voi esiintyä enintään 1 potilaalla 10:stä)

- päänsärky, punastuminen.

Melko harvinaisia (voi esiintyä enintään 1 potilaalla 100:sta)

- huimaus
- väsymys
- pyörrytys
- sydämentykytyssydämen sykkeen nousu
- levottomuus
- pistely
- ruuansulatuskanavan vaivat (esim. pahoinvointi, ripuli, ummetus, vatsakipu)
- painonnousu
- hikoilu
- iho- ja yliherkkyysoireet kuten kutina

ihottuma.

Harvinaisia (voi esiintyä enintään 1 potilaalla 1 000:sta)

-
- pyörtyily
- nivelkipu
- oksentelu
- lihaskipu
- erektiohäiriöt, seksuaalisen toiminnan häiriöt
- kutiseva ihottuma.

Hyvin harvinaisia (voi esiintyä enintään 1 potilaalla 10 000:sta)

- ientulehdus ja ikenien turvotus, jota voidaan ehkäistä tai vähentää huolellisella suuhygienialla
- maksan toimintahäiriöt (kohonneet transaminaasiarvot)
- valoherkkyys
- valkosolujen aiheuttama verisuonitulehdus (leukosytoklastinen vaskuliitti)
- kuume
- tihentynyt virtsaamistarve
- rintojen suureneminen miehillä
- poikkeuksellisen runsaat kuukautiset.

Hoidon alussa tai annoksen noston yhteydessä voi esiintyä seuraavia haittavaikutuksia:

- Punastelu, päänsärky, nopeampi tai hakaava sydämen syke, huimaus tai väsymys.

Jos haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös kaikkia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa.

5. Felodipin Hexal depottablettien säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Felodipin Hexal sisältää

- Vaikuttava aine on felodipiini. Yksi tabletti sisältää 5 mg tai 10 mg felodipiinia.
- Muut aineet ovat: mikrokiteinen selluloosa, laktoosimonohydraatti, natriumlauryylisulfaatti, hypromelloosi, magnesiumstearaatti, makrogoli 4000, keltainen rautaoksidi (E172), punainen rautaoksidi (E172) ja titaanidioksidi (E171).

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Felodipin Hexal 5 mg on vaalean- tai harmaanpunertava, pyöreä, kaksoiskupera tabletti, jonka toisella puolella on merkintä F5.

Felodipin Hexal 10 mg on vaalean- tai harmaanpunertava, pyöreä, kaksoiskupera tabletti, jonka toisella puolella on merkintä F10.

Pakkauskoot:

5 mg: 7, 14, 20, 28, 30, 50, 50x1, 98, 100, 100x1 tai 250 depottablettia.

10 mg: 7, 14, 20, 28, 30, 50, 50x1, 98, 100, 100x1 tai 250 depottablettia.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija

HEXAL A/S, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 Kööpenhamina S, Tanska

Valmistaja

Salutas Pharma GmbH, Otto-von-Quericke-Allee 1, D-39179 Barleben, Saksa

Tämä seloste on tarkistettu viimeksi

23.10.2012

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

Felodipin HEXAL 5 mg och 10 mg depottabletter

felodipin

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller till apotekspersonal.
- Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.
- Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad Felodipin Hexal är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Felodipin Hexal
3. Hur du använder Felodipin Hexal
4. Eventuella biverkningar
5. Hur ska Felodipin Hexal förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Felodipin Hexal är och vad det används för

Felodipin Hexal används vid behandling av **högt blodtryck**.

Felodipin Hexal tillhör en grupp av läkemedel som kallas kalciumantagonister. Dessa läkemedel motverkar högt blodtryck genom att vidga de små blodkärlen (arteriolerna) och underlätta hjärtats pumpfunktion.

Felodipin som finns i Felodipin Hexal kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2. Vad du behöver veta innan du använder Felodipin Hexal

Använd inte Felodipin Hexal

- om du är **allergisk** mot
 - felodipin eller
 - något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)
 - liknande kalciumkanalblockerare (så kallade dihydropyridinderivat)
- om du har otillräcklig blodtillförsel i vävnaderna med symtom som lågt blodtryck, låg puls, snabba hjärtslag (**chock, inklusive kardiovaskulär chock**). Kardiovaskulär chock betyder chock på grund av allvarliga hjärtproblem.
- om du **har haft någon hjärtinfarkt under de senaste två månaderna**
- om du får bröstsmärta förknippad med hjärtat även i vila eller med minimal anstränging (**instabil angina pectoris**)
- om du har hjärtsvikt som inte har stabiliserats genom medicinska åtgärder (**dekompenserad hjärtsvikt**)
- om du har allvarliga hjärtproblem
- om du är **gravid**.

Varningar och försiktighet

Tala med läkaren om du har eller har haft något av följande sjukdomstillstånd:

- leverproblem
- hjärtproblem (t.ex. snabba hjärtslag, högt och/eller lågt blodtryck)

Om du är osäker på om något av ovanstående gäller dig, diskutera detta med din läkare.

Andra läkemedel och Felodipin Hexal

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Vissa andra läkemedel kan påverka eller påverkas av Felodipin Hexal.

Sådana läkemedel är t.ex.:

- takrolimus (läkemedel som används efter organtransplantation)
- digoxin (läkemedel för att förstärka hjärtats kapacitet).

Läkemedel som kan öka mängden felodipin i blodet:

- cimetidin (ett läkemedel mot magsår)
- erytromycin (antibiotikum)
- ketokonazol eller itrakonazol (svampmedel)
- HIV-proteashämmare (antiviral läkemedel för behandling av HIV, t.ex. ritonavir).

Läkemedel som kan minska mängden felodipin i blodet:

- fenytoin, karbamazepin eller fenobarbital (läkemedel mot epilepsi)
- barbiturater (lugnande medel och läkemedel som används vid behandling av epilepsi)
- rifampicin (antibiotikum)
- efivarens eller nevirapin (för behandling av HIV)
- naturmedel som innehåller extrakt av Johannesört (*Hypericum perforatum*).

Läkemedel som kan öka effekten av Felodipin Hexal:

- andra läkemedel som används vid behandling av högt blodtryck, t.ex. beta-blockerare, ACE-hämmare och urindrivande medel
- läkemedel mot depressioner (tricykliska antidepressiva)
- hydroklortiazid (urindrivande medel).

Felodipin Hexal med mat och dryck

Samtidigt intag av grapefrukt eller grapefruktjuice påverkar effekten av Felodipin Hexal och ska undvikas.

Graviditet och amning

- **Ta inte** Felodipin Hexal om du är gravid. Graviditet måste uteslutas innan behandlingen med Felodipin Hexal påbörjas.
- Användning av Felodipin Hexal rekommenderas inte till ammande kvinnor.

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Körförmåga och användning av maskiner

Om du känner dig yr när du har tagit detta läkemedel ska du inte köra eller använda verktyg eller maskiner.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Felodipin Hexal innehåller laktos

Om din läkare har talat om för dig att du inte tål vissa sockerarter ska du kontakta din läkare innan du

börjar använda denna medicin.

3. Hur du använder Felodipin Hexal

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Felodipin Hexal ska tas en gång dagligen. Svälj tabletterna hela, utan att tugga eller krossa dem, tillsammans med ett glas vatten. Tabletterna kan tas på fastande mage eller tillsammans med en lätt måltid, men måltid med högt fettinnehåll bör undvikas.

Tabletterna får inte delas.

Rekommenderad startdos är 5 mg en gång dagligen. Vid behov kan din läkare öka dosen till 10 mg en gång dagligen.

Maximal daglig dos är 10 mg.

Barn och ungdomar (under 18 år)

Erfarenheten av att använda Felodipin Hexal till barn (under 18 år) är begränsad. Felodipin Hexal ska därför inte ges till barn

Äldre patienter

Den rekommenderade startdosen bör justeras. För en dos på 2,5 mg ska ett läkemedel med lämplig styrka användas.

Nedsatt leverfunktion

Dosen bör anpassas enligt läkarens ordination.

Om du har tagit för stor mängd av Felodipin Hexal

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (i Sverige tel. 112, i Finland tel. (09) 471 977) för bedömning av risken samt rådgivning. Ta med denna bipacksedel eller några tabletter så att de kan se vad du har tagit.

Personen ifråga ska ligga ned med armar och ben i högläge (vilande t.ex. på några kuddar). Symtom på överdosering är: extrem yrsel och/eller en känsla av att det snurrar runt i huvudet orsakat av mycket lågt blodtryck, andningsproblem och behov av att kissa mycket ofta.

Om du har glömt att ta Felodipin Hexal

Ta den glömda dosen så snart du kommer ihåg det men ta aldrig två doser på samma dag.

Om du slutar att använda Felodipin Hexal

Din läkare har talat om för dig hur länge du ska ta Felodipin Hexal. Om du avbryter behandlingen plötsligt kan dina symtom komma tillbaka. Avsluta inte behandlingen tidigare än överenskommet utan att diskutera detta med din läkare.

Felodipin Hexal används oftast som långtidsbehandling.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

Om något av följande skulle hända dig ska du sluta ta Felodipin Hexal och omedelbart kontakta läkare:

- bröstmärtnor och yrsel som kommer samtidigt
- en allergisk reaktion. Tecknen kan vara upphöjda utslag på huden eller svullnad av ansikte, läppar, mun, tunga eller svalg

Andra eventuella biverkningar:

Mycket vanliga, kan förekomma hos fler än 1 av 10 patienter

- perifert ödem (graden av ankelsvullnad beror på dosen).

Vanliga, kan förekomma hos upp till 1 av 10 patienter

- huvudvärk
- värmevallning.

Mindre vanliga, kan förekomma hos upp till 1 av 100 patienter

- yrsel
- trötthet
- svimning
- bultande hjärtslag
- snabbare hjärtslag
- rastlöshet
- myrkrypningar
- magtarmsbesvär (t.ex. illamående, diarré, förstoppning, buksmärtnor)
- viktökning
- svettning
- hud- och överkänslighetsreaktioner som klåda
- utslag.

Sällsynta, kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 patienter

- svimning
- ledvärk
- kräkningar
- muskelsmärtnor
- erektionsproblem, sexuell dysfunktion
- kliande utslag.

Mycket sällsynta, kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 patienter

- inflammation och svullnad i tandköttet, vilket kan undvikas eller minskas genom god munhygien
- rubbningar i leverfunktionen (förhöjda transaminaser)
- ljuskänslighet
- inflammation i blodkärlen orsakade av vita blodkroppar (s.k. leukocytoklastisk vaskulit)
- feber
- ökat behov av att kissa
- förstörade bröst hos män
- onormalt kraftig menstruation.

I början av behandlingen eller om dosen ökas kan du få följande biverkningar:

- Värmevallningar, huvudvärk, snabbare eller bultande hjärtslag, yrsel eller trötthet.

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information

5. Hur Felodipin Hexal ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

- Den aktiva substansen är felodipin. En tablett innehåller 5 mg eller 10 mg felodipin.
- Övriga innehållsämnen är mikrokristallin cellulosa, laktosmonohydrat, natriumlaurilsulfat, hypromellos, magnesiumstearat, makrogol 4000, gul järnoxid (E172), röd järnoxid (E172) och titandioxid (E171).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Felodipin Hexal 5 mg är en ljusröd till gråröd, rund, bikonvex tablett, märkt F5 på den ena sidan.

Felodipin Hexal 10 mg är en ljusröd till gråröd, rund, bikonvex tablett, märkt F10 på den ena sidan.

Förpackningsstorlekar:

5 mg: 7, 14, 20, 28, 30, 50, 50x1, 98, 100, 100x1 och 250 depottabletter.

10 mg: 7, 14, 20, 28, 30, 50, 50x1, 98, 100, 100x1 och 250 depottabletter.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning

HEXAL A/S, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 Köpenhamn S, Danmark

Tillverkare

Salutas Pharma GmbH, Otto-von-Quericke-Allee 1, D-39179 Barleben, Tyskland

Denna bipacksedel ändrades senast den 2012.10.23 i Sverige

Denna bipacksedel ändrades senast den 23.10.2012 i Finland