

Pakkauseloste: Tietoa käyttäjälle

**Lipcut 5 mg tabletti, kalvopäälysteinen
Lipcut 10 mg tabletti, kalvopäälysteinen
Lipcut 20 mg tabletti, kalvopäälysteinen
Lipcut 30 mg tabletti, kalvopäälysteinen
Lipcut 40 mg tabletti, kalvopäälysteinen
Lipcut 60 mg tabletti, kalvopäälysteinen
Lipcut 80 mg tabletti, kalvopäälysteinen**

simvastatiini

Lue tämä pakkauseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

- Säilytä tämä pakkauseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
- Jos sinulla on kysyttävä, käännny lääkärin tai apteekkienkilökunnan puoleen.
- Tämä lääke on määritty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
- Jos havaitset haittavaikutuksia, käännny lääkärin tai apteekkienkilökunnan puoleen. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkauselosteessa. Ks. kohta 4.

Tässä pakkauselosteessa kerrotaan

1. Mitä Lipcut on ja mihin sitä käytetään
2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Lipcut-valmistetta
3. Miten Lipcut-valmistetta käytetään
4. Mahdolliset haittavaikutukset
5. Lipcut-valmisteen säilyttäminen
6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä Lipcut on ja mihin sitä käytetään

Lipcut-valmistetta käytetään veren kokonaiskolesterolipitoisuuden, ”huonon” kolesterolin (LDL-kolesterolin) ja veren rasvojen, eli triglyceridien, pienentämiseksi. Tämän lisäksi Lipcut suurentaa ”hyvän” kolesterolin (HDL-kolesterolin) määrää veressä. Lipcut kuuluu statiinien lääkeaineryhmään.

Kolesteroli on yksi monista verenkierrossa olevista rasvoista. Kokonaiskolesterolisi muodostuu pääasiassa LDL- ja HDL-kolesterolista.

LDL-kolesterolia kutsutaan usein ”huonoksi” kolesteroliksi, koska se voi kerääntyä valtimoiden seinämiin muodostaen plakin. Lopulta plakin muodostus voi johtaa valtimoiden ahtautumiseen. Ahtautuminen voi hidastaa tai tukkia verenvirtauksen elintärkeisiin elimiin kuten sydämeen ja aivoihin. Verenvirtauksen estyminen voi johtaa sydän- tai aivoinfarktiin.

HDL-kolesterolia kutsutaan usein ”hyväksi” kolesteroliksi, koska se estää huonon kolesterolin kerääntymistä valtimoihin ja ehkäisee sydänsairauksia.

Triglyceridit ovat toinen muoto verenrasvoista, jotka voivat lisätä sydänsairauksien riskiä.

Tämän lääkehoidon aikana sinun on jatkettava kolesterolia alentavan ruokavaliohoidon noudattamista.

Lipcut-valmistetta käytetään yhdessä kolesterolia alentavan ruokavaliohoidon kanssa, jos:

- kolesteroliarvosi (primaarinen hyperkolesterolemia) tai veresi rasva-arvot (sekamuotoinen hyperlipidemia) ovat kohonneet
- sinulla on perinnöllinen, veren kolesteroliarvoja suurentava sairaus (homotsygoottinen, familiaalinen hyperkolesterolemia). Tässä tapauksessa sinulle saatetaan määräätä myös muuta hoitoa Lipcut-valmisteen lisäksi.
- sinulla on sepelvaltimotauti tai olet vaarassa sairastua siihen (koska sinulla on diabetes, olet sairastanut aivohalvauksen tai sinulla on jokin muu verisuonisairaus). Lipcut voi pidentää elinikääsi vähentämällä sydänsairauksien vaaraa, riippumatta veresi kolesterolipitoisuudesta.

Yleensä korkeat veren kolesteroliarvot eivät aiheuta minkäänlaisia äkillisiä oireita. Lääkäri voi määrittää kolesteroliarvosi yksinkertaisella verikokeella. Käy lääkärin vastaanotolla säännöllisesti, huolehdi kolesteroliarvosi seurannasta, ja keskustele hoidostasi ja sen tavoitteista lääkärin kanssa.

Simvastatiinia, jota Lipcut sisältää, voidaan joskus käyttää myös muiden kuin tässä pakkausselosteessa mainittujen sairauksien hoitoon. Kysy neuvoa lääkäriltä, apteekkihenkilökunnalta tai muulta terveydenhuollon ammattilaiselta tarvittaessa ja noudata aina heiltä saamiasi ohjeita

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Lipcut-valmistetta

Älä käytä Lipcut-valmistetta

- jos olet allerginen simvastatiinille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6)
- jos sinulla on jokin maksasairaus
- jos olet raskaana tai imetät
- jos käytät yhtä tai useampaa seuraavista lääkkeistä, joiden vaikuttava aine on:
 - itrakonatsoli, ketokonatsoli, posakonatsoli tai vorikonatsoli (käytetään sieni-infektioiden hoitoon)
 - erytromysiini, klaritromysiini tai telitromysiini (käytetään infektioiden hoitoon)
 - HIV-proteasinestäjät, kuten indinaviiri, nelfinaviiri, ritonaviiri ja saknaviiri (HIV-proteasinestäjää käytetään HIV-infektioiden hoitoon)
 - bosepreviiri tai telapreviiri (käytetään hepatiitti C -virusinfektioiden hoitoon)
 - nefatsodoni (käytetään masennuksen hoitoon)
 - kobisistaatti
 - gemfibrotsili (käytetään alentamaan kolesteroliarvoja)
 - siklosporiini (käytetään elinsiirtopotilaille)
 - danatsoli (keinotekoinen hormoni, jota käytetään endometrioosin hoitoon. Tila, jossa kohdun limakalvo kasvaa kohdun ulkopuolella)
- jos käytät tai olet viimeisten 7 päivän aikana käyttänyt fusidiinihappoa (bakteeri-infektiolääke) suun kautta tai injektiona. Fusidiinihapon ja Lipcut-valmisteen samanaikainen käyttö voi aiheuttaa vakavia lihasvaivoja (rabdomolyysin).

Älä käytä Lipcut-valmistetta enemmän kuin 40 mg, mikäli käytät samanaikaisesti lomitapidia (käytetään vakavan ja harvinaisen perinnöllisen kolesterolisairauden hoitoon).

Kysy lääkäriltä, ellet ole varma, onko lääkkeesi lueteltu yllä olevassa listassa.

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin käytät Lipcut-valmistetta:

- kaikista sairauksistasi ja mahdollisista allergioistasi.

- jos käytät runsaasti alkoholia.
- jos sinulla on tai on ollut jokin maksasairaus. Tällöin Lipcut ei ehkä sovi sinulle.
- jos olet menossa ennalta suunniteltuun leikkaukseen. Voi olla, että Lipcut-lääkityksesi on keskeytettävä joksikin aikaa.
- jos olet aasiaista syntyperää, sillä saatat tarvita erilaisen annoksen.

Lääkärin pitää otattaa sinulta verinäyte ennen Lipcut-hoidon aloittamista ja jos sinulla on oireita maksan toimintahäiriöstä Lipcut-hoidon aikana. Tämän verikokeen tarkoituksena on tarkistaa maksasi toiminta.

Lääkäri saattaa myös tarvita toisen verinäytteen tarkistaakseen, miten maksasi toimii sen jälkeen, kun olet aloittanut Lipcut-hoidon.

Jos sinulla on diabetes tai kuulut riskiryhmään, läääkäri seuraa tilannettasi tarkasti tämän lääkkeen käytön aikana. Kuulut riskiryhmään, jos sinulla on kohonnut verensokeritaso, kohonneet veren rasva-arvot, olet ylipainoinen ja sinulla on korkea verenpaine.

Kerro läääkärille, jos sinulla on vaikea keuhkosairaus.

Ota heti yhteys läääkäriin, jos sinulle ilmaantuu selittämätöntä lihassärkyä, -arkuutta tai -heikkoutta. Lihasoireet voivat nimittäin joissakin harvoissa tapauksissa olla vakavia, ja niihin saattaa liittyä lihaskudoksen hajoamista, mikä puolestaan voi johtaa munuaisvauroihin. Hyvin harvoissa tapauksissa nämä oireet ovat johtaneet potilaan kuolemaan.

Kerro läääkärille tai apteekkikenkilökunnalle myös, jos sinulla on jatkuva lihasheikkoutta. Lisätutkimukset ja muut lääkkeet voivat olla tarpeen tilasi diagnostiseksi ja hoitamiseksi.

Lihaskudoksen hajoamisen vaara on suurempi käytettäessä suurempia Lipcut-annoksia, etenkin 80 mg:n annosta. Lihaskudoksen hajoamisen vaara on myös suurempi tietyillä potilailla. Keskustele läääkärin kanssa, jos jokin seuraavista koskee sinua:

- käytät runsaasti alkoholia
- sinulla on jokin munuaissairaus
- sinulla on jokin kilpirauhassairaus
- olet 65-vuotias tai sitä vanhempi
- olet nainen
- jokin aikaisempi kolesterolilääkitys statiineihin tai fibraatteihin kuuluvalla lääkkeellä on aiheuttanut lihasvaivoja
- sinulla tai lähisukulaisella on jokin perinnöllinen lihassairaus.

Lapset ja nuoret

Simvastatiinin turvallisuutta ja tehoa on tutkittu 10–17-vuotiaiden poikien sekä tyttöjen, joiden kuukautisten alkamisesta on vähintään vuosi (ks. kohta 3 Miten Lipcut-valmistetta käytetään), hoidossa. Simvastatiinia ei ole tutkittu alle 10-vuotiaiden lasten hoidossa. Käännny läääkärin puoleen, jos haluat lisätietoja.

Muut lääkevalmisteet ja Lipcut

Kerro läääkärille tai apteekkikenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat joutua käyttämään muita lääkeitä.

On erityisen tärkeää kertoa läääkärille, jos käytät lääkeitä, joiden vaikuttava aine on jokin seuraavista. Lipcut-valmisten käyttö yhdessä näiden lääkkeiden kanssa voi lisätä lihasoireiden vaaraa (osa näistä on jo mainittu yllä olevassa kappaleessa ”Älä käytä Lipcut-valmistetta”):

- Jos sinun on otettava fusidiinihappoa suun kautta bakteeri-infektion hoitoon, sinun on lopetettava tämän lääkkeen käyttö tilapäisesti. Lääkäri kertoo sinulle, milloin Lipcut-valmistetta on taas turvallista ottaa. Lipcut-valmisten ottaminen samanaikaisesti fusidiinihapon kanssa voi harvinaisissa tapauksissa aiheuttaa lihasheikkoutta, -arkuutta tai -kipua (rhabdomyolyysi). Katso lisätietoja rhabdomyolyysistä kohdasta 4.
- siklosporiini (käytetään usein elinsiirtotilaille)
- danatsoli (synteettinen hormoni, jota käytetään endometrioosin hoitoon. Tila, jossa kohdun limakalvo kasvaa kohdun ulkopuolella)
- lääkkeet, joiden vaikuttava aine on esim. itrakonatsoli, ketokonatsoli, flukonatsoli, posakonatsoli tai vorikonatsoli (käytetään sieni-infektioiden hoitoon)
- fibraatit, joiden vaikuttava aine on esim. gemfibroosiili tai betsafibraatti (käytetään alentamaan kolesteroliarvoja)
- erytromysiini, klaritromysiini tai telitromysiini (käytetään bakteritulehdusten hoitoon)
- HIV-proteasainestäjät, kuten indinaviiri, nelfinaviiri, ritonaviiri ja sakinaviiri (käytetään HIV-infektioiden hoitoon)
- hepatiitti C -viruslääkkeet, kuten bosepreviiri, telapreviiri, elbasviiri tai gratsopreviiri (käytetään hepatiitti C -virusinfektioiden hoitoon)
- nefatsodoni (käytetään masennuksen hoitoon)
- lääkkeet, joiden vaikuttava aine on kobisiaattia
- amiodaroni (käytetään sydämen rytmihäiriöiden hoitoon)
- verapamiili, diltiatseemi tai amlodipiini (käytetään korkean verenpaineen, sydänsairauksiin liittyvän rintakivun ja muiden sydänsairauksien hoitoon)
- lomitapidi (käytetään vakavan ja harvinaisen perinnöllisen kolesterolisairauden hoitoon)
- kolkisiini (käytetään kihdin hoitoon).

Kerro lääkärille tai apteekkienkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt muita lääkeitä, myös lääkeitä, joita lääkäri ei ole määränyt. Muista etenkin mainita, jos käytät lääkeitä, joiden vaikuttava aine on jokin seuraavista:

- lääkeitä, joiden vaikuttava aine estää veren hyytymistä, kuten varfariini, fenprokumoni tai asenokumaroli (antikoagulantteja)
- fenofibraatti (käytetään myös alentamaan kolesteroliarvoja)
- niasiini (käytetään myös alentamaan kolesteroliarvoja)
- rifampisiini (käytetään tuberkuloosin hoitoon).

Sinun tulisi myös kertoa jokaiselle lääkärille, joka määräää sinulle uutta lääkettä, että käytät Lipcut-valmistetta.

Lipcut ruuan, juoman ja alkoholin kanssa

Greippimehu sisältää yhtä tai useampaa ainetta, jotka vaikuttavat joidenkin lääkkeiden (mm. Lipcut-valmisten) käyttöön elimistössä, ja siksi greippimehun juomista on syytä välttää.

Kerro lääkärillesi, jos käytät runsaasti alkoholia.

Raskaus ja imetys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai aptekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Älä käytä Lipcut-valmistetta, jos olet tai epäilet olevasi raskaana tai yrität tulla raskaaksi. Jos tulet raskaaksi Lipcut-hoidon aikana, lopeta heti Lipcut-valmisten käyttö ja ota yhteys lääkäriin. Älä käytä Lipcut-valmistetta imetyksen aikana, sillä lääkeaineen mahdollisesta erittymisestä äidinmaitoon ei ole tietoa.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Lipcut-valmisteella ei oleteta olevan suoranaista vaikutusta ajokykyysi eikä kykyysi käyttää koneita. Huomioi kuitenkin, että Lipcut voi aiheuttaa huimausta joillekin käyttäjille.

Lipcut kalvopäällysteiset tabletit sisältävät laktoosia

Jos lääkäri on kertonut, että sinulla on jokin sokeri-intoleranssi, keskustele lääkäri kanssa ennen tämän lääkkeen ottamista.

3. Miten Lipcut-valmistetta käytetään

Lääkäri määräää sinulle sopivan tablettivahvuuden sairautesi, nykyisen hoitosi ja henkilökohtaisen riskin perusteella.

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määränyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Jatka kolesterolia alentavan ruokavaliohoidon noudattamista Lipcut-hoidon aikanakin.

Suositeltu annos on yksi tabletti suun kautta, kerran vuorokaudessa.

Aikuiset:

Tavanomainen aloitusannos on 10 mg tai 20 mg, joskus myös 40 mg, vuorokaudessa. Lääkäri saattaa suurentaa annostasi aina 80 mg:aan asti. Annosmuutosten välissä on kuitenkin aina oltava vähintään neljä viikkoa. **Älä koskaan ylitä 80 mg:n vuorokausiannosta.**

Lääkäri voi myös määräätä pienempiä annoksia, varsinkin, jos käytät jotakin edellä mainituista lääkkeistä tai sairastat tietynlaita munuaissairautta.

80 mg:n annostusta suositellaan ainoastaan aikuisille potilaille, joiden kolesteroliarvot ovat erityisen korkeat ja joiden riski sairastua sydänsairauksiin on suuri ja joille toivottua hoitolulosta ei ole saatu pienemmillä annoksilla.

Käyttö lapsille ja nuorille:

Tavanomainen suositeltu aloitusannos lapsille (10–17-vuotialle) on 10 mg vuorokaudessa iltaisin. Suurin suositeltu annos on 40 mg vuorokaudessa.

Antotapa ja hoidon kesto:

Ota Lipcut-tabletit iltaisin. Voit ottaa lääkkeen joko ruuan kanssa tai muuna aikana. Jatka Lipcut-hoitoa niin kauan kuin lääkäri näin määräää.

Tabletin voi jakaa yhtä suuriin annoksiin.

Jos lääkäri on määränyt sinua käyttämään Lipcut-valmistetta yhdessä toisen kolesterolia alentavan lääkkeen, joka sitoo sappihappoa, kanssa, Lipcut-tabletti tulee ottaa viimeistään kaksi tuntia ennen tämän toisen lääkkeen ottamista tai vähintään neljä tuntia sen jälkeen.

Jos otat enemmän Lipcut-valmistetta kuin sinun pitäisi

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 09 471 977) riskien arvioimiseksi ja lisähohjeiden saamiseksi. Yliannostustapauksessa lääkäri on käytettävä oireenmukaista ja elintoimintoja ylläpitävää hoitoa.

Jos unohdat ottaa Lipcut-valmistetta

Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi annoksen, vaan jatka hoitoa sinulle määrityn annostuksen mukaisesti.

Jos lopetat Lipcut-valmisteen käytön

Keskustele lääkärin tai apteekkienkilökunnan kanssa, koska kolesteroliarvosi voivat taas nousta.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkienkilökunnan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Jos saat jonkun alla luetelluista vakavista haittavaikutuksista, lopeta lääkkeen käyttö ja ota välittömästi yhteys lääkäriin tai lähimmään sairaalan ensiapuun.

Seuraavia vakavia haittavaikutuksia on raportoitu harvoin:

- lihassärky, -arkuus, -heikkous ja -krampit. Nämä haittavaikutukset saattavat joissakin harvoissa tapauksissa olla vakavia, jolloin niihin liittyy lihaskudoksen tuhoutumista ja sen seurauksena munuaisvaarioita. Hyvin harvoin oireet ovat myös johtaneet potilaan kuolemaan.
- yliherkkyyys, eli allergiset reaktiot, kuten:
 - kasvojen, kielen ja nielun turvotus, joka voi aiheuttaa hengitysvaikeuksia (angioedeema)
 - kova lihaskipu, jota useimmiten ilmenee hartioissa ja lonkissa
 - ihottuma, johon liittyy heikkoutta rajojen ja niskan lihaksissa
 - nivelsärky tai -tulehdus (polymyalgia rheumatica)
 - verisuonitulehdus (vaskuliitti)
 - epätavalliset mustelmat, ihottuma ja turvotus (dermatomyosiitti), nokkosihottuma, ihmenviljelyherkkyyys, kuume, punoitus
 - hengenahdistus (dyspnea) ja sairauden tunne
 - lupustyypiset oireet (mukaan lukien ihottuma, niveloireet ja veriarvomuutokset)
- maksatulehdus, johon liittyy seuraavia oireita: ihmenviljelyherkkyyys, kuume, punoitus
- haimatulehdus, johon usein liittyy kovaa vatsakipua.

Seuraavaa vakavaa haittavaikutusta on raportoitu hyvin harvoin:

- vakava allerginen reaktio, joka aiheuttaa hengitysvaikeuksia tai heitehuimausta (anafylaksi).

Seuraavia haittavaikutuksia on myös raportoitu:

Harvinaiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 1000:sta):

- alhainen veren punasolujen määrä (anemia)
- käsi- ja jalkojen tunnottomuus tai heikkous
- päänsärky, pistelyn tunne, huimaus
- ruoansulatuskanavan oireet (vatsakipu, ummetus, ilmavaivat, ruoansulatushäiriöt, ripuli, pahoinvoiointi, oksentelu)
- ihottuma, kutina, hiustenlähtö
- heikkous

- maksan toimintaa kuvaavien ja tiettyä lihasentsyymiä (kreatiinikinaasia) mittaavien verikokeiden tulosten kohoaaminen
- muistinmenetys, sekavuus.

Hyvin harvinainen (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 10 000:sta):

- unettomuus
- muistin heikkeneminen.

Tuntematon (esiintymistihyytä ei voida arvioida saatavissa olevan tiedon perusteella):

- erektohääriö
- masennus
- tulehdus keuhkoissa, joka aiheuttaa hengitysvaikeuksia mukaan lukien itsepintainen yskä ja/tai hengenahdistus tai kuume
- jänteiden ongelmat, johon liittyy joskus myös jänteen repeämä
- jatkuva lihasheikkous.

Joillakin statiineilla raportoituja muita mahdollisia haittavaikutuksia:

- unihääriöt, mukaan lukien painajaiset
- seksuaaliset toimintahääriöt
- diabetes. Esiintyminen on todennäköisempää, jos sinulla on kohonnut verensokeritaso ja rasva-arvot, olet ylipainoinen ja sinulla on korkea verenpaine. Lääkäri seuraa tilannettasi tämän lääkkeen käytön aikana.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkienhenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa.

Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

FI-00034 Fimea

5. Lipcut-valmisten säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tästä läkettä läpipainolevyssä tai pakauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen ("EXP" tai "Käyt.viim.") jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Säilytä alle 30 °C.

Läpipainopakkaus:

Pidä läpipainoliuskat ulkopakkauksessa. Herkkä valolle.

Tablettipurkki:

Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä valolle.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Nämä menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Lipcut sisältää

- Vaikuttava aine on simvastatiini. Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 5 mg, 10 mg, 20 mg, 30 mg, 40 mg, 60 mg tai 80 mg simvastatiinia.
- Muut aineet ovat:
Tabletin ydin:
Lipcut 5 mg, 10 mg, 30 mg, 60 mg ja 80 mg: tärkkelys, esigelatinoitu, laktoosimonohydraatti, selluloosa, mikrokiteinen, butyylihydroksianisol (E320), askorbiinihappo (E300), sitruunahappomonohydraatti (E330), magnesiumstearaatti.

Lipcut 20 mg ja 40 mg: tärkkelys, esigelatinoitu, laktoosimonohydraatti, selluloosa, mikrokiteinen, butyylihydroksianisol (E320), sitruunahappomonohydraatti (E330), magnesiumstearaatti.

Tabletin kalvopäällyste:

Lipcut 5 mg: hypromelloosi, talkki, titaanidioksidi (E171), keltainen rautaoksi (E172).

Lipcut 10 mg ja 20 mg: hypromelloosi, talkki, titaanidioksidi (E171), keltainen rautaoksi (E172), punainen rautaoksi (E172).

Lipcut 30 mg: hypromelloosi, talkki, titaanidioksidi (E171).

Lipcut 40 mg: hypromelloosi, talkki, titaanidioksidi (E171), punainen rautaoksi (E172).

Lipcut 60 mg: hypromelloosi, talkki, titaanidioksidi (E171), indigokarmiini, alumiinisuola (E132).

Lipcut 80 mg: hypromelloosi, talkki, titaanidioksidi (E171), indigokarmiini, alumiinisuola (E132), kinoliinikeltainen (E104).

Jos lääkäri on kertonut, että sinulla on jokin sokeri-intoleranssi, keskustele lääkäri kanssa ennen tämän lääkevalmisteen ottamista.

Lääkevalmisten kuvaus ja pakkauskoot

Lipcut 5 mg on keltainen, kalvopäällysteinen, soikea, jakouurrettu, kupera tabletti, jossa toisella puolella merkintä SIM 5.

Lipcut 10 mg on vaalea roosavärisiin, kalvopäällysteinen, soikea, jakouurrettu, kupera tabletti, jossa toisella puolella merkintä SIM 10.

Lipcut 20 mg on oranssi, kalvopäällysteinen, soikea, kaksoiskupera tabletti, jossa on jakouurre molemmilla puolilla ja toisella puolella merkintä 20.

Lipcut 30 mg on valkoinen, kalvopäällysteinen, soikea, jakouurrettu, kupera tabletti, jossa toisella puolella merkintä SIM 30.

Lipcut 40 mg on punaruskea, kalvopäällysteinen, soikea, kaksoiskupera tabletti, jossa on jakouurre molemmilla puolilla ja toisella puolella merkintä 40.

Lipcut 60 mg on vaaleansininen, kalvopäällysteinen, soikea, jakouurrettu, kupera tabletti, jossa toisella puolella merkintä SIM 60.

Lipcut 80 mg on vaaleanvihreä, kalvopäällysteinen, soikea, jakouurrettu, kupera tabletti, jossa toisella puolella merkintä SIM 80.

Tabletit voidaan jakaa kahteen yhtä suuriin annoksiin.

Pakkauskoot:

Läpipainopakkaus (Alumiini/PVC):

5 mg, 10 mg, 20 mg, 30 mg, 40 mg ja 80 mg: 7, 10, 14, 20, 21, 28, 30, 35, 40, 42, 49, 50, 50 x 1, 56, 63, 70, 77, 84, 91, 98 ja 100 kalvopäällysteistä tablettia.

60 mg: 7, 10, 14, 20, 21, 28, 30, 35, 42, 49, 50, 56, 63, 70, 77, 84, 91, 98 ja 100 kalvopäällysteistä tablettia.

Polyeteenitablettipurkki, jossa kierrekorkki:

5 mg, 10 mg, 20 mg, 30 mg, 40 mg ja 80 mg: 10, 20, 28, 30, 40, 50, 100 ja 250 kalvopäällysteistä tablettia.

60 mg: 10, 20, 28, 30, 49, 50, 98 ja 100 kalvopäällysteistä tablettia.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Myyntiluvan haltija

Sandoz A/S, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 Kööpenhamina S, Tanska

Valmistaja

Lek Pharmaceuticals d.d., Verovškova 57, 1526 Ljubljana, Slovenia

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi

28.03.2018

Bipacksedel: Information till användaren

**Lipcut 5 mg tablett, filmdragerad
Lipcut 10 mg tablett, filmdragerad
Lipcut 20 mg tablett, filmdragerad
Lipcut 30 mg tablett, filmdragerad
Lipcut 40 mg tablett, filmdragerad
Lipcut 60 mg tablett, filmdragerad
Lipcut 80 mg tablett, filmdragerad**

simvastatin

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.
- Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.
- Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande

1. Vad Lipcut är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Lipcut
3. Hur du använder Lipcut
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Lipcut ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Lipcut är och vad det används för

Lipcut är ett läkemedel som används för att sänka nivåerna av totalkolesterol och ”ont” kolesterol (LDL-kolesterol) i blodet, samt nivåerna av blodfetter, så kallade triglycerider. Lipcut ökar dessutom nivåerna av ”gott” kolesterol (HDL-kolesterol) i blodet. Lipcut tillhör en grupp av läkemedel som kallas statiner.

Kolesterol är ett av flera fetter som finns i ditt blod. Ditt totalkolesterol består huvudsakligen av LDL- och HDL-kolesterol.

LDL-kolesterol kallas ofta det ”onda” kolesterol eftersom det orsakar fettinlagring i dina kärlväggar och bildar plack. Denna plack inlagring kan så småningom leda till en förträngning av dina kärl. Denna förträngning kan minska eller blockera blodflödet till viktiga organ som hjärta och hjärna. Blockad av blodflödet kan resultera i en hjärtinfarkt eller stroke.

HDL-kolesterol kallas ofta det ”goda” kolesterol eftersom det hjälper till att förhindra det ”onda” kolesterol från att lagras i kärlen och skyddar mot hjärtsjukdom.

Triglycerider är en annan typ av fett i blodet som kan öka risken för hjärtsjukdom.

Du ska fortsätta med kolesterolssänkande kost under tiden du tar detta läkemedel.

Lipcut används som tillägg till din kolesterolsänkande kost om du har:

- förhöjda kolesterolnivåer i blodet (primär hyperkolesterolemia) eller förhöjda blodfetter (kombinerad hyperlipidemi)
- en ärftlig sjukdom (homozygot familjär hyperkolesterolemia) som ger förhöjda kolesterolnivåer i blodet. I detta fall kan läkaren även ordinera dig annan behandling utöver Lipcut.
- kranskärlssjukdom eller om du löper hög risk att utveckla kranskärlssjukdom (på grund av att du har diabetes, tidigare haft slaganfall eller andra kärlsjukdomar). En behandling med Lipcut kan ge förlängd överlevnad genom att minska risken för utvecklande av hjärtsjukdomar, oavsett kolesterolmängden i ditt blod.

I allmänhet ger höga kolesterolnivåer i blodet inga omedelbara symtom. Din läkare kan mäta din kolesterolnivå med ett enkelt blodprov. Besök din läkare regelbundet, följ upp din kolesterolnivå och diskutera din behandling och dess mål med din läkare.

Simvastatin som finns i Lipcut kan också vara godkänt för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2. Vad du behöver veta innan du använder Lipcut

Använd inte Lipcut

- om du är allergisk mot simvastatin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).
- om du har någon leversjukdom
- om du är gravid eller ammar
- om du använder läkemedel med ett eller flera av följande aktiva innehållsämnen:
 - itrakonazol, ketokonazol, posaconazol eller vorikonazol (använts vid behandling av svampinfektioner)
 - erytromycin, klaritromycin eller telitromycin (använts vid behandling av infektioner)
 - HIV-proteashämmare som indinavir, nelfinavir, ritonavir och sakvinavir (HIV-proteashämmare används vid HIV-infektioner)
 - boceprevir eller telaprevir (använts vid behandling av hepatit C-virusinfektioner)
 - nefazodon (använts vid behandling av depression)
 - kobicistat
 - gemfibrozil (använts för att sänka kolesterolnivån)
 - ciklosporin (använts hos organtransplanterade patienter)
 - danazol (ett syntetiskt hormon som används för att behandla endometrios, ett tillstånd där livmoderslembhinnan växer utanför livmodern).
- om du tar eller under de senaste 7 dagarna har tagit ett läkemedel som kallas fusidinsyra (ett läkemedel mot bakteriella infektioner) antingen via munnen eller via injektion. Kombinationen av fusidinsyra och Lipcut kan leda till allvarliga muskelproblem (rabdomolyse).

Ta inte mer än 40 mg Lipcut om du tar lomitapid (använts för att behandla ett allvarligt och sällsynt genetiskt kolesterol tillstånd).

Rådfråga läkare om du är osäker om ditt läkemedel finns listat ovan.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Lipcut.

- om alla dina medicinska besvär, även allergier.

- om du har en hög alkoholkonsumtion.
- om du har eller tidigare har haft någon leversjukdom. Lipcut kanske inte är rätt läkemedel för dig.
- om du ska genomgå ett kirurgiskt ingrepp. Behandlingsuppehåll med Lipcut kan behöva göras under en kortare tid.
- om du är asiat, då en annan dos kan gälla för dig.

Läkaren bör ta ett blodprov innan du börjar använda Lipcut, samt om du har några symtom på leverbesvär under behandling med Lipcut. Detta blodprov tas för att kontrollera din leverfunktion.

Läkaren kan också behöva ta ett blodprov för att kontrollera din leverfunktion efter att du börjat använda Lipcut.

Under behandlingen med detta läkemedel kommer läkaren att kontrollera dig noggrant om du har diabetes eller löper risk att få diabetes. Det är mer troligt att du löper risk att få diabetes om du har höga blodsocker- och blodfettnivåer, är överviktig och har högt blodtryck.

Tala om för din läkare om du har någon allvarlig lungsjukdom.

Kontakta läkare omedelbart om du får oförklarlig muskelvärk, -ömhet eller -svaghet. Anledningen till detta är att i sällsynta fall kan muskelbesvär vara allvarliga och innehära nedbrytning av muskelvävnad med njurskada som följd och dödsfall har förekommit i mycket sällsynta fall.

Tala också om för läkare eller apotekspersonal om du har kontinuerlig muskelsvaghet. Ytterligare tester och läkemedel kan behövas för diagnos och behandling av detta.

Risken för nedbrytning av muskler är större vid högre doser av Lipcut, gäller särskilt för dosen 80 mg. Risken för nedbrytning av muskler är också större hos vissa patienter. Tala med din läkare om något av följande gäller för dig:

- du har en hög alkoholkonsumtion
- du har njurbesvär
- du har besvär med sköldkörteln
- du är 65 år eller äldre
- du är kvinna
- om du någonsin har haft muskelproblem under behandling med kolesterolsänkande läkemedel, så kallade ”statiner” eller fibrater
- du eller någon nära släkting till dig har en ärftlig muskelsjukdom.

Barn och ungdomar

Säkerhet och effekt av simvastatin har studerats hos pojkar i åldern 10–17 år och hos flickor som haft menstruationer under minst ett år (se avsnitt 3: Hur du tar Lipcut). Lipcut har inte studerats hos barn under 10 års ålder. För ytterligare information, kontakta läkare.

Andra läkemedel och Lipcut

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.

Det är särskilt viktigt att tala om för läkaren om du tar läkemedel med något av följande aktiva innehållsämnen. Att ta Lipcut tillsammans med något av dessa läkemedel kan öka risken för muskelbesvär (vissa av dessa har redan listats i avsnittet ”Använd inte Lipcut” ovan):

- Om du behöver ta fusidinsyra via munnen för att behandla en bakteriell infektion kommer du tillfälligt behöva sluta använda detta läkemedel. Din läkare kommer att tala om för dig när det är säkert att börja ta

Lipcut igen. Intag av Lipcut tillsammans med fusidinsyra kan i sällsynta fall leda till muskelsvaghet, -ömhet eller -smärta (rabdomyolys). Se mer information om rabdomyolys i avsnitt 4.

- ciklosporin (använts ofta av patienter som genomgått organtransplantation)
- danazol (ett syntetiskt hormon som används för att behandla endometrios, ett tillstånd där livmoderslembhinnan växer utanför livmodern)
- läkemedel med ett aktivt innehållsämne som itrakonazol, ketokonazol, flukonazol, posaconazol eller vorikonazol (använts vid behandling av svampinfektioner)
- fibrater med ett aktivt innehållsämne som gemfibrozil eller bezafibrat (använts för att sänka kolesterolnivån)
- erytromycin, klaritromycin eller telitromycin (använts vid behandling av bakteriella infektioner)
- HIV-proteashämmare som indinavir, nelfinavir, ritonavir och sakvinavir (använts vid behandling av HIV-infektioner)
- läkemedel mot hepatit C, såsom boceprevir, telaprevir, elbasvir eller grazoprevir (använts vid behandling av hepatit C-virusinfektion)
- nefazodon (använts vid behandling av depression)
- läkemedel som innehåller det aktiva innehållsämnet kobicistat
- amiodaron (använts vid behandling av oregelbunden hjärtrytm)
- verapamil, diltiazem eller amlodipin (använts vid behandling av högt blodtryck, bröstsmärta associerad med hjärt-kärlsjukdom eller andra hjärtbesvär)
- lomitapid (använts för att behandla ett allvarligt och sällsynt genetiskt kolesterol tillstånd)
- kolkicin (använts vid behandling av gikt).

Tala också om för läkare eller apotekspersonal om du använder eller nyligen har använt andra läkemedel utöver de som nämns ovan, även receptfria sådana. Det är särskilt viktigt att tala om för läkaren om du använder läkemedel med något av följande aktiva innehållsämnen:

- blodproppsförebyggande läkemedel med ett aktivt innehållsämne såsom warfarin, fenprocumon eller acenokumarol (antikoagulantia)
- fenofibrat (använts också för att sänka kolesterolnivån)
- niacin (använts också för att sänka kolesterolnivån)
- rifampicin (använts vid behandling av tuberkulos).

Tala om för läkare som förskriver ett nytt läkemedel till dig att du tar Lipcut.

Lipcut med mat, dryck och alkohol

Grapefruktjuice innehåller ett eller flera ämnen som förändrar nedbrytningen av vissa läkemedel, även Lipcut. Intag av grapefruktjuice bör undvikas.

Tala om för läkaren, om du använder rikligt med alkohol.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Använd inte Lipcut om du är gravid, försöker att bli gravid eller tror att du kan vara gravid. Om du blir gravid då du använder Lipcut ska du omedelbart avbryta behandlingen och meddela din läkare. Använd inte Lipcut om du ammar eftersom det är okänt om läkemedlet passerar över i modersmjölk.

Körförstående och användning av maskiner

Lipcut förväntas inte ha någon direkt inverkan på din förstående att köra bil eller hantera maskiner. Observera dock att vissa personer kan bli yra av Lipcut.

Lipcut filmdragerade tabletter innehåller laktos

Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.

3. Hur du använder Lipcut

Din läkare bestämmer vilken dos som är lämplig för dig beroende på dina besvär, din pågående behandling och din personliga riskprofil.

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Du bör fortsätta med kolesterolsänkande kost under tiden du använder Lipcut.

Rekommenderad dos är en tablett via munnen en gång dagligen.

Vuxna:

Den vanligaste startdosen är 10, 20 eller i vissa fall 40 mg dagligen. Din läkare kan, efter minst 4 veckor, behöva justera din dos till maximalt 80 mg per dag. **Ta inte mer än 80 mg per dag.**

Din läkare kan förskriva lägre doser, särskilt om du tar vissa läkemedel listade ovan eller har vissa njurbesvär.

Dosen 80 mg rekommenderas endast till vuxna patienter med mycket höga kolesterolvärdet och som löper hög risk för hjärt-kärlsjukdom och som inte uppnått sina behandlingsmål på lägre doser.

Användning för barn och ungar:

Den rekommenderade startdosen för barn (10–17 år) är vanligtvis 10 mg till kvällen. Högsta rekommenderade dos är 40 mg dagligen.

Administreringssätt och läkemedelsbehandlingens längd

Ta Lipcut på kvällen. Lipcut kan tas med eller utan mat. Fortsätt att ta Lipcut om inte din läkare har sagt till dig att sluta.

Tabletten kan delas i två lika stora doser.

Om din läkare har ordinerat dig Lipcut tillsammans med ett annat kolesterolsänkande läkemedel som innehåller gallsyrbindande läkemedel, bör du ta Lipcut åtminstone 2 timmar före eller 4 timmar efter att du tagit det gallsyrbindande läkemedlet.

Om du har tagit för stor mängd av Lipcut

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 09 471 977) för bedömning av risken samt rådgivning. Vid överdosering bör läkaren använda symptomatisk och understödjande behandling.

Om du har glömt att ta Lipcut

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos, utan fortsätt behandlingen enligt den ordinerade doseringen.

Om du slutar att ta Lipcut

Tala med läkare eller apotekspersonal eftersom dina kolesterolnivåer kan öka igen.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Om någon av dessa allvarliga biverkningar uppstår, sluta ta ditt läkemedel och kontakta din läkare omedelbart eller uppsök en akutmottagning på närmaste sjukhus.

Följande sällsynta allvarliga biverkningar har rapporterats:

- muskelvärk, -ömhet, -svaghet eller -kramper. Dessa biverkningar kan i sällsynta fall vara allvarliga och innebära nedbrytning av muskelvävnad med njurskador som följd. I mycket sällsynta fall har också dödsfall förekommit.
- överkänslighet (allergiska reaktioner) som t.ex.:
 - svullnad i ansikte, tunga och svalg, vilket kan orsaka andningssvårigheter (angioödem)
 - svår muskelvärk, vanligtvis i axlar och höfter
 - utslag med svaghet i armar, ben och nackmuskulatur
 - värk eller inflammation i lederna (reumatisk polymyalgi)
 - inflammation i blodkärl (vaskulit)
 - blåmärken av okänd orsak, hudutslag och svullnad (dermatomyosit), nässelutslag, känslighet hos huden mot solbesträning, feber, hudrodnad
 - andnöd (dyspné) och allmän sjukdomskänsla
 - lupus-liknande sjukdomsbild (inkluderande hudutslag, ledbesvär och påverkan på blodkroppar)
- inflammation i levern med följande symtom: gulfärgning av hud och ögon, klåda, mörkfärgad urin eller ljusfärgad avföring, känsla av trötthet eller svaghet, aptitlöshet; leversvikt (mycket sällsynt)
- inflammation i bukspottkörteln, ofta med svåra buksmärkor

Följande mycket sällsynta allvarliga biverkningar har rapporterats:

- en allvarlig allergisk reaktion som orsakar andningssvårigheter eller yrsel (anafylaxi).

Följande biverkningar har också rapporterats:

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare):

- lågt antal röda blodkroppar (anemi)
- domningar eller svaghet i armar och ben
- huvudvärk, myrkrypningar, yrsel
- matsmältningsbesvär (buksmärta, förstopning, väderspänning, matsmältningsbesvär, diarré, illamående, kräkningar)
- hudutslag, klåda, hårvälfall
- svaghet
- förhöjningar av leverfunktionsvärdet och ett muskelenzym (kreatinkinas) i blodprover
- minnesförlust, förvirring

Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):

- sömnsvårigheter
- dåligt minne

Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):

- erekptionsbesvär
- depression
- inflammation i lungorna som orsakar andningsbesvär inkluderande ihållande hosta och/eller andnöd eller feber
- problem med senor, ibland försvårad med bristning av senan.
- konstant muskelsvaghets

Ytterligare möjliga biverkningar som har rapporterats med vissa statiner:

- sömnstörningar inklusive mardrömmar
- nedsatt sexuell förmåga
- diabetes. Detta är mer troligt om du har höga blodsocker- och blodfettnivåer, är överviktig och har högt blodtryck. Läkaren kommer att kontrollera dig medan du tar detta läkemedel.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedlets säkerhet.

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea, Biverkningsregistret PB55, 00034 FIMEA.
webbplats: www.fimea.fi.

5. Hur Lipcut ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på blister eller kartongen efter EXP eller Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Förvaras vid högst 30 °C.

Blister:

Förvara blistret i ytterkartongen. Ljuskänsligt.

Tablettburk:

Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

- Den aktiva substansen är simvastatin. En filmdragerad tablett innehåller 5 mg, 10 mg, 20 mg, 30 mg, 40 mg, 60 mg eller 80 mg simvastatin.
- Övriga innehållsämnen är:

Tablettkärna:

Lipcut 5 mg, 10 mg, 30 mg, 60 mg och 80 mg: pregelatiniserad stärkelse, laktosmonohydrat, mikrokristallin cellulosa, butylhydroxianisol (E320), askorbinsyra (E300), citronsyramonohydrat (E330), magnesiumstearat.

Lipcut 20 mg och 40 mg: pregelatiniserad stärkelse, laktosmonohydrat, mikrokristallin cellulosa, butylhydroxianisol (E320), citronsyramonohydrat (E330), magnesiumstearat.

Filmdragering:

Lipcut 5 mg: hypromellos, talk, titandioxid (E171), gul järnoxid (E172).

Lipcut 10 mg och 20 mg: hypromellos, talk, titandioxid (E171), gul järnoxid (E172), röd järnoxid (E172).

Lipcut 30 mg: hypromellos, talk, titandioxid (E171).

Lipcut 40 mg: hypromellos, talk, titandioxid (E171), röd järnoxid (E172).

Lipcut 60 mg: hypromellos, talk, titandioxid (E171), indigokarmin, aluminiumsalt (E132).

Lipcut 80 mg: hypromellos, talk, titandioxid (E171), indigokarmin, aluminiumsalt (E132), kinolingult (E 104).

Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Lipcut 5 mg är en gul, filmdragerad, oval, med brytskåra försedd, konvex tablett med märkning SIM 5 på ena sidan.

Lipcut 10 mg är en blekrosa, filmdragerad, oval, med brytskåra försedd, konvex tablett med märkning SIM 10 på ena sidan.

Lipcut 20 mg är en orange, filmdragerad, oval, bikonvex tablett med brytskåra på båda sidor och märkning 20 på ena sidan.

Lipcut 30 mg är en vit, filmdragerad, oval, med brytskåra försedd, konvex tablett med märkning SIM 30 på ena sidan.

Lipcut 40 mg är en rödbrun, filmdragerad, oval, bikonvex tablett med brytskåra på båda sidor och märkning 40 på ena sidan.

Lipcut 60 mg är en ljusblå, filmdragerad, oval, med brytskåra försedd, konvex tablett med märkning SIM 60 på ena sidan.

Lipcut 80 mg är en ljusgrön, filmdragerad, oval, med brytskåra försedd, konvex tablett med märkning SIM 80 på ena sidan.

Tabletterna kan delas i två lika stora doser.

Förpackningsstorlekar:

Blister (Aluminium/PVC):

5 mg, 10 mg, 20 mg, 30 mg, 40 mg och 80 mg: 7, 10, 14, 20, 21, 28, 30, 35, 40, 42, 49, 50, 50 x 1, 56, 63, 70, 77, 84, 91, 98 och 100 filmdragerade tabletter.

60 mg: 7, 10, 14, 20, 21, 28, 30, 35, 42, 49, 50, 56, 63, 70, 77, 84, 91, 98 och 100 filmdragerade tabletter.

Polytentablettburk med skruvkork:

5 mg, 10 mg, 20 mg, 30 mg, 40 mg och 80 mg: 10, 20, 28, 30, 40, 50, 100 och 250 filmdragerade tablettter.

60 mg: 10, 20, 28, 30, 49, 50, 98 och 100 filmdragerade tablettter.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning

Sandoz A/S, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 Köpenhamn S, Danmark

Tillverkare

Lek Pharmaceuticals d.d., Verovškova 57, 1526 Ljubljana, Slovenien

Denna bipacksedel ändrades senast

28.03.2018