

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle

Oxycodone/Naloxone ratiopharm 5 mg/2,5 mg depottabletit
Oxycodone/Naloxone ratiopharm 10 mg/5 mg depottabletit
Oxycodone/Naloxone ratiopharm 20 mg/10 mg depottabletit

oksikodonihydrokloridi/naloksonihydrokloridi

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

- Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
- Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
- Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä pidä antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
- Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

1. Mitä Oxycodone/Naloxone ratiopharm on ja mihin sitä käytetään
2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Oxycodone/Naloxone ratiopharm -lääkettä
3. Miten Oxycodone/Naloxone ratiopharm -valmistetta käytetään
4. Mahdolliset haittavaikutukset
5. Oxycodone/Naloxone ratiopharm -depottablettien säilyttäminen
6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä Oxycodone/Naloxone ratiopharm on ja mihin sitä käytetään

Oxycodone/Naloxone ratiopharm on depotvalmiste, mikä tarkoittaa, että vaikuttavat aineet vapautuvat valmisteesta vähitellen, pidemmän ajan kuluessa. Yhden depottabletin teho säilyy 12 tunnin ajan.

Nämä tabletit on tarkoitettu vain aikuisten käyttöön.

Kivunlievitys

Sinulle on määrätty Oxycodone/Naloxone ratiopharm -valmistetta vaikean kivun hoitoon, koska muiden kuin opioidikipulääkkeiden teho ei riitä kipusi hoitoon. Naloksonihydrokloridi on lisätty valmisteeseen ehkäisemään ummetusta.

Miten Oxycodone/Naloxone ratiopharm toimii kivunlievityksessä

Oxycodone/Naloxone ratiopharm sisältää oksikodonihydrokloridia ja naloksonihydrokloridia vaikuttavina aineinaan. Oksikodonihydrokloridi aikaansaa Oxycodone/Naloxone ratiopharm -valmisteen kipua lievittävän vaikutuksen ja se on opioidien lääkeryhmään kuuluva vahva kipulääke.

Levottomat jalat

Sinulle on määrätty Oxycodone/Naloxone ratiopharm-valmistetta vaikean tai hyvin vaikean levottomat jalat –oireyhtymän toissijaiseen oireenmukaiseen hoitoon, koska dopamiinilääkkeitä ei voida käyttää. Levottomilla jaloilla tarkoitetaan epämiellyttäviä tuntemuksia raajoissa. Oireet voivat alkaa heti istuutumisen tai makuulle menon jälkeen, ja niihin auttaa vain jalkojen tai joskus käsien ja muiden ruumiinosien liikuttelu. Tämä vaikeuttaa huomattavasti paikallaan istumista ja nukkumista. Naloksonihydrokloridi on lisätty valmisteeseen estämään ummetusta.

Miten nämä tabletit toimivat levottomien jalkojen hoidossa

Nämä tabletit lievittävät epämiellyttäviä tuntemuksia ja vähentävät raajojen liikuttelun tarvetta.

Oxycodone/Naloxone ratiopharm -valmisteen toista vaikuttavaa ainetta, naloksonihydrokloridia, käytetään ummetuksen ehkäisyyn. Suolen toiminnan häiriöt (esim. ummetus) ovat opioidikipuläläkkeiden tyypillisiä haittavaikutuksia.

Oksikodonihydrokloridin ja naloksonihydrokloridin yhdistelmää, jota Oxycodone/Naloxone ratiopharm sisältää, voidaan joskus käyttää myös muiden kuin tässä pakkausselosteessa mainittujen sairauksien hoitoon. Kysy neuvoa lääkäriltä, apteekkihenkilökunnalta tai muulta terveydenhuollon ammattilaiselta tarvittaessa ja noudata aina heiltä saamiasi ohjeita.

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Oxycodone/Naloxone ratiopharm -lääkettä

Älä käytä Oxycodone/Naloxone ratiopharmia

- jos olet allerginen oksikodonihydrokloridille, naloksonihydrokloridille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6).
- jos hengitystoimintasi ei riitä tuomaan riittävästi happea verenkiertoosi ja poistamaan elimistösi tuottamaa hiilidioksidia (sinulla on hengityslama)
- jos sinulla on jokin vaikea keuhkosairaus, johon liittyy hengitysteiden ahtautumista (keuhkohtaumatauti)
- jos sinulla on ns. *cor pulmonale* (keuhkojen ja sydämen sairaus). Tässä sairaudessa mm. sydämen oikea puolisko laajenee keuhkoverisuonten verenpaineen kohoamisen seurauksena (esim. edellä mainitun keuhkohtaumataudin myötä).
- jos sinulla on vaikea astma
- jos sinulla on jostain muusta syystä kuin opioidihoidosta johtuva paralyttinen ileus (suolilama)
- jos sinulla on keskivaikea tai vaikea maksan vajaatoiminta.

Levottomien jalkojen hoidossa myös:

- jos olet aiemmin väärinkäyttänyt opioideja

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin otat Oxycodone/Naloxone ratiopharm -lääkettä, jos:

- olet iäkäs tai heikkokuntoinen
- sinulla on opioidihoidosta johtuva paralyttinen ileus (suolilama)
- sinulla on munuaisten toimintahäiriö
- sinulla on lievä maksan toimintahäiriö
- sinulla on vaikea keuhkotoiminnan häiriö (vaikea hengitysvajaus)
- sinulla on tila, joka aiheuttaa tiheitä hengityskatkoksia öisin ja joka voi aiheuttaa voimakasta uneliaisuutta päivisin (uniapnea)
- sinulla on myksedeema (kilpirauhasen vajaatoimintaan liittyvä tila, jonka yhteydessä esiintyy ihon kuivuutta, kylmyyttä ja turvotusta kasvoissa ja raajoissa)
- kilpirauhasesi ei tuota riittävästi hormoneja (sinulla on kilpirauhasen vajaatoiminta)
- lisämunuaisesi eivät tuota riittävästi hormoneja (sinulla on lisämunuaiskuoren vajaatoiminta, ns. Addisonin tauti)
- sinulla on jokin mielenterveyden häiriö, johon liittyy alkoholin tai muiden päihteiden käytöstä johtuva todellisuudentajun (osittainen) häiriintyminen (psykoosi)
- sinulla on sappikivivaivoja tai jokin muu sappitesairaus (sappiteihin, sappirakkoon tms. vaikuttava sairaus)
- eturauhasesi on laajentunut (sinulla on eturauhasen liikakasvu)
- jos sinulla on alkoholismi tai *delirium tremens*
- sinulla on haimatulehdus (pankreatiitti)
- verenpaineesi on alhainen (hypotensio)
- sinulla on korkea verenpaine (hypertensio)
- sinulla on jokin sydän- ja verisuonitauti
- sinulla on jokin päävamma (sillä tähän lääkkeeseen liittyy aivopaineen kohoamisen riski)
- sairastat epilepsiaa tai sinulla on taipumusta kouristuskohtauksiin

- käytät MAO:n estäjiä (masennuksen tai Parkinsonin taudin hoitoon), tai jos olet käyttänyt sellaisia lääkkeitä viimeksi kuluneiden kahden viikon aikana. MAO:n estäjiä ovat esim. tranyylisypromiini, feneltsiini, isokarboksatsidi, moklobemidi tai linetsolidi.
- sinulla ilmenee uneliaisuutta tai äkillistä nukahtelua.

Unenaikaiset hengityshäiriöt

Oxycodone/Naloxone ratiopharm voi aiheuttaa unenaikaisia hengityshäiriöitä, kuten uniapneaa (unenaikaisia hengityskatkoksia) ja unenaikaista hypoksemiaa (veren vähähappisuutta). Oireita voivat olla esimerkiksi unenaikaiset hengityskatkokset, hengenahdistuksesta johtuva heräily, katkonainen uni tai päivisin esiintyvä voimakas uneliaisuus. Jos sinä tai joku toinen henkilö havaitsette näitä oireita, ota yhteyttä lääkäriin. Lääkäri voi harkita annoksen pienentämistä.

Kerro lääkärille, jos jokin edellä mainituista on joskus koskenut sinua. Kerro lääkärille myös, jos sinulle kehittyy jokin edellä mainituista tiloista Oxycodone/Naloxone ratiopharm -hoidon aikana. Opioidiyliannostuksen vakavin seuraus on **hengityslama** (hengityksen muuttuminen hitaaksi ja pinnalliseksi). Tämä haittavaikutus voi myös johtaa veren happipitoisuuden pienenemiseen ja voi siten aiheuttaa esim. pyörtymisen.

Ripuli

Jos sinulla hoidon alussa ilmenee vaikeaa ripulia, se voi johtua naloksonin vaikutuksesta ja olla merkki suolen toiminnan normalisoitumisesta. 3–5 ensimmäisenä hoitopäivänä voi esiintyä ripulia. Käännä lääkärin puoleen, jos ripuli jatkuu kauemmin kuin 3–5 päivää tai jos se muuten huolestuttaa sinua.

Hoidon vaihto Oxycodone/Naloxone ratiopharmiin

Jos olet käyttänyt muita opioideja, Oxycodone/Naloxone ratiopharm -hoitoon siirtyminen voi aluksi aiheuttaa vieroitusoireita, kuten levottomuutta, hikoilupuuskia ja lihaskipuja. Jos sinulla ilmenee tällaisia oireita, saatat tarvita erityisen tarkkaa lääkärin seurantaa.

Toleranssi ja riippuvuus (addiktio)

Tämä lääke sisältää oksikodoni-nimistä opioidia. Opioidia sisältävien kipulääkkeiden toistuva käyttö voi johtaa siihen, että lääkkeen teho heikkenee (ts. elimistö tottuu siihen. Tällaista tottumista sanotaan toleranssiksi). Oxycodone/Naloxone ratiopharm -valmisteen toistuva käyttö voi myös aiheuttaa väärinkäyttöä ja riippuvuutta, jotka voivat johtaa henkeä uhkaavaan yliannostukseen. Näiden haittavaikutusten riski voi suurentua isommilla annoksilla ja pidempiaikaisessa käytössä.

Riippuvuus (addiktio) voi aiheuttaa tunteen, että et enää pysty itse kontrolloimaan, kuinka paljon tai usein sinun tarvitsee ottaa lääkettä. Sinusta saattaa tuntua, että tarvitset lääkettä lisää, vaikka se ei auta kivun tai vaikean levottomat jalat -oireyhtymän lievityksessä.

Riippuvuuden kehittymisen riskissä on yksilöllisiä eroja. Sinulla voi olla suurempi riski Oxycodone/Naloxone ratiopharm -valmisteen aiheuttaman riippuvuuden kehittymiseen, jos:

- sinä tai joku perheenjäsenesi on joskus väärinkäyttänyt tai ollut riippuvainen alkoholista, reseptilääkkeistä tai huumeista (“addiktio”)
- tupakoit
- sinulla on ollut mielialaongelmia (masennusta, ahdistusta tai persoonallisuushäiriö) tai olet saanut psykiatrista hoitoa johonkin muuhun psyykkiseen sairauteen.

Jos havaitset jotain seuraavista oireista Oxycodone/Naloxone ratiopharm -valmisteen käytön yhteydessä, se voi tarkoittaa riippuvuutta:

- tarvitset lääkettä pidempään kuin lääkäri on neuvonut
- tarvitset suuremman annoksen kuin minkä lääkäri on suositellut
- käytät lääkettä muuhun kuin reseptissä ilmoitettuun tarkoitukseen, esimerkiksi pysyäksesi rauhallisena tai saadaksesi unta
- olet yrittänyt toistuvasti lopettaa lääkkeen käytön tai hallita sitä, mutta se ei ole onnistunut

- kun lopetat lääkkeen käytön, sinulle tulee huono olo, joka helpottuu, kun otat lääkettä uudelleen (vieroitusoireet).

Jos huomaat jotain näistä oireista, kerro asiasta lääkärille, jotta voitte keskustella sinulle sopivasta hoitopolusta, kuten siitä, milloin on sopiva hetki lopettaa ja miten se tehdään turvallisesti (katso kohta 3, Jos lopetat Oxycodone/Naloxone -lääkkeen käytön).

Pitkälle edennyt ruoansulatuselimistön tai lantion alueen syöpä

Kerro lääkärille, jos sinulla on syöpä, johon liittyy vatsaontelon etäpesäkkeitä, tai pitkälle edennyt ruoansulatuselimistön tai lantion alueen syöpä, johon liittyy alkava suolitukos.

Leikkaukset

Jos joudut leikkaukseen, kerro lääkäreille käyttäväsi Oxycodone/Naloxone ratiopharmia.

Hormonien tuotantoon kohdistuva vaikutus

Kuten muutkin opioidit, oksikodoni voi vaikuttaa elimistön hormonien normaaliin tuotantoon, kuten kortisolin tai sukupuolihormonien, jos sitä käytetään suurina annoksina pitkiä aikoja. Jos koet seuraavia oireita, kuten pahoinvointia (mukaan lukien oksentaminen), ruokahalun menettämistä, väsymystä, heikkoutta, huimausta, kuukautiskierron muutoksia, impotenssia, hedelmättömyyttä, sukupuolivietin heikkenemistä, keskustele lääkärin kanssa, koska hän saattaa katsoa tarpeelliseksi tutkia sinun hormonitasosi.

Lisääntynyt kipuherkkyys

Tämä lääke voi lisätä kipuherkyyttäsi etenkin, jos käytät isoja lääkeannoksia. Kerro lääkärille, jos näin käy. Annoksen pienentäminen tai vaihto toiseen lääkkeeseen voi olla tarpeen.

Tablettien jäänteet ulosteissa

Saatat havaita depottablettien jäänteitä ulosteissasi. Älä huolestu, sillä vaikuttavat aineet (oksikodonihydrokloridi ja naloksonihydrokloridi) ovat tästä huolimatta vapautuneet ja imeytyneet tableteista jo mahalaukussasi ja suolistossasi.

Oxycodone/Naloxone ratiopharm -valmisteen väärinlainen käyttö

Oxycodone/Naloxone ratiopharm depottabletit eivät sovi vieroitushoitoon.

Oxycodone/Naloxone ratiopharm 5 mg/2 mg -depottabletit on nieltävä kokonaisina. Niitä ei saa puolittaa, rikkoa, pureskella tai murskata. Depottablettien puolittaminen, rikkomisen, pureskelu tai murskaaminen voi johtaa mahdollisesti kuolemaan johtavan oksikodonihydrokloridiannoksen imeytymiseen (ks. kohdasta 3 ”Jos otat enemmän Oxycodone/Naloxone ratiopharm -lääkettä kuin sinun pitäisi”).

Oxycodone/Naloxone ratiopharm 10 mg/5 mg ja 20 mg/10 mg -depottabletit voidaan puolittaa yhtä suuriin annoksiin, mutta niitä ei saa pureskella tai murskata. Depottablettien pureskelu tai murskaaminen voi johtaa mahdollisesti kuolemaan johtavan oksikodonihydrokloridiannoksen imeytymiseen (ks. kohdasta 3 ”Jos otat enemmän Oxycodone/Naloxone ratiopharm -lääkettä kuin sinun pitäisi”).

Väärinkäyttö

Oxycodone/Naloxone ratiopharm -valmistetta ei saa missään tapauksessa väärinkäyttää. Tämä koskee etenkin potilaita, jotka ovat riippuvaisia huumausaineista. Oxycodone/Naloxone ratiopharm sisältää naloksonia, joten sen väärinkäyttö aiheuttaa todennäköisesti vaikeita vieroitusoireita esimerkiksi heroiinista, morfiinista tai metadonista riippuvaisilla henkilöillä. Se saattaa myös pahentaa parhaillaan esiintyviä vieroitusoireita.

Virheellinen käyttö

Oxycodone/Naloxone ratiopharm -depottabletteja ei saa missään tapauksessa väärinkäyttää liuottamalla niitä ja ottamalla niitä pistoksena (esimerkiksi verisuoneen). Etenkin tablettien sisältämä

talkki voi aiheuttaa kudonvaurioita pistoskohdassa (kuolio) ja muutoksia keuhkokudoksessa (granuloomia). Väärinkäytöllä voi olla muitakin vakavia seurauksia, ja se voi jopa johtaa kuolemaan.

Doping

Urheilijoiden on tiedostettava, että Oxycodone/Naloxone ratiopharm -valmisteen käyttö voi aiheuttaa positiivisen tuloksen dopingtesteissä. Oxycodone/Naloxone ratiopharm -valmisteen käyttö doping-tarkoituksessa voi vaarantaa terveyden.

Muut lääkevalmisteet ja Oxycodone/Naloxone ratiopharm

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät, olet äskettäin käyttänyt tai saatat ottaa muita lääkkeitä.

Haittavaikutusten riski suurenee, jos käytät masennuslääkkeitä (kuten sitalopraamia, duloksetiinia, essitalopraamia, fluoksetiinia, fluvoksamiinia, paroksetiinia, sertraliinia, venlafaksiinia). Näillä lääkkeillä saattaa olla yhteisvaikutuksia oksikodonin kanssa, ja saatat kokea esimerkiksi tahattomia, rytmisiä lihassupistuksia (mm. silmän liikkeitä hallitsevissa lihaksissa), levottomuutta, liikahikoilua, vapinaa, kiihtyneitä refleksejä, voimistunutta lihasjännitystä, ruumiinlämmön nousua yli 38 °C:een. Ota yhteys lääkäriin, jos sinulla esiintyy tällaisia oireita.

Opioidien, mukaan lukien oksikodinihydrokloridin, samanaikainen käyttö sedatiivisten lääkkeiden, kuten bentsodiatsepiinin tai bentsodiatsepiinin kaltaisten lääkkeiden, kanssa voi johtaa uneliaisuuden, hengitysvaikeuksien (hengityslaman) ja kooman riskin suurenemiseen ja voi olla henkeä uhkaava. Tämän vuoksi samanaikaista käyttöä tulee harkita vain silloin, jos muut vaihtoehtoiset hoidot eivät ole mahdollisia.

Jos lääkäri kuitenkin määrää Oxycodone/Naloxone ratiopharm -valmistetta yhdessä sedatiivisten lääkkeiden kanssa, lääkärin tulisi rajoittaa annosta ja hoidon kestoa.

Kerro lääkärille kaikista sedatiivisista lääkkeistä, joita käytät, ja noudata tarkoin lääkärin määräämää annostusta. Kannattaa kertoa ystäville ja sukulaisille, jotta he ovat tietoisia edellä mainituista oireista. Jos saat kyseisiä oireita, ota yhteyttä lääkäriin. Näihin sedatiivisiin tai niiden kaltaisiin lääkkeisiin kuuluvat:

- muut vahvat kipulääkkeet (opioidit)
- epilepsialääkkeet, kipulääkkeet ja lääkkeet ahdistuneisuuden hoitoon, kuten gabapentiini ja pregabaliini
- unilääkkeet ja rauhoittavat lääkkeet (mukaan lukien bentsodiatsepiinit, hypnootit, ahdistusta ja tuskaisuutta vähentävät lääkkeet)
- masennuslääkkeet
- allergialääkkeet sekä matkapahoinvoinnin ja pahoinvoinnin hoitoon käytetyt lääkkeet (antihistamiinit ja antiemeetit)
- lääkeaineet, joita käytetään mielenterveyshäiriöiden hoitoon (psykoosilääkkeet, joihin kuuluu fentiatsiinit ja neuroleptit).

Jos otat näitä tabletteja samanaikaisesti muiden lääkkeiden kanssa, näiden tablettien tai alla kuvattujen muiden lääkkeiden vaikutus saattaa muuttua. Kerro lääkärille, jos käytät jotain seuraavista:

- veren hyytymistäipumusta vähentävät lääkkeet (kumariinijohdokset), sillä veren hyytyminen voi nopeutua tai hidastua
- makrolidiantibiootit (kuten klaritromysiini, erytromysiini tai telitromysiini)
- atsoliryhmän sienilääkkeet (kuten ketokonatsoli, vorikonatsoli, itrakonatsoli tai posakonatsoli)
- proteaasineestäjiksi kutsutut HIV-lääkkeet (esim. ritonaviiri, indinaviiri, nelfinaviiri tai sakinaviiri)
- simetidiini (mahahaavan, ruoansulatusvaivojen ja närästyksen hoitoon)
- rifampisiini (tuberkuloosilääke)
- karbamatsepiini (kouristuskohtausten, kouristelujen ja tiettyjen kiputilojen hoitoon)
- fenytoiini (kouristuskohtausten ja muiden kouristelujen hoitoon)
- rohdosvalmiste mäkikuisma (*Hypericum perforatum*)
- kinidiini (rytmihäiriölääke).

Oxycodone/Naloxone ratiopharm -valmisteella ei todennäköisesti ole yhteisvaikutuksia parasetamolin, asetyylisalisyylihapon tai naltreksonin kanssa.

Oxycodone/Naloxone ratiopharm ruuan, juoman ja alkoholin kanssa

Alkoholin juominen Oxycodone/Naloxone ratiopharm -valmisteen käytön aikana voi saada sinut tuntemaan itsesi entistä uneliaammaksi ja voi lisätä vakavien haittavaikutusten riskiä (kuten pinnallinen hengitys, hengityksen pysähtyminen sekä tajunnan menetys). On suositeltavaa, ettet juo alkoholia Oxycodone/Naloxone ratiopharm -valmisteen käytön aikana.

Vältä greippimehun juomista Oxycodone/Naloxone ratiopharm -valmisteen käytön aikana.

Raskaus ja imetys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Raskaus

Oxycodone/Naloxone ratiopharm -valmisteen käyttöä raskauden aikana tulee välttää, ellei lääkäri pidä hoitoa tällä lääkevalmisteella välttämättömänä. Jos oksikodonihydrokloridia käytetään raskauden aikana pitkiä aikoja, vastasyntynyt voi saada vieroitusoireita. Jos oksikodonihydrokloridia annetaan synnytyksen aikana, vastasyntyneelle voi kehittyä hengityslama (hengityksen hitaus ja pinnallisuus).

Imetys

Imetys tulee lopettaa Oxycodone/Naloxone ratiopharm -hoidon ajaksi. Oksikodonihydrokloridi erittyy rintamaitoon. Ei tiedetä, erittyykö myös naloksonihydrokloridi rintamaitoon. Imetettävään lapseen mahdollisesti kohdistuvia riskejä ei näin ollen voida pois sulkea. Tämä koskee etenkin tilanteita, joissa imettävä äiti on ottanut useita Oxycodone/Naloxone ratiopharm -annoksia.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Tämä lääke voi heikentää kykyä kuljettaa moottoriajoneuvoa tai tehdä tarkkaa keskittymistä vaativia tehtäviä, sillä se voi aiheuttaa uneliaisuutta tai huimausta. On omalla vastuullasi arvioida, pystytkö näihin tehtäviin lääkehoidon aikana. Lääkkeen vaikutuksia ja haittavaikutuksia on kuvattu muissa kappaleissa. Lue koko pakkausseloste opastukseksi. Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa, jos olet epävarma.

Riski sille, että Oxycodone/Naloxone ratiopharm -valmiste vaikuttaa ajokykyysi tai koneiden käyttökyyysi on suurimmillaan hoidon alussa, annoksen suurentamisen jälkeen tai jos siirryt toisesta lääkkeestä Oxycodone/Naloxone ratiopharm -hoitoon. Nämä haittavaikutukset kuitenkin yleensä häviävät, kun saman Oxycodone/Naloxone ratiopharm -annoksen käyttö on vakiintunut.

Tämän lääkevalmisteen käyttöön on liittynyt uneliaisuutta ja äkillistä nukahtelua. Jos sinulla on tällaisia haittavaikutuksia, älä aja äläkä käytä koneita. Kerro lääkärille, jos tällaista ilmenee.

Keskustele lääkärin kanssa, voitko ajaa autoa tai käyttää koneita.

Oxycodone/Naloxone ratiopharm sisältää natriumia

Tämä lääkevalmiste sisältää alle 1 mmol natriumia (23 mg) per tabletti, eli sen voidaan sanoa olevan ”natriumiton”.

3. Miten Oxycodone/Naloxone ratiopharm -valmistettä käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Ennen kuin aloitat hoidon ja myös säännöllisesti hoidon aikana lääkäri kertoo sinulle, mitä Oxycodone/Naloxone ratiopharm -valmisteen käytöstä on mahdollisesti odotettavissa, milloin ja

kuinka kauan sinun tarvitsee käyttää Oxycodone/Naloxone ratiopharm -valmistetta, milloin sinun on otettava yhteys lääkäriin ja milloin valmisteen käyttö on lopetettava (katso myös kohta ”Jos lopetat Oxycodone/Naloxone ratiopharm -lääkkeen käytön”).

Oxycodone/Naloxone ratiopharm on depottabletti eli valmiste, jonka vaikuttavat aineet vapautuvat vähitellen pitkän ajan kuluessa. Vaikutus kestää 12 tuntia.

Oxycodone/Naloxone ratiopharm 5 mg/2,5 mg depottabletit on nieltävä kokonaisina.

Niitä ei saa puolittaa, rikkoa, pureskella eikä murskata. Puolitettujen, rikottujen, pureskeltujen tai murskattujen depottablettien ottaminen voi aiheuttaa jopa kuolemaan johtavan oksikodonihydrokloridiannoksen imeytymisen verenkiertoon (ks. kohta 3 ”Jos otat enemmän Oxycodone/Naloxone ratiopharm -lääkettä kuin sinun pitäisi”).

Oxycodone/Naloxone ratiopharm 10 mg/5 mg ja 20 mg/10 mg depottabletit voi puolittaa yhtä suuriin annoksiin, mutta tabletteja ei saa pureskella eikä murskata.

Pureskeltujen tai murskattujen depottablettien ottaminen voi aiheuttaa jopa kuolemaan johtavan oksikodonihydrokloridiannoksen imeytymisen verenkiertoon (ks. kohta 3 ”Jos otat enemmän Oxycodone/Naloxone ratiopharm -lääkettä kuin sinun pitäisi”).

Ellei lääkärisi määrää toisin, tavanomainen annos on
Kivun hoito

Aikuiset

Tavanomainen aloitusannos on 10 mg oksikodonihydrokloridia / 5 mg naloksonihydrokloridia depottabletteina 12 tunnin välein.

Lääkäri päättää, kuinka paljon Oxycodone/Naloxone ratiopharm -valmistetta sinun tulee ottaa vuorokaudessa ja miten vuorokauden kokonaisannos jaetaan aamu- ja ilta-annoksiin. Lääkäri päättää myös mahdollisesta annoksen muuttamisesta hoidon aikana. Annosta muutetaan kokemasi kivun ja yksilöllisen herkyytesi mukaan. Hoidossa käytetään pienintä mahdollista annosta, joka riittää kivun lievittämiseen. Jos olet aiemmin saanut opioidihoitoa, Oxycodone/Naloxone ratiopharm -hoitosi voidaan aloittaa tavallista suuremmalla annoksella.

Vuorokauden enimmäisannos on 160 mg oksikodonihydrokloridia ja 80 mg naloksonihydrokloridia. Jos suurempi annos on tarpeen, lääkäri voi antaa sinulle lisäksi oksikodonihydrokloridia ilman naloksonihydrokloridia. Oksikodonihydrokloridin enimmäisannos vuorokaudessa ei kuitenkaan saa olla suurempi kuin 400 mg. Naloksonin suotuista vaikutuksista suolen toimintaan voi heikentyä, jos hoidossa käytetään oksikodonihydroksidilisää ilman ylimääristä naloksonihydrokloridilisää.

Jos siirryt Oxycodone/Naloxone ratiopharm -hoidosta käyttämään jotakin toista vahvaa opioidikipulääkettä, on todennäköistä, että suolesi toiminta huononee.

Jos sinulla on kipuja Oxycodone/Naloxone ratiopharm -annosten välissä, saatat tarvita nopeavaikutteista lisäkipulääkettä. Oxycodone/Naloxone ratiopharm -valmiste ei sovi tähän tarkoitukseen, joten keskustele asiasta lääkärin kanssa.

Jos sinusta tuntuu, että Oxycodone/Naloxone ratiopharm -valmisteen vaikutus on liian voimakas tai liian heikko, keskustele asiasta lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa.

Levottomien jalkojen hoito

Aikuiset

Tavanomainen aloitusannos on yksi Oxycodone/Naloxone ratiopharm 5 mg/2,5 mg depottabletti 12 tunnin välein.

Lääkäri päättää, kuinka paljon Oxycodone/Naloxone ratiopharm-valmistetta sinun on otettava vuorokaudessa ja miten vuorokauden kokonaisannos jaetaan aamu- ja ilta-annoksiin. Lääkäri päättää

myös mahdollisesta annoksen muuttamisesta hoidon aikana. Annosta muutetaan yksilöllisen herkkyyden mukaan. Levottomien jalkojen oireiden hoitoon on käytettävä pienintä oireita lievittävää annosta.

Jos sinusta tuntuu, että Oxycodone/Naloxone ratiopharm-valmisteen vaikutus on liian voimakas tai liian heikko, keskustele asiasta lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa.

Enimmäisannos on 60 mg oksikodonihydrokloridia ja 30 mg naloksonihydrokloridia vuorokaudessa.

Tästä lääkevalmisteesta on saatavana muitakin vahvuuksia, mikäli annosta ei voida toteuttaa tällä vahvuudella tai sen toteuttaminen on hankalaa.

Kivun ja levottomien jalkojen hoito

Iäkkäät potilaat

Annosta ei yleensä tarvitse muuttaa sellaisia iäkkäitä potilaita varten, joiden munuaiset ja maksa toimivat normaalisti.

Maksan tai munuaisten vajaatoiminta

Jos sinulla on munuaisten vajaatoiminta tai lievä maksan vajaatoiminta, hoitava lääkäri määrää Oxycodone/Naloxone ratiopharm -lääkettä erityisen varovasti. Oxycodone/Naloxone ratiopharm -valmistetta ei saa käyttää, jos sinulla on keskivaikea tai vaikea maksan vajaatoiminta (ks. myös kohta 2, ”Älä käytä Oxycodone/Naloxone ratiopharmia” ja ”Varoitukset ja varotoimet”).

Alle 18-vuotiaat lapset ja nuoret

Oxycodone/Naloxone ratiopharm -valmistetta ei ole vielä tutkittu alle 18-vuotiailla lapsilla ja nuorilla, eikä sen tehoa ja turvallisuutta ole osoitettu tässä ikäryhmässä. Tämän takia Oxycodone/Naloxone ratiopharm -valmistetta ei suositella käytettäväksi alle 18-vuotiaiden potilaiden hoidossa.

Antotapa

Oxycodone/Naloxone ratiopharm 5 mg/2,5 mg-depottabletit nielaistaan riittävän nestemäärän kera (1/2 lasillista vettä). Depottabletit on nieltävä kokonaisina. Niitä ei saa jakaa, rikkoa, pureskella tai murskata. Depottabletit voi ottaa sekä ruoan kanssa että ilman ateriaa.

Oxycodone/Naloxone ratiopharm 10 mg/5 mg ja 20 mg/10 mg-depottabletit nielaistaan riittävän nestemäärän kera (1/2 lasillista vettä). Tabletit voi jakaa yhtää suuriin annoksiin. Depottabletteja ei saa pureskella tai murskata. Depottabletit voi ottaa sekä ruoan kanssa että ilman ateriaa.

Ota Oxycodone/Naloxone ratiopharm -lääkkeesi 12 tunnin välein, aina samoihin kellonaikoihin (esim. kello 8 ja kello 20).

Hoidon kesto

Oxycodone/Naloxone ratiopharm -valmistetta ei yleensä pidä käyttää kauemmin kuin on tarpeellista. Jos Oxycodone/Naloxone ratiopharm -hoitosi on pitkäaikaista, lääkärin tulisi tarkistaa säännöllisin väliajoin, tarvitsetko edelleen Oxycodone/Naloxone ratiopharm -hoitoa.

Jos otat enemmän Oxycodone/Naloxone ratiopharm -lääkettä kuin sinun pitäisi

Jos olet ottanut liian suuren lääkannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina välittömästi yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

Yliannos voi aiheuttaa:

- silmien mustuaisten pienenemistä
- hengityksen muuttumista hitaaksi ja pinnalliseksi (hengityslama)
- uneliaisuutta tai jopa tajuttomuutta
- lihasjänteyden heikkenemistä (hypotonia)
- sykkeen hidastumista
- verenpaineen alenemista

- aivohäiriön (toksinen leukoencefalopatia).
- Vaikeissa tapauksissa voi esiintyä tajuttomuutta (kooma), nesteen kertymistä keuhkoihin ja verenkierron romahtamista. Joissakin tapauksissa tämä voi johtaa kuolemaan.

Tarkkaavaisuutta vaativia tilanteita, kuten autolla ajoa, on vältettävä.

Jos unohdat ottaa Oxycodone/Naloxone ratiopharm -valmistetta

Jos unohdat ottaa Oxycodone/Naloxone ratiopharm -annoksen tai otat pienemmän annoksen kuin sinulle on määrätty, kipusi ei välttämättä lievity/pysy poissa.

Jos unohdat ottaa annoksen, noudata seuraavia ohjeita:

- Jos seuraavaan tavanomaiseen annoksen ottoajankohtaan on vielä vähintään 8 tuntia: Ota unohtunut annos heti ja jatka normaalin annostusaikataulusi mukaan.
- Jos seuraavaan tavanomaiseen annoksen ottoajankohtaan on alle 8 tuntia: Ota unohtunut annos. Odota sitten 8 tuntia ennen kuin otat seuraavan annoksen. Yritä palata alkuperäiseen aikatauluusi (esim. kello 8 ja kello 20).
- Huomioi, että minkään 8 tunnin jakson kuluessa ei saa ottaa useampia kuin yhden annoksen.

Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen.

Jos lopetat Oxycodone/Naloxone ratiopharm -lääkkeen käytön

Älä lopeta Oxycodone/Naloxone ratiopharm -valmisteen käyttöä keskustelematta siitä ensin lääkärin kanssa.

Jos et tarvitse hoitoa enää, vuorokausiannostasi on pienennettävä vähitellen. Keskustele ensin asiasta lääkärin kanssa. Näin vältät vieroitusoireet, kuten levottomuuden, hikoilupuuskat ja lihaskivut.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Tärkeitä seurattavia haittavaikutusoireita ja toimintaohjeet haittavaikutusten varalta:

Jos sinulle kehittyy jokin seuraavista tärkeistä haittavaikutuksista, ota heti yhteys lähimpään lääkäriin.

Hengityslama (hengityksen muuttuminen hitaaksi ja pinnalliseksi) on opioidiyliaannostuksen vaarallisin seuraus. Sitä esiintyy lähinnä iäkkäillä ja heikkokuntoisilla potilailla. Opioidit voivat myös aiheuttaa äkillistä, vaikeaa verenpaineen alenemista potilailla, joilla on tavallista suurempi taipumus tämäntapaisiin reaktioihin.

Seuraavia haittavaikutuksia on havaittu kivun hoidossa:

Yleiset (enintään 1 lääkkeen käyttäjällä 10:stä):

- vatsakipu
- ummetus
- ripuli
- kuiva suu
- ruoansulatusvaivat
- oksentelu
- pahoinvointi
- ilmavaivat
- heikentynyt ruokahalu tai jopa täydellinen ruokahaluttomuus
- pyöräytys tai huimaus
- päänsärky

- kuumat aallot
- poikkeava heikotus
- väsymys tai uupumus
- ihon kutina
- ihoreaktiot/ihottuma
- hikoilu
- kiertohuimaus
- univaikeudet
- uneliaisuus.

Melko harvinaiset (enintään 1 lääkkeen käyttäjällä 100:sta):

- vatsan turvotus
- tavallisesta poikkeava ajatustenjuoksu
- ahdistuneisuus
- sekavuus
- masennus
- hermostuneisuus
- puristava tunne rinnassa (etenkin henkilöillä, joilla on sepelvaltimotauti)
- verenpaineen lasku
- vieroitusoireet kuten kiihtyneisyys
- pyörtyminen
- energian puute
- jano
- makuaistin muutos
- sydämentykytys
- sappikivikohtaus
- rintakivut
- yleinen huonovointisuus
- kivut
- käsien, nilkkojen tai jalkojen turvotus
- keskittymisvaikeudet
- puheen häiriöt
- vapina
- hengitysvaikeudet
- levottomuus
- vilunväreet
- kohonneet maksaentsyymiarvot
- verenpaineen nousu
- sukupuolivietin heikentyminen
- nuha
- yskä
- yliherkkyys/allergiset reaktiot
- painon lasku
- tapaturmaiset loukkaantumiset
- lisääntynyt virtsaamisen tarve
- lihaskouristukset
- lihasnykäykset
- lihaskivut
- heikentynyt näkö
- epileptiset kohtaukset (etenkin henkilöillä, joilla on epilepsia tai jotka ovat taipuvaisia saamaan kouristuskohtauksia).

Harvinaiset (enintään 1 lääkkeen käyttäjällä 1 000:sta):

- sykkeen nousu
- lääkeriippuvuus
- hammasmuutokset
- painon nousu

- haukottelu.

Yleisyys tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä yleisyyden arviointiin):

- liiallisen voimakas onnellisuuden tunne (euforia)
- voimakas uneliaisuus
- erektiohäiriöt
- painajaiset
- aistiharhat
- pinnallinen hengitys
- virtsaamisvaikeudet
- aggressiivisuus
- pistelyt ja puutumiset
- röyhtäily
- uniapnea (unenaikaiset hengityskatkokset).

Jos tämän lääkevalmisteen toista vaikuttavaa ainetta, oksikodonihydrokloridia, käytetään yksinään ilman naloksonihydrokloridia, sen haittavaikutukset ovat erilaisia. Tällöin esiintyy seuraavia haittavaikutuksia:

Oksikodoni voi aiheuttaa hengitysvaikeuksia (hengityslamaa), silmän mustuaisten pienenemistä, keuhkoputkien lihasten supistumista, sileän lihaksen krampeja ja yskänrefleksin lamaantumista.

Yleiset (enintään 1 lääkkeen käyttäjällä 10:stä):

- mielialan vaihtelut ja persoonallisuusmuutokset (esim. masennus, liioitellut onnellisuuden tunteet), aktiivisuuden väheneminen, yliaktiivisuus
- virtsaamisvaikeudet
- nikottelu.

Melko harvinaiset (enintään 1 lääkkeen käyttäjällä 100:sta):

- heikentynyt keskittymiskyky
- migreeni
- lisääntynyt lihasjänteys
- tahattomat lihasten supistelut
- suolentukkeuma (ileus)
- kuiva iho
- lääketoleranssi
- heikentynyt kyky tunkea kipua tai kosketusta
- koordinaatiokyvyn poikkeavuudet
- äänimuutokset (dysfonia)
- nesteen kertymisestä johtuva turvotus
- alentunut kuulo
- suun haavaumat
- nielemisvaikeudet
- arat ikenet
- tuntoaistien häiriöt (aistiharhat, epätodellinen olo)
- ihon punastumisreaktiot
- elimistön kuivuminen
- kiihtyneisyys
- sukupuolihormoniarvojen pieneneminen, joka voi vaikuttaa siittiöiden tuotantoon miehillä tai kuukautiskiertoon naisilla.

Harvinaiset (enintään 1 lääkkeen käyttäjällä 1 000:sta):

- kutiava ihottuma (nokkosihottuma)
- tulehdukset, kuten huuli- tai sukuelinherpes (voi aiheuttaa rakkuloita suun tai sukuelinten alueelle)
- lisääntynyt ruokahalu
- mustat (tahmaiset) ulosteet
- ienverenvuodot.

Yleisyys tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä yleisyyden arviointiin):

- äkilliset, yleistyneet allergiset reaktiot (anafylaktiset reaktiot)
- kipuherkkyyden lisääntyminen
- kuukautisten poisjääminen
- vieroitusoireet vastasyntyneellä
- Oddin sulkijalihaksen toimintahäiriö (sairaus, joka vaikuttaa sapenjohtimen normaaliin toimintaan)
- sapen virtaukseen liittyvät ongelmat
- hammaskaries.

Seuraavia haittavaikutuksia on havaittu levottomien jalkojen hoidossa:

Hyvin yleiset (useammalla kuin 1 lääkkeen käyttäjällä 10:stä):

- päänsärky
- uneliaisuus
- ummetus
- pahoinvointi
- hikoilu
- väsymys tai uupumus

Yleiset (enintään 1 lääkkeen käyttäjällä 10:stä):

- heikentynyt ruokahalu tai jopa täydellinen ruokahaluttomuus
- unettomuus
- masennus
- huimaus tai pyörrytys
- keskittymisvaikeudet
- vapina
- pistelyt käsissä tai jaloissa
- heikentynyt näkö
- kiertohuimaus
- kuumat aallot
- verenpaineen lasku
- verenpaineen nousu
- mahakivut
- kuiva suu
- oksentelu
- kohonneet maksaentsyymiarvot (kohonneet ALAT- ja GGT-arvot)
- kutiava iho
- ihoreaktiot/ihottumat
- rintakivut
- vilunväreet
- kivut
- jano

Melko harvinaiset (enintään 1 lääkkeen käyttäjällä 100:sta):

- heikentynyt sukupuolivietti
- äkilliset nukahtamiskohtaukset
- makuaistimusten muutokset
- hengitysvaikeudet
- ilmavaivat
- erektiohäiriöt
- vieroitusoireet, kuten kiihtyneisyys
- käsien, nilkkojen tai jalkojen turvotus
- tapaturmaiset loukkaantumiset

Yleisyys tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä yleisyyden arviointiin):

- yliherkkyys/allergiset reaktiot
- tavallisesta poikkeavat ajatukset
- ahdistuneisuus
- sekavuus
- hermostuneisuus
- levottomuus
- liiallisen voimakas onnellisuuden tunne (euforia)
- aistiharhat
- painajaiset
- epileptiset kohtaukset (etenkin henkilöillä, joilla on epilepsia tai jotka ovat taipuvaisia saamaan kouristuskohtauksia)
- lääkeriippuvuus
- vaikea-asteinen uneliaisuus
- puheen häiriöt
- pyörtyminen
- puristava tunne rinnassa (etenkin henkilöillä, joilla on sepelvaltimotauti)
- sydämentykytys
- sykkeen nousu
- pinnallinen hengitys
- yskä
- nuha
- haukottelu
- vatsan turvotus
- ripuli
- aggressiivisuus
- ruoansulatushäiriöt
- röyhtäily
- hammasmuutokset
- sappikivikohtaukset
- lihaskouristukset
- lihasnykäykset
- lihaskivut
- virtsaamisvaikeudet
- lisääntynyt virtsaamisen tarve
- yleinen huonovointisuus
- painon lasku
- painon nousu
- poikkeava heikotus
- energian puute.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

5. Oxycodone/Naloxone ratiopharm -depottablettien säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville. Säilytä tämä lääke lukitussa, turvallisessa paikassa, josta muut ihmiset eivät saa sitä haltuunsa. Lääke voi aiheuttaa vakavia haittoja tai olla tappava ihmisille, joille sitä ei ole määrätty.

Älä käytä tätä lääkettä kotelossa, lääkepurkin etiketissä ja läpipainolevyssä ”EXP” yhteydessä mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Läpipainopakkaukset: Säilytä alle 25 °C.

Lääkepurkit: Säilytä alle 30 °C.

Lääkkeitä ei pidä heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Oxycodone/Naloxone ratiopharm sisältää

- Vaikuttavat aineet ovat oksikodonihydrokloridi ja naloksonihydrokloridi.
Oxycodone/Naloxone ratiopharm 5 mg/2,5 mg: Yksi depottabletti sisältää 5 mg oksikodonihydrokloridia (vastaten 4,5 mg oksikodonia) ja 2,5 mg naloksonihydrokloridia (2,74 mg:n naloksonihydroklorididihydraatin muodossa, mikä vastaa 2,25 mg naloksonia).
Oxycodone/Naloxone ratiopharm 10 mg/5 mg: Yksi depottabletti sisältää 10 mg oksikodonihydrokloridia (vastaten 9 mg oksikodonia) ja 5 mg naloksonihydrokloridia (5,45 mg:n naloksonihydroklorididihydraatin muodossa, mikä vastaa 4,5 mg naloksonia).
Oxycodone/Naloxone ratiopharm 20 mg/10 mg: Yksi depottabletti sisältää 20 mg oksikodonihydrokloridia (vastaten 18 mg oksikodonia) ja 10 mg naloksonihydrokloridia (10,9 mg:n naloksonihydroklorididihydraatin muodossa, mikä vastaa 9 mg naloksonia).

Muut aineet

Tabletitytimessä ovat:

Poly(vinyyliaetaatti), povidoni, natriumlauryylisulfaatti, kolloidaalinen vedetön piidioksidi, mikrokiteinen selluloosa ja magnesiumstearaatti.

Tabletin depotpäällysteessä ovat:

Poly(vinyylialkoholi), titaanidioksidi (E 171), makrogoli ja talkki.

Oxycodone/Naloxone ratiopharm 10 mg/5 mg:n päällyste sisältää edellä lueteltujen apuaineiden lisäksi punaista rautaoksidia (E 172).

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Oxycodone/Naloxone ratiopharm 5 mg/2,5 mg depottabletti

on valkoinen, pyöreä, kaksoiskupera depottabletti, jonka halkaisija on 4,7 mm ja paksuus 2,9 - 3,9 mm.

Oxycodone/Naloxone ratiopharm 10 mg/5 mg depottabletti

on vaaleanpunainen, pitkulainen, kaksoiskupera depottabletti, jonka molemmilla puolilla on jakouurre. Depottabletin pituus on 10,2 mm, sen leveys on 4,7 mm ja sen paksuus on 3,0 - 4,0 mm. Depottabletin voi jakaa yhtä suuriin annoksiin.

Oxycodone/Naloxone ratiopharm 20 mg/10 mg depottabletti

on valkoinen, pitkulainen, kaksoiskupera depottabletti, jonka molemmilla puolilla on jakouurre. Depottabletin pituus on 11,2 mm, sen leveys on 5,2 mm ja sen paksuus on 3,3 - 4,3 mm. Depottabletin voi jakaa yhtä suuriin annoksiin.

Pakkauskoot:

Oxycodone/Naloxone ratiopharm -depottabletit on saatavana lapsiturvallisissa läpipainopakkauksissa, joissa on 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 90, 98 tai 100 depottablettia; lapsiturvallisissa annoksittain perforoiduissa läpipainopakkauksissa, joissa on 10x1, 14x1, 20x1, 28x1, 30x1, 50x1, 56x1, 60x1,

90x1, 98x1 ja 100x1 depottablettia; sekä lapsiturvallisilla sulkimilla varustetuissa tablettipurkeissa, joissa on 50, 100, 200 tai 250 depottablettia.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Myyntiluvan haltija:

ratiopharm GmbH
Graf-Arco-Straße 3
89079 Ulm
Saksa

Valmistaja:

Develco Pharma GmbH
Grienmatt 27
79650 Schopfheim
Saksa

Teva Operations Poland Sp. z o.o.
ul. Mogilska 80
31-546 Krakova
Puola

PLIVA Hrvatska d.o.o. (PLIVA Croatia Ltd.)
Prilaz baruna Filipovića 25
10000 Zagreb
Kroatia

Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja:

Teva Finland Oy
PL 67
02631 Espoo
puh. 020 180 5900

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 17.4.2024.

Bipacksedel: Information till användaren

Oxycodone/Naloxone ratiopharm 5 mg/2,5 mg depottabletter
Oxycodone/Naloxone ratiopharm 10 mg/5 mg depottabletter
Oxycodone/Naloxone ratiopharm 20 mg/10 mg depottabletter

oxikodonhydroklorid/naloxonhydroklorid

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.
- Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.
- Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad Oxycodone/Naloxone ratiopharm är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Oxycodone/Naloxone ratiopharm
3. Hur du använder Oxycodone/Naloxone ratiopharm
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Oxycodone/Naloxone ratiopharm ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Oxycodone/Naloxone ratiopharm är och vad det används för

Oxycodone/Naloxone ratiopharm tillhandahålls som depottabletter, vilket innebär att de aktiva substanserna frigörs småningom under en längre tid. Effekten av en depottablett varar i 12 timmar.

Dessa tabletter är endast avsedda för vuxna.

Smärtlindring

Oxycodone/Naloxone ratiopharm används för behandling av svår smärta som endast kan lindras med starka smärtstillande läkemedel (opioider). Naloxonhydroklorid är tillsatt för att motverka förstoppning.

Hur Oxycodone/Naloxone ratiopharm fungerar vid smärtlindring

Oxycodone/Naloxone ratiopharm innehåller oxikodonhydroklorid och naloxonhydroklorid som aktiva substanser. Oxikodonhydroklorid ansvarar för den smärtstillande effekten hos Oxycodone/Naloxone ratiopharm och är ett potent analgetikum ("smärtstillande medel") som tillhör opioidgruppen.

Rastlösa ben

Oxycodone/Naloxone ratiopharm används också som andra linjens symptomatisk behandling av svårt eller mycket svårt rastlösa ben-syndrom när dopaminläkemedel inte kan användas. Personer med rastlösa ben har obehagliga känsselförnimmelser i extremiteterna. Symtomen kan börja genast när personen sätter eller lägger sig ner och lindras endast genom att röra på benen eller ibland armarna eller andra kroppsdelar. Detta gör det mycket svårt att sitta stilla och sova.

Hur dessa tabletter verkar vid behandling av rastlösa ben

Dessa tabletter lindrar de obehagliga känsselförnimmelserna och minskar behovet att röra på extremiteterna. Den andra aktiva substansen i Oxycodone/Naloxone ratiopharm, naloxonhydroklorid, är avsedd att motverka förstoppning. Tarmstörningar (t.ex. förstoppning) är en typisk biverkan vid behandling med opioida smärtstillande medel.

Kombinationen av oxikodonhydroklorid och naloxonhydroklorid som finns i Oxycodone/Naloxone ratiopharm kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2. Vad du behöver veta innan du använder Oxycodone/Naloxone ratiopharm

Ta inte Oxycodone/Naloxone ratiopharm

- om du är allergisk mot oxikodonhydroklorid, naloxonhydroklorid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).
- om din andning inte kan tillföra tillräckligt med syre till blodet och avlägsna den koldioxid som produceras i kroppen (andningsdepression)
- om du lider av någon svår lungsjukdom som orsakar förträngningar i luftvägarna (kronisk obstruktiv lungsjukdom eller KOL)
- om du lider av en sjukdom som kallas för *cor pulmonale*. Denna sjukdom gör att den högra sidan av hjärtat förstoras på grund av ett ökat tryck inuti blodkärlen i lungorna etc. (t.ex. som ett resultat av KOL – se ovan).
- om du har svår bronkialastma
- om du har paralytisk ileus (en typ av tarmhinder) som inte har orsakats av opioider
- om du har måttligt eller allvarligt nedsatt leverfunktion.

Vid behandling av rastlösa ben även:

- om du har missbrukat opioider tidigare

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Oxycodone/Naloxone ratiopharm om:

- du är äldre eller i svag kondition
- du har paralytisk ileus (en typ av tarmhinder) som har orsakats av opioider
- du har nedsatt njurfunktion
- du har lindrigt nedsatt leverfunktion
- du har allvarligt nedsatt lungfunktion (d.v.s. minskad andningsförmåga)
- du har ett tillstånd som kännetecknas av tätt återkommande andningsuppehåll nattetid, vilket kan göra att du känner dig mycket sömning under dagen (sömnapné)
- du har myxödem (en sköldkörtelsjukdom med torr, kall hud och svullnad i ansiktet eller i benen)
- din sköldkörtel inte producerar tillräckligt med hormoner (underaktiv sköldkörtel eller hypotyroidism)
- dina binjurar inte producerar tillräckligt med hormoner (du har s.k. Addisons sjukdom; binjurebarkinsufficiens)
- du har någon psykisk sjukdom med en (partiell) förlust av verklighetsuppfattningen (psykos), som beror på alkohol eller berusning med andra substanser (substansinducerad psykos)
- du har gallstensproblem eller om du har någon annan gallvägssjukdom (sjukdom som påverkar gallgångarna, gallblåsan o.s.v.)
- din prostata är förstörd (godartad prostatahyperplasi)
- om du har alkoholism eller *delirium tremens*
- din bukspottkörtel är inflammerad (pankreatit)
- du har lågt blodtryck (hypotension)
- du har högt blodtryck (hypertension)
- du har någon hjärt-kärlsjukdom
- du har en skallskada (på grund av risken för ökat tryck i hjärnan)
- du lider av epilepsi eller har en benägenhet till kramper
- du även tar MAO-hämmare (används för att behandla depression eller Parkinsons sjukdom) eller om du har tagit något sådant läkemedel under de två föregående veckorna. Sådana läkemedel är t.ex. tranylcypromin, fenelzin, isokarboxazid, moklobemid och linezolid.
- du känner dig sömning eller har upplevt episoder av plötsligt insomnande.

Sömnrelaterade andningsstörningar

Oxycodone/Naloxone ratiopharm kan orsaka andningsstörningar när du sover, såsom andningsuppehåll (sömnapné) och låg syrenivå i blodet (hypoxemi) under sömnen. Symtomen kan vara andningsuppehåll under sömnen, nattliga uppvaknanden på grund av andnöd, svårigheter att upprätthålla sömnen eller uttalad dåsigheit under dagen. Kontakta läkaren om du eller någon annan märker dessa symtom. Läkaren kan överväga att sänka dosen.

Tala om för din läkare om du tidigare har varit drabbad av något av det ovanstående. Tala även om för din läkare om något av ovanstående tillstånd uppstår under tiden då du tar Oxycodone/Naloxone ratiopharm. Den allvarligaste risken vid överdos av opioida medel är **andningsdepression** (långsam och ytlig andning). Detta kan också leda till att syrehalterna i blodet faller, vilket i sin tur kan leda till bl.a. svimning.

Diarré

Om du drabbas av kraftig diarré i början av behandlingen kan detta bero på effekten av naloxonhydroklorid. Detta kan vara ett tecken på att tarmfunktionen återgår till det normala. Sådan diarré kan inträffa under de första 3–5 dagarna av behandlingen. Kontakta din läkare om diarrén fortsätter efter 3–5 dagar, eller om du annars finner den oroande.

Byte från annan opioid till Oxycodone/Naloxone ratiopharm

Om du har använt någon annan opioid kan abstinenssymtom uppträda i början när du byter till behandling med Oxycodone/Naloxone ratiopharm, t.ex. rastlöshet, svettningssvettningar och muskelsmärta. Om du upplever sådana symtom kan du behöva specialövervakas av din läkare.

Tolerans, beroende och missbruk

Detta läkemedel innehåller oxikodon som är ett opioidläkemedel. Upprepad användning av smärtlindrande opioidläkemedel kan leda till att dess effekt minskar (du blir tillvand, något som kallas tolerans). Upprepad användning av Oxycodone/Naloxone ratiopharm kan också leda till beroende och missbruk, vilket kan leda till livshotande överdosering. Risken för dessa biverkningar kan öka vid högre dos och mer långvarig användning.

Beroende eller missbruk kan innebära att du känner att du inte längre har kontroll över hur mycket läkemedel du behöver ta och hur ofta du behöver ta det. Du kan känna att du behöver fortsätta att ta läkemedlet även om det inte hjälper till att lindra din smärta eller ditt svåra rastlösa ben-syndrom.

Risken för beroende varierar från person till person. Du kan löpa större risk för beroende av Oxycodone/Naloxone ratiopharm om:

- du eller någon i din familj någonsin har missbrukat eller varit beroende av alkohol, receptbelagda läkemedel eller illegala droger ("missbruk")
- du är rökare
- du någonsin har haft problem med humöret (depression, ångest eller personlighetsstörning) eller har behandlats av psykiater för andra psykiska störningar.

Om du märker något av följande tecken medan du tar Oxycodone/Naloxone ratiopharm kan det vara ett tecken på att du har blivit beroende:

- du behöver ta läkemedlet under en längre tid än vad läkaren har ordinerat
- du behöver ta mer än den rekommenderade dosen
- du använder läkemedlet av andra skäl än de läkaren ordinerat, till exempel för att "känna dig lugn" eller för att "få hjälp att sova"
- du har gjort upprepade, misslyckade försök att sluta eller få kontroll över läkemedelsanvändningen
- när du slutar att ta läkemedlet kan du känna dig sjuk och må bättre när du tar läkemedlet igen ("utsättningssymtom").

Om du märker några av dessa tecken ska du tala med läkare för att diskutera den bästa behandlingsvägen för dig, samt när det är lämpligt att sluta och hur du ska sluta på ett säkert sätt (se avsnitt 3, "Om du slutar använda Oxycodone/Naloxone ratiopharm").

Långt framskriden cancer i matsmältningsorganen eller bäckenregionen

Tala om för läkaren om du har cancerrelaterade bukhinnemetastaser eller begynnande tarmstopp vid framskridna stadier av mag-/tarm- och bäckencancer.

Operationer

Om du måste opereras ska du berätta för läkaren att du tar Oxycodone/Naloxone ratiopharm.

Inverkan på kroppens produktion av hormoner

Liksom andra opioider, kan oxikodon påverka kroppens normala produktion av hormoner, såsom kortisol eller könshormoner, särskilt om du har tagit höga doser under lång tid. Om du upplever ihållande symtom, som att du är eller känner dig sjuk eller illamående (inklusive kräkningar), aptitlöshet, trötthet, svaghet, yrsel, förändringar i menstruationscykeln, impotens, infertilitet eller minskad sexlust, tala med din läkare eftersom han/hon kan vilja undersöka dina hormonnivåer.

Hyperalgesi (ökad smärtupplevelse)

Detta läkemedel kan öka din känslighet för smärta särskilt om du använder höga doser. Tala om för läkaren om detta inträffar. En dosminskning eller ett byte till något annat läkemedel kan krävas.

Tabletterester i avföringen

Då du tar detta läkemedel kan du upptäcka rester av depottabletterna i din avföring. Detta utgör inget skäl till oro. De aktiva substanserna (oxikodonhydroklorid och naloxonhydroklorid) har redan frisatts och sugits upp i kroppen ur din magsäck och tarm.

Inkorrekt bruk av Oxycodone/Naloxone ratiopharm

Oxycodone/Naloxone ratiopharm är inte lämpligt för behandling av utsättningsymtom.

Oxycodone/Naloxone ratiopharm 5 mg/2,5 mg depottabletterna ska sväljas hela och de får varken delas, söndras, tuggas på eller krossas. Delade, söndrade, krossade eller söndertuggade depottabletter kan leda till ett upptag av potentiellt dödliga halter av oxikodonhydroklorid i kroppen (se avsnitt 3 ”Om du har tagit för stor mängd av Oxycodone/Naloxone ratiopharm”).

Oxycodone/Naloxone ratiopharm 10 mg/5 mg och 20 mg/10 mg depottabletterna kan delas till lika stora doser, men de får inte tuggas eller krossas. Söndertuggade eller krossade depottabletter kan leda till ett upptag av potentiellt dödliga halter av oxikodonhydroklorid i kroppen (se avsnitt 3 ”Om du har tagit för stor mängd av Oxycodone/Naloxone ratiopharm”).

Missbruk

Oxycodone/Naloxone ratiopharm bör aldrig missbrukas. Detta gäller särskilt om du är narkotikaberoende. Om du är beroende av substanser såsom heroin, morfin eller metadon, är det troligt att du drabbas av svåra abstinenssymtom om du missbrukar Oxycodone/Naloxone ratiopharm eftersom det innehåller den aktiva substansen naloxon. Redan existerande abstinenssymtom kan förvärras.

Felaktigt bruk

Du får aldrig missbruka Oxycodone/Naloxone ratiopharm depottabletter genom att lösa upp och injicera dem (t.ex. i ett blodkärl). Tabletterna innehåller talk som kan leda till lokal vävnadsförstöring (nekros) och förändringar av lungvävnaden (lunggranulom). Sådant missbruk kan även ha andra allvarliga konsekvenser och kan till och med vara dödligt.

Doping

Idrottare bör observera att användningen av Oxycodone/Naloxone ratiopharm kan orsaka positiva resultat vid dopningkontroller. Användning av Oxycodone/Naloxone ratiopharm som dopningsmedel utgör en hälsorisk.

Andra läkemedel och Oxycodone/Naloxone ratiopharm

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas använda andra läkemedel.

Risken för biverkningar ökar om du tar antidepressiva läkemedel (till exempel citalopram, duloxetin, escitalopram, fluoxetin, fluvoxamin, paroxetin, sertralin, venlafaxin). Dessa läkemedel kan påverka eller påverkas av oxikodon, och du kan få symtom som ofrivilliga, rytmiska muskelsammandragningar (inklusive i musklerna som styr ögonrörelserna), agitation (rastlöshet), kraftiga svettningar, skakningar, överdrivna reflexmässiga rörelser, ökad muskelspänning, kroppstemperatur över 38 °C. Kontakta din läkare om du upplever dessa symtom.

Samtidig användning av opioider, inklusive oxikodonhydroklorid, och lugnande läkemedel mot sömnbesvär, såsom bensodiazepiner eller liknande läkemedel, ökar risken för dåsighet, andningssvårigheter (andningsdepression), koma och kan vara livshotande. På grund av detta ska samtidig användning endast övervägas när andra behandlingsalternativ inte är möjliga.

Om läkaren skriver ut Oxycodone/Naloxone ratiopharm tillsammans med lugnande läkemedel bör dosen och behandlingstiden begränsas av läkaren.

Tala om för din läkare om du tar något lugnande läkemedel och följ noggrant läkarens dosrekommendation. Det kan vara bra att informera vänner eller anhöriga om att vara uppmärksamma på de tecken och symtom som anges ovan. Kontakta läkare när du upplever sådana symtom. Exempel på dessa lugnande eller liknande läkemedel är:

- andra potenta smärtstillande medel (opioider)
- läkemedel för behandling av epilepsi, smärta och ångest, såsom gabapentin och pregabalin
- sömnmedel och lugnande medel (sedativa inklusive bensodiazepiner, hypnotika, anxiolytika)
- depressionsmediciner
- läkemedel som används för att behandla allergi, åksjuka eller illamående (antihistaminer eller antiemetika)
- läkemedel för att behandla psykiska störningar (antipsykotika som inkluderar fentiaziner och neuroleptika).

Om du tar detta läkemedel samtidigt som du tar något av de läkemedel som anges nedan, kan effekten påverkas. Tala om för din läkare om du tar:

- läkemedel som minskar blodets förmåga att koagulera (kumarinderivat), eftersom koaguleringsstiden kan förlängas eller förkortas
- makrolidantibiotika (t.ex. klaritromycin, erytromycin eller telitromycin)
- svampmedel av azoltyp (t.ex. ketokonazol, vorikonazol, itrakonazol eller posakonazol)
- en specifik typ av läkemedel som kallas proteashämmare (används för att behandla HIV) (exempelvis ritonavir, indinavir, nelfinavir eller sakvinavir)
- cimetidin (ett läkemedel mot magsår, dålig matsmältning eller halsbränna)
- rifampicin (används för att behandla tuberkulos)
- karbamazepin (används för att behandla krampanfall och vissa smärttillstånd)
- fenytoin (används för att behandla krampanfall eller konvulsioner)
- ett (traditionellt) växtbaserat läkemedel för behandling av depression som kallas johannesört (även känd som *Hypericum perforatum*)
- kinidin (ett läkemedel för att behandla oregelbunden hjärtrytm).

Inga interaktioner förväntas förekomma mellan Oxycodone/Naloxone ratiopharm och paracetamol, acetylsalicylsyra eller naltrexon.

Oxycodone/Naloxone ratiopharm med mat, dryck och alkohol

Om du dricker alkohol samtidigt som du tar Oxycodone/Naloxone ratiopharm kan det göra att du känner dig mera sömning än vanligt eller öka risken för allvarliga biverkningar som t.ex. ytlig andning med risk för andningsuppehåll och medvetslöshet. Du ska inte dricka alkohol när du tar Oxycodone/Naloxone ratiopharm.

Undvika att dricka grapefruktjuice när du tar Oxycodone/Naloxone ratiopharm.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Graviditet

Användning av Oxycodone/Naloxone ratiopharm ska undvikas under graviditet, såvida inte läkaren anser en behandling med detta läkemedel vara absolut nödvändig. Vid användning under längre tid i samband med graviditet kan oxikodonhydroklorid leda till abstinenssymtom hos det nyfödda barnet. Om oxikodonhydroklorid ges under förlossningen, kan det nyfödda barnet drabbas av andningsdepression (långsam och ytlig andning).

Amning

Sluta amma under behandlingen med Oxycodone/Naloxone ratiopharm. Oxikodonhydroklorid passerar över i bröstmjölken. Det är inte känt om naloxonhydroklorid också passerar över i bröstmjölken. Risk för det ammade barnet kan inte uteslutas framför allt efter intag av upprepade doser av Oxycodone/Naloxone ratiopharm hos den ammande modern.

Körförmåga och användning av maskiner

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Oxycodone/Naloxone ratiopharm kan påverka din förmåga att köra bil eller använda maskiner, eftersom läkemedlet kan orsaka dåsighet och yrsel. Detta gäller särskilt i början av behandlingen, efter en ökning av dosen eller efter ett byte till Oxycodone/Naloxone ratiopharm från något annat läkemedel. Dessa biverkningar försvinner dock i allmänhet så snart du står på en stabil dos av Oxycodone/Naloxone ratiopharm.

Detta läkemedel har förknippats med sömnhet och episoder av plötsligt insomnande. Om du upplever dessa biverkningar får du inte köra bil eller använda maskiner. Du ska berätta för din läkare om detta inträffar.

Fråga din läkare om du kan köra eller använda maskiner.

Oxycodone/Naloxone ratiopharm innehåller natrium

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per tablett, d.v.s. är näst intill "natriumfritt".

3. Hur du använder Oxycodone/Naloxone ratiopharm

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Innan du påbörjar behandlingen och regelbundet under behandlingen kommer läkaren att diskutera med dig vad du kan förvänta dig av användningen av Oxycodone/Naloxone ratiopharm, när och hur länge du behöver ta det, när du ska kontakta läkare och när du behöver sluta med behandlingen (se även "Om du slutar använda Oxycodone/Naloxone ratiopharm").

Oxycodone/Naloxone ratiopharm är en depottablett, vilket innebär att dess aktiva substanser frisätts under en längre tid. Dess verkan varar i 12 timmar.

Oxycodone/Naloxone ratiopharm 5 mg/2,5 mg depottabletterna ska sväljas hela och de får varken delas, söndras, tuggas på eller krossas. Ett intag av delade, söndrade, krossade eller söndertuggade

depottabletter kan leda till ett upptag av potentiellt dödliga halter av oxikodonhydroklorid i kroppen (se avsnitt 3 "Om du har tagit för stor mängd av Oxycodone/Naloxone ratiopharm").

Oxycodone/Naloxone ratiopharm 10 mg/5 mg och 20 mg/10 mg depottabletterna kan delas till lika stora doser, men de får inte tuggas eller krossas. Ett intag av söndertuggade eller krossade depottabletter kan leda till ett upptag av potentiellt dödliga halter av oxikodonhydroklorid i kroppen (se avsnitt 3 "Om du har tagit för stor mängd av Oxycodone/Naloxone ratiopharm").

Vanlig dos, om din läkare inte har föreskrivit något annat:

För behandling av smärta

Vuxna

Den vanliga startdosen är 10 mg oxikodonhydroklorid/5 mg naloxonhydroklorid som depottablett(er) var 12:e timme.

Din läkare avgör hur stor mängd Oxycodone/Naloxone ratiopharm du ska ta varje dag och hur du ska dela upp den totala dagliga dosen i morgon- och kvällsdoser. Läkaren avgör också om någon dosjustering behöver göras under behandlingen. Din dos kommer att bestämmas beroende på graden av smärta och individuell känslighet. Du bör ges den lägsta dosen som behövs för smärtlindring. Om du redan sen tidigare behandlas med opioider kan behandlingen med Oxycodone/Naloxone ratiopharm starta på en högre dos än vanligt.

Den högsta dagliga dosen är 160 mg oxikodonhydroklorid och 80 mg naloxonhydroklorid. Om du behöver en högre dos kan din läkare ge ytterligare oxikodonhydroklorid utan naloxonhydroklorid. Den totala dagliga dosen oxikodonhydroklorid får inte överstiga 400 mg.

Naloxonhydrokloridens fördelaktiga effekt på tarmaktiviteten kan försvagas om ytterligare oxikodonhydroklorid ges utan ytterligare naloxonhydroklorid.

Om du ska byta ut Oxycodone/Naloxone ratiopharm mot någon annan stark opioid kommer troligen din tarmfunktion att försämrans.

Om du upplever smärta mellan två doser av Oxycodone/Naloxone ratiopharm kan du behöva ta ett snabbverkande smärtstillande medel. Oxycodone/Naloxone ratiopharm är inte lämpligt för detta. Tala med din läkare i ett sådant fall.

Tala med din läkare eller apotekspersonalen om du upplever att effekten av Oxycodone/Naloxone ratiopharm är alltför stark eller alltför svag.

Behandling av rastlösa ben

Vuxna

Vanlig inledningsdos är 5 mg oxikodonhydroklorid/2,5 mg naloxonhydroklorid som depottabletter var 12:e timme.

Din läkare avgör hur stor mängd du ska ta varje dag och hur du ska dela upp den totala dagliga dosen i morgon- och kvällsdoser. Läkaren avgör också om någon dosjustering behöver göras under behandlingen. Din dos kommer att justeras beroende på graden av individuell känslighet. Du bör ges den lägsta dosen som behövs för lindring av dina symtom på rastlösa ben.

Om du upplever att effekten av dessa tabletter är för stark eller för svag, tala med läkare eller apotekspersonal.

Den högsta dagliga dosen är 60 mg oxikodonhydroklorid och 30 mg naloxonhydroklorid.

För doser som inte är möjliga/genomförbara med denna styrka, finns andra styrkor tillgängliga.

För behandling av smärta och rastlösa ben:

Äldre patienter

I allmänhet krävs ingen dosjustering för äldre patienter med normal njur- och leverfunktion.

Nedsatt lever- eller njurfunktion

Om du lider av nedsatt njurfunktion eller lindrigt nedsatt leverfunktion kommer din behandlande läkare att ordinera Oxycodone/Naloxone ratiopharm med särskild försiktighet. Om du lider av måttligt eller allvarligt nedsatt leverfunktion ska Oxycodone/Naloxone ratiopharm inte användas (se även avsnitt 2 "Ta inte Oxycodone/Naloxone ratiopharm" och "Varningar och försiktighet").

Barn och ungdomar under 18 år

Några studier med Oxycodone/Naloxone ratiopharm på barn och ungdomar under 18 år har ännu inte genomförts. Dess säkerhet och effekt har inte bevisats för denna åldersgrupp. Av detta skäl rekommenderas inte användning av Oxycodone/Naloxone ratiopharm för barn och ungdomar under 18 år.

Administreringssätt

Ta Oxycodone/Naloxone ratiopharm 5 mg/2,5 mg depottabletterna tillsammans med en tillräcklig mängd vatten (1/2 glas). Svälj depottabletterna hela; de får inte delas, söndras, tuggas på eller krossas. Depottabletterna kan tas såväl med som utan mat.

Ta Oxycodone/Naloxone ratiopharm 10 mg/5 mg och 20 mg/10 mg depottabletterna tillsammans med en tillräcklig mängd vatten (1/2 glas). Depottabletterna kan delas i två lika stora doser. Depottabletterna får inte tuggas på eller krossas. Depottabletterna kan tas såväl med som utan mat.

Ta Oxycodone/Naloxone ratiopharm var 12:e timme enligt ett fast tidsschema (t.ex. klockan 8 på morgonen och klockan 20 på kvällen).

Behandlingstid

I allmänhet ska du inte ta Oxycodone/Naloxone ratiopharm under längre tid än du behöver. Om du står på långtidsbehandling med Oxycodone/Naloxone ratiopharm bör din läkare regelbundet kontrollera om du fortfarande behöver läkemedlet.

Om du har tagit för stor mängd av Oxycodone/Naloxone ratiopharm

Om du fått i dig en alltför stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta omedelbart läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 0800 147 111) för bedömning av risken samt rådgivning.

En överdos kan leda till:

- pupillförminskning
- långsam och ytlig andning (andningsdepression)
- dåsighet ända till medvetslöshet
- låg muskeltonus (hypotoni)
- minskad puls
- blodtrycksfall
- en hjärnsjukdom (kallad toxisk leukoencefalopati).

I allvarliga fall kan medvetslöshet (koma), vätska i lungorna och cirkulationskollaps uppträda, som kan vara dödlig i vissa fall.

Du bör undvika situationer som kräver en hög grad av vakenhet, t.ex. bilkörning.

Om du har glömt att ta Oxycodone/Naloxone ratiopharm

Om du har glömt att ta Oxycodone/Naloxone ratiopharm eller om du tar en dos som är lägre än den ordinerade kan det tänkas att du inte upplever någon effekt.

Följ anvisningarna nedan om du har glömt att ta din dos:

- Om det är 8 timmar eller mer till nästa vanliga dos: Ta den bortglömda dosen omedelbart och fortsätt med ditt normala doseringsschema.

- Om nästa normala dos ska tas inom mindre än 8 timmar: Ta den bortglömda dosen. Vänta därefter ytterligare 8 timmar innan du tar nästa dos. Försök att komma tillbaka till ditt ursprungliga doseringsschema (t.ex. klockan 8 på morgonen och klockan 20 på kvällen).
- Ta aldrig mer än en dos inom en 8-timmarsperiod.

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett.

Om du slutar använda Oxycodone/Naloxone ratiopharm

Avbryt inte behandlingen med Oxycodone/Naloxone ratiopharm utan att rådfråga din läkare.

Om du inte längre behöver denna behandling, måste du minska den dagliga dosen gradvis efter att du har talat med din läkare. På detta sätt kan du undvika abstinenssymtom, såsom rastlöshet, svettningsskov och muskelsmärter.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Biverkningssymtom du bör vara uppmärksam på och instruktioner för vad du ska göra om du drabbas:

Om du får någon av följande viktiga biverkningar ska du omedelbart ta kontakt med närmaste läkare.

Långsam och ytlig andning (andningsdepression) är den viktigaste faran med en överdos av opioider. Detta drabbar i huvudsak äldre och försvagade (kraftlösa) patienter. Opioider kan även leda till ett plötsligt och allvarligt blodtrycksfall hos känsliga patienter.

Följande biverkningar har rapporterats hos patienter som behandlats för smärta:

Vanliga (förekommer hos högst 1 användare av 10):

- magsmärter
- förstoppning
- diarré
- muntorrhet
- matsmältningsbesvär
- kräkningar
- illamående
- gasbesvär
- minskad matlust eller t.o.m. total aptitlöshet
- svindel eller yrsel
- huvudvärk
- heta vallningar
- ovanlig svaghetskänsla
- trötthet eller utmattning
- hudklåda
- hudreaktioner/ hudutslag
- svettningar
- vertigo (snurrande yrsel)
- sömnsvårigheter
- dåsighet.

Mindre vanliga (förekommer hos högst 1 användare av 100):

- svullen mage
- avvikande tankegångar

- ångest
- förvirring
- depression
- nervositet
- trånghets känsla i bröstet, speciellt hos personer med kranskärlssjukdom
- blodtrycksfall
- abstinenssymtom som upprördhet
- svimning
- brist på energi
- törst
- förändrade smakupplevelser
- hjärtklappning
- gallstensanfall
- bröstsmärtor
- allmän sjukdomskänsla
- smärtor
- svullna händer, vristar eller fötter
- koncentrationssvårigheter
- talstörningar
- skakningar
- andningssvårigheter
- rastlöshet
- frossa
- förhöjda leverenzymvärden
- blodtrycksökning
- minskad sexlust
- snuva
- hosta
- överkänslighet/allergiska reaktioner
- viktnedgång
- skador till följd av olycksfall
- ökade urinträngningar
- muskelkramper
- muskelryckningar
- muskelsmärter
- nedsatt syn
- epileptiska anfall (speciellt hos personer med epilepsi eller tendens till krampanfall).

Sällsynta (förekommer hos högst 1 användare av 1 000):

- ökad pulsfrekvens
- läkemedelsberoende
- tandförändringar
- viktökning
- gäspningar.

Ingen känd frekvens (frekvens kan inte beräknas från tillgängliga data):

- eufori (överdriven lyckokänsla)
- grav dåsighet
- erektionsstörningar
- mardrömmar
- hallucinationer
- yttlig andning
- urinerings svårigheter
- aggressivitet
- stickningar och domningar
- rapningar
- sömnapné (andningsuppehåll under sömnen).

Om den aktiva substansen oxikodonhydroklorid används utan tillägg av naloxonhydroklorid, är biverkningarna litet annorlunda. I sådana fall förekommer följande biverkningar:
Oxikodon kan leda till andningsproblem (andningsdepression), pupillförminskningar, kramper i bronkialmusklerna och kramper i den glatta muskulaturen, samt hämrad hostreflex.

Vanliga (förekommer hos högst 1 användare av 10):

- humörsvängningar och personlighetsförändringar (som depression, känsla av överdriven glädje, sänkt aktivitetsnivå, överaktivitet)
- urineringssvårigheter
- hicka.

Mindre vanliga (förekommer hos högst 1 användare av 100):

- försämrad koncentrationsförmåga
- migrän
- ökad muskelspänning
- ofrivilliga muskelsammandragningar
- tarmstopp (ileus)
- torr hud
- läkemedelstolerans
- försämrat känselsinne gällande smärta eller beröring
- avvikande koordinationsförmåga
- röstförändringar (dysfoni)
- svullnader till följd av vätskeansamling
- sänkt hörsel
- sår i munnen
- sväljsvårigheter
- ömt tandkött
- perceptionsstörningar (t.ex. hallucinationer, överklighetskänsla)
- anfall av hudrodnad (flush)
- vätskebrist
- upprördhet
- en minskning av könshormonnivåer som kan påverka spermieproduktionen hos män eller menstruationscykeln hos kvinnor.

Sällsynta (förekommer hos högst 1 användare av 1 000):

- kliande hudutslag (nässelutslag)
- infektioner såsom munherpes eller herpes på könsorganen (som kan orsaka blåsor kring munnen eller på könsorganen)
- ökad aptit
- svart (tjäraktig) avföring
- blödande tandkött.

Ingen känd frekvens (frekvens kan inte beräknas från tillgängliga data):

- akuta, generaliserade allergiska reaktioner (anafylaktiska reaktioner)
- ökad smärtkänslighet
- utebliven menstruation
- abstinenssymtom hos nyfödda
- Oddis sfinkterdysfunktion (ett tillstånd som påverkar gallgångens normala funktion)
- problem med gallflödet
- karies.

Följande biverkningar har rapporterats hos patienter som behandlats för rastlösa ben:

Mycket vanliga (förekommer hos fler än 1 användare av 10):

- huvudvärk
- dåsighet

- förstoppning
- illamående
- svettningar
- trötthet eller utmattning

Vanliga (förekommer hos högst 1 användare av 10):

- sänkt aptit eller t.o.m. total aptitlöshet
- sömnlöshet
- depression
- svindel eller yrsel
- koncentrationssvårigheter
- skakningar
- stickande känningar i händer eller fötter
- nedsatt syn
- vertigo (snurrande yrsel)
- heta vallningar
- blodtrycksfall
- blodtrycksökning
- magsmärter
- muntorrhet
- kräkningar
- förhöjda leverenzymvärden (förhöjda ALAT- och GGT-värden)
- hudklåda
- hudreaktioner/hudutslag
- bröstsmärter
- frossa
- smärter
- törst

Mindre vanliga (förekommer hos högst 1 användare av 100):

- minskad sexlust
- episoder av plötsligt insomnande
- förändrade smakupplevelser
- andningssvårigheter
- gasbesvär
- erektionsstörningar
- abstinensbesvär som t.ex. upprördhet
- svullna händer, vristar eller fötter
- skador till följd av olycksfall

Ingen känd frekvens (frekvens kan inte beräknas från tillgängliga data):

- överkänslighet/allergiska reaktioner
- avvikande tankegångar
- ångest
- förvirring
- nervositet
- rastlöshet
- eufori (överdriven lyckokänsla)
- hallucinationer
- mardrömmar
- epileptiska anfall (speciellt hos personer med epilepsi eller tendens till krampanfall)
- läkemedelsberoende
- grav dåsighet
- talstörningar
- svimning
- åtstramande känsla över bröstet, speciellt hos personer med kranskärlssjukdom
- hjärtklappning

- ökad pulsfrekvens
- ytlig andning
- hosta
- snuva
- gäspningar
- svullen mage
- diarré
- aggressivitet
- matsmältningsbesvär
- rapningar
- tandförändringar
- gallstensanfall
- muskelkramper
- muskelryckningar
- muskelsmärter
- urineringssvårigheter
- ökade urinträngningar
- allmän sjukdomskänsla
- viktnedgång
- viktökning
- ovanlig svaghetskänsla
- brist på energi.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

webbplats: www.fimea.fi

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea

Biverkningsregistret

PB 55

00034 FIMEA

5. Hur Oxycodone/Naloxone ratiopharm ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn. Förvara detta läkemedel i ett låst och säkert förvaringsutrymme, där andra personer inte kan komma åt det. Det kan orsaka allvarlig skada och vara dödligt för personer som inte har förskrivits läkemedlet.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen, tablettburken och blisterskivan efter ”EXP”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Tryckförpackningar (blisterförpackningar): Förvaras vid högst 25°C.

Tablettburkar: Förvaras vid högst 30°C.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

- De aktiva substanserna är oxikodonhydroklorid och naloxonhydroklorid.
Oxycodone/Naloxone ratiopharm 5 mg/2,5 mg: En depottablett innehåller 5 mg

oxikodonhydroklorid (vilket motsvarar 4,5 mg oxikodon) och 2,5 mg naloxonhydroklorid (i form av 2,74 mg naloxonhydrokloriddihydrat, vilket motsvarar 2,25 mg naloxon).

Oxycodone/Naloxone ratiopharm 10 mg/5 mg: En depottablett innehåller 10 mg oxikodonhydroklorid (vilket motsvarar 9 mg oxikodon) och 5 mg naloxonhydroklorid (i form av 5,45 mg naloxonhydrokloriddihydrat, vilket motsvarar 4,5 mg naloxon).

Oxycodone/Naloxone ratiopharm 20 mg/10 mg: En depottablett innehåller 20 mg oxikodonhydroklorid (vilket motsvarar 18 mg oxikodon) och 10 mg naloxonhydroklorid (i form av 10,9 mg naloxonhydrokloriddihydrat, vilket motsvarar 9 mg naloxon).

- Övriga innehållsämnen

I tabletkärnan är:

Poly(vinylacetat), povidon, natriumlaurilsulfat, kolloidal vattenfri kiseldioxid, mikrokristallin cellulosa och magnesiumstearat.

I depotdrageringen är:

Poly(vinylalkohol), titandioxid (E 171), makrogol och talk.

Utöver dessa ämnen innehåller depotdrageringen på Oxycodone/Naloxone ratiopharm 10 mg/5 mg röd järnoxid (E 172).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Oxycodone/Naloxone ratiopharm 5 mg/2,5 mg depottabletter

Vita, runda, bikonvexa depottabletter med en diameter på 4,7 mm och en tjocklek på 2,9 - 3,9 mm.

Oxycodone/Naloxone ratiopharm 10 mg/5 mg depottabletter

Ljusröda, avlånga, bikonvexa depottabletter med brytskåra på bägge sidor av tablettarna. Längd: 10,2 mm; bredd 4,7 mm och tjocklek 3,0 - 4,0 mm. Varje depottablett kan delas i två lika stora doser.

Oxycodone/Naloxone ratiopharm 20 mg/10 mg depottabletter

Vita, avlånga, bikonvexa depottabletter med brytskåra på bägge sidor av tablettarna. Längd: 11,2 mm; bredd 5,2 mm och tjocklek 3,3 - 4,3 mm. Varje depottablett kan delas i två lika stora doser.

Förpackningsstorlekar:

Oxycodone/Naloxone ratiopharm finns att få i barnsäkra tryckförpackningar (blisterförpackningar) på 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 90, 98 eller 100 depottabletter; i dosperforerade barnsäkra tryckförpackningar (blisterförpackningar) på 10x1, 14x1, 20x1, 28x1, 30x1, 50x1, 56x1, 60x1, 90x1, 98x1 och 100x1 depottabletter; samt i tablettburkar med barnsäkert skruvlock på 50, 100, 200 eller 250 depottabletter.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning:

ratiopharm GmbH
Graf-Arco-Straße 3
89079 Ulm
Tyskland

Tillverkare:

Develco Pharma GmbH
Grienmatt 27
79650 Schopfheim
Tyskland

Teva Operations Poland Sp. z o.o.
ul. Mogilska 80
31-546 Krakow

Polen

PLIVA Hrvatska d.o.o. (PLIVA Croatia Ltd.)
Prilaz baruna Filipovića 25
10000 Zagreb
Kroatien

Ytterligare upplysningar om detta läkemedel kan erhållas hos den nationella representanten för innehavaren av godkännandet för försäljning.

Teva Finland Oy
PB 67
02631 Esbo
Tel: 020 180 5900

Denna bipacksedel ändrades senast den 17.4.2024.