

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle

FUCICORT® LIPID 20 mg/g + 1 mg/g emulsiovoide

fusidiinihappo, beetametasoni

Lue tämä seloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

- Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
- Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
- Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
- Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen, vaikka kokemiasi haittavaikutuksia ei olisikaan mainittu tässä pakkausselosteessa.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

1. Mitä Fucicort® Lipid -emulsiovoide on ja mihin sitä käytetään
2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Fucicort® Lipid -emulsiovoidetta
3. Miten Fucicort® Lipid -emulsiovoidetta käytetään
4. Mahdolliset haittavaikutukset
5. Fucicort® Lipid -emulsiovoiteen säilyttäminen
6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä Fucicort® Lipid -emulsiovoide on ja mihin sitä käytetään

Fucicort® Lipid on rasvainen emulsiovoide, joka on kortikosteroidin (beetametasoni) ja antibiootin (fusidiinihappo) yhdistelmä.

Beetametasoni hillitsee tulehdusreaktiota ja fusidiinihapolla on antibakteerinen vaikutus. Paikallishoitoon tarkoitetut, kortikosteroideja sisältävät lääkevalmisteet jaetaan neljään eri vahvuusluokkaan: I Miedot, II Keskivahvat, III Vahvat ja IV Erittäin vahvat. Fucicort® Lipid -emulsiovoide kuuluu III-ryhmän kortikosteroideihin.

Käyttötarkoitukset

Fucicort® Lipid -emulsiovoidetta käytetään sellaisten ihosairauksien hoidossa, joihin liittyy fusidiinille herkän bakteerin aiheuttama tulehdus.

Mikäli lääkäri on antanut valmisteeseen käytöstä muita ohjeita, noudatetaan niitä.

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Fucicort® Lipid -emulsiovoidetta

Älä käytä Fucicort® Lipid -emulsiovoidetta,

- jos olet allerginen fusidiinihapolle/natriumfusidaatille tai beetametasonivaleraatille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6).
- jos sinulla on sienen aiheuttama tulehdus koko kehossa.
- jos sinulla on viruksen, bakteerin tai sienen aiheuttama tulehdus, akne, ruusufinni tai suuta ympäröivän ihon tulehdus tai ihotuberkuloosiin viittaavia oireita ja nämä ovat hoitamattomia tai niiden nykyinen hoito ei ole riittävä.

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin käytät Fucicort® Lipid -emulsiovoidetta.

Ota yhteyttä lääkäriin, jos sinulla esiintyy näön hämärtymistä tai muita näköhäiriöitä.

Ole erityisen varovainen Fucicort® Lipid -emulsiovoiteen suhteen

- jos sinulla on kutinaa sukupuolielinten alueella tai ihon pintaverisuonten hauraus
- hoidettaessa laajoja ihoalueita, käytettäessä valmistetta kasvoin tai ihopoimuissa
- jos valmistetta käytetään lapselle.
- Vältä emulsiovoiteen joutumista silmiin, myös hoidettaessa silmien ympärillä olevaa ihoa.
- Vältä emulsiovoiteen joutumista avoimiin haavoihin ja limakalvoille.
- Vältä suuria määriä, suojaavia siteitä ja pitkäikäistä hoitoa.
- Koska valmiste sisältää beetametasonivaleraattia, pitkäaikainen Fucicort® Lipid -emulsiovoiteen käyttö voi aiheuttaa ihon ohentumista.

Muut lääkevalmisteet ja Fucicort® Lipid -emulsiovoide

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät, olet äskettäin käyttänyt tai saatat joutua käyttämään muita lääkkeitä.

Raskaus ja imetys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Valmistetta ei suositella käytettäväksi raskauden aikana.

Valmistetta voidaan käyttää imetyksen aikana, mutta on suositeltavaa välttää käyttöä rintojen alueella.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Fucicort® Lipid -emulsiovoiteella ei ole haitallista vaikutusta ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn.

Fucicort® Lipid -emulsiovoide sisältää:

- setostearyylialkoholia ja kaliumsorbaattia, jotka saattavat aiheuttaa ihoärsytystä (esim. kosketusihottuma)
- metyyliiparahydroksibentsoaattia ja propyyliiparahydroksibentsoaattia, jotka saattavat aiheuttaa allergisia reaktioita (mahdollisesti viivästyneitä).

3. Miten Fucicort® Lipid -emulsiovoidetta käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Suosittelun annos on: Fucicort® Lipid -emulsiovoidetta sivellään hoidettavalle ihoalueelle ohuelti 2 kertaa päivässä 2 viikon ajan.

Jos sinusta tuntuu, että valmisteen vaikutus on liian voimakas tai liian heikko, kerro asiasta lääkärillesi tai apteekkiin.

Jos käytät enemmän Fucicort® Lipid -emulsiovoidetta kuin sinun pitäisi

Tietoa paikallisesti annostellun fusidiinihapon aiheuttamista yliannostuksen oireista ei ole. Paikallisesti käytettävien kortikosteroidien liiallinen pitkäaikaiskäyttö saattaa aiheuttaa lisämunuaisen kuorikerroksen vajaatoiminnan, joka tavallisesti on ohimenevä.

Jos unohdat käyttää Fucicort® Lipid -emulsiovoidetta

Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen.

Jos lopetat Fucicort® Lipid -emulsiovoiteen käytön

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Yleisin hoidon aikana raportoitu haittavaikutus on kutina.

Melko harvinainen (esiintyy harvemmin kuin 1 käyttäjällä 100:sta):

- erilaiset hoidettavan ihoalueen ärsysoireet, esim.
 - polttava tunne iholla,
 - antopaikan kipu ja ärsytys,
 - yliherkkyys,
 - kuiva iho,
 - kosketusihottuma ja
 - kutina.

Harvinainen (esiintyy harvemmin kuin 1 käyttäjällä 1000:sta)

- ihottuma,
- punoitus,
- nokkosihottuma sekä
- hoidettavan alueen turvotus ja vesirakkulat.

Tuntematon (esiintymistiheyttä ei voida arvioida saatavilla olevan tiedon perusteella):

- näön hämärtyminen.

Pitkään jatkuva hoito paikalliskortikosteroideilla saattaa aiheuttaa ihon ohenemista (atrofia), pintaverisuonien laajenemista (telangiektasia), ihon juovaisuutta (striat), ihon punoitusta (eryteema), kosketusihottumaa, aknea muistuttavaa ihottumaa, mustelmia, ruusufinniä (rosacea), lisääntyntä karvankasvua, liikahikoilua sekä ihopigmentin määrän vähenemistä (depigmentaatio). Myös silmänsisäisen paineen nousua ja glaukoomaa on raportoitu silmän alueelle tapahtuvan paikallisen annostelun yhteydessä. Koko elimistöön kohdistuvia haittavaikutuksia saattaa ilmetä varsinkin suojaavia siteitä käytettäessä (okklusiovaikutus) tai hoidettaessa laajoja ihoalueita.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus FIMEA

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

FI-00034 FIMEA

5. Fucicort® Lipid -emulsiovoiteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Säilyttäminen, ks. pakkaus.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää. Avatun voideputken käyttöaika on 3 kuukautta.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Fucicort® Lipid -emulsiovoide sisältää

- Vaikuttavat aineet ovat: fusidiinihappo 20mg/g ja beetametasoni (valeraattina) 1 mg/g
- Muut aineet, ks. pakkaus

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko

Valkoinen emulsiovoide

Alumiinituubi 30 g

Myyntiluvan haltija

Orifarm Oy
PL 251
01511 Vantaa, Suomi
sähköposti: info@orifarm.com

Valmistaja

ks. pakkaus

Uudelleenpakkaaja

Orifarm Supply s.r.o.
Palouky 1366
253 01 Hostivice, Tšekki

Lisätietopyynnöt osoitetaan Orifarm Oy:lle.

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 1.7.2021

Bipacksedel: Information till användaren

FUCICORT® LIPID 20 mg/g + 1 mg/g kräm

fusidinsyra, betametason

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.
- Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.
- Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

I denna bipacksedel finner du information om följande:

1. Vad Fucicort® Lipid -kräm är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Fucicort® Lipid -kräm
3. Hur du använder Fucicort® Lipid -kräm
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Fucicort® Lipid -kräm ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Fucicort® Lipid -kräm är och vad det används för

Fucicort® Lipid -kräm innehåller fusidinsyra som är ett antibiotikum och betametason som är en kortikosteroid. Fusidinsyra har antibakteriell effekt och betametason hämmar inflammationen.

Preparat som innehåller kortikosteroider och används vid lokalbehandling indelas i fyra grupper I – IV enligt styrka: I Svaga, II Medelstarka, III Starka, IV Extra starka. Fucicort® Lipid -kräm är en grupp III kortikosteroid.

Bruksändamål

Fucicort® Lipid -kräm används vid behandling av hudsjukdomar med infektion som är förorsakad av bakterier känsliga för fusidinsyra. Ifall läkaren har gett anvisningar till behandling för annan användning, bör anvisningarna följas.

2. Vad du behöver veta innan du använder Fucicort® Lipid -kräm

Använd inte Fucicort® Lipid -kräm,

- om du är allergisk mot fusidinsyra/sodiumfusidat eller betametasonvalerat eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).
- om du har svampinfektion som drabbar hela kroppen.
- om du har virus-, -bakterie- eller svampinfektion, acne, rosacea, eksem omkring munnen eller hudutslag i

samband med tuberkulos, antingen obehandlade eller okontrollerade med lämplig behandling

Varningar och försiktighetsmått

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Fucicort® Lipid -kräm.

Kontakta läkare om du upplever dimsyn eller andra synrubbingar.

Var särskilt försiktig med Fucicort® Lipid -kräm:

- om du har perianal eller genital klåda, bristningar i ytliga blodkärl
- vid behandling av större hudområden och vid behandling av ansikte eller hudveck
- vid behandling av barn.
- Undvik kontakt med ögonen vid användning av hud nära ögonen.
- Undvik att krämen kommer i kontakt med öppna sår och slemhinnor.
- Undvik stora mängder kräm, användning under ocklusion och långtidsbehandling.
- Eftersom läkemedlet innehåller betametasonvalerat, långvarig behandling med Fucicort® Lipid -kräm kan orsaka förtunning av hud.

Andra läkemedel och Fucicort® Lipid -kräm

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar detta läkemedel.

Behandling med Fucicort® Lipid -kräm rekommenderas ej vid graviditet.

Fucicort® Lipid -kräm kan användas under amning men användning på bröstområdet rekommenderas ej.

Körförmåga och användning av maskiner

Fucicort® Lipid -kräm har ingen påverkan på körförmåga eller användning av maskiner.

Fucicort® Lipid -kräm innehåller:

- cetostearylalkohol och kaliumsorbit som kan orsaka lokal hudirritation (t.ex. kontakteksem).
- metylparahydroxibensoat och propylparahydroxibensoat som kan orsaka allergiska reaktioner (möjligen fördröjda).

3. Hur du använder Fucicort® Lipid -kräm

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Rekommenderad dos är: Fucicort® Lipid -kräm smörjes tunt in på det infekterade hudområdet 2 gånger dagligen under 2 veckor.

Om du upplever att effekten av Fucicort® Lipid -kräm är för stark eller för svag vänd dig till din läkare eller farmaceut.

Om du har använt för stor mängd av Fucicort® Lipid -kräm

Inga data beträffande eventuella symptom vid överdosering av topikal fusidinsyra finns tillgängliga. För stor mängd lokala kortikosteroider under lång behandlingstid kan förorsaka nedsatt binjurebarksfunktion, som vanligtvis är övergående.

Om du har glömt att använda Fucicort® Lipid -kräm

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Om du slutar att använda Fucicort® Lipid -kräm

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

Vanligast förekommande biverkning är klåda.

Mindre vanliga (förekommer hos färre än 1 av 100 användare):

- olika typer av reaktioner vid applikationsstället inklusive
 - sveda i huden,
 - smärta och irritation på applikationsstället

- överkänslighet,
- allergisk kontaktdermatit och
- klåda har rapporterats.

Sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 1000 användare):

- hudutslag,
- hudrodnad,
- nässelutslag,
- svullnad och
- vattenblåsor.

Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data):

- dimsyn.

Långtidsbehandling med lokala kortikosteroider kan orsaka förtunning av hud (atrofi), utvidgning av hudens ytliga blodkärl (telangiectasi), strimmig, lätt skrynklig rodnande hud (striae), hudens rodnad (erythema), kontaktdermatit, akneliknande utslag, blåmärken, rosenfinnar, ökad behåring, överdriven svettning och minskning av pigment i huden. Förhöjt tryck inuti ögat och glaukom har rapporterats i samband med behandling av ögonregionen. Systemiska biverkningar kan förekomma speciellt vid användning av skyddande förband (okklusion) och/eller vid behandling av stora områden.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

webbplats: www.fimea.fi

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet FIMEA
Biverkningsregistret
PB 55
FI-00034 FIMEA

5. Hur Fucicort® Lipid -kräm ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Förvaring, se förpackningen.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad. Använd öppnad tub inom 3 månader.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

- De aktiva substanserna är: fusidinsyra 20 mg/g och betametason (som valerat) 1 mg/g.
- Övriga innehållsämnen, se förpackningen.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Vit kräm

Aluminiumtub 30 g

Innehavare av godkännande för försäljning

Orifarm Oy
PB 251
01511 Vanda, Finland
e-post: info@orifarm.com

Tillverkare

se förpackningen

Ompackare

Orifarm Supply s.r.o.
Palouky 1366
253 01 Hostivice, Tjeckien

Vid ytterligare frågor kan du kontakta Orifarm Oy.

Denna bipacksedel ändrades senast 1.7.2021.