

**Pakkausseloste: Tie toa potilaalle**

**Perxine 50 mg/g emulsiovoide (30 g)**  
permetriini (25:75)

**Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.**

Käytä tästä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan tai kuten lääkäri tai apteekkienkilökunta tai sairaanhoitaja onneuvonut.

- Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
- Kysy tarvittaessa apteekista lisätietoja ja neuvoja.
- Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkienkilökunnalle tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.
- Käännny lääkärin puoleen, ellei olosi parane tai se huononee.

**Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:**

1. Mitä Perxine on ja mihin sitä käytetään
2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Perxine-valmistetta
3. Miten Perxine-valmistetta käytetään
4. Mahdolliset haittavaikutukset
5. Perxine-valmisteen säilyttäminen
6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

**1. Mitä Perxine on ja mihin sitä käytetään**

Perxine-valmisten vaikuttava aine on permetriini.

Permetriini kuuluu lääkeryhmään nimeltä pyretroidit, jotka ovat loislääkkeitä.

Perxine-valmistetta käytetään hoitamaan syyhyä aikuisilla, nuorilla ja vähintään 2 kuukauden ikäisillä lapsilla.

Käännny lääkärin puoleen, ellei olosi parane tai se huononee.

Permetriini, jota Perxine sisältää, voidaan joskus käyttää myös muiden kuin tässä pakkausselosteessa mainittujen sairauksien hoitoon. Kysy neuvoa lääkäristä, apteekkienkilökunnalta tai muulta terveydenhuollon ammattilaiselta tarvittaessa ja noudata aina heiltä saamiasi ohjeita.

**2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Perxine-valmistetta**

**Älä käytä Perxine-valmistetta**

- Jos olet allerginen permetriinille, muille pyretriineille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6).

**Varoitukset ja varotoimet**

Keskustele lääkärin tai apteekkienkilökunnan kanssa ennen kuin otat Perxine-valmistetta.

- Jos hoidat pikkulapsia – katso jäljempänä kohta ”23 kk ikäiset ja nuoremmat lapset”.
- Jos sinulla tiedetään olevan allergia krysanteemeille tai muille Compositae-heimon kasveille – sinun tulee puhua lääkärin kanssa ennen kuin käytät Perxine-valmistetta.

**Varoitus**

Vain iholle! Älä niele tästä lääkettä.

Emulsiovoide voi ärsyttää silmän sidekalvoa. Vältä sen joutumista silmiin tai limakalvoille (nenän tai kurkun sisäpuoli, sukulimet) tai avohaavoihin. Jos sitä joutuu kyseiselle alueelle, huuhtele se heti vedellä.

Permetriiniä käyttävien hoitajien on suositeltavaa käyttää käsineitä.

Perxine on haitallinen kaikentyyppisille hyönteisille, kissoille ja myös vesieläimille, esim. kalolle. Älä anna näiden eläinten koskettaa Perxine-valmistetta. Ole tarkkana, jotta Perxine-valmistetta ei pääse akvaarioihin tai terraarioihin.

Perxine-valmiste voi pahentaa astma- tai ihottumaoireita.

### **23 kk ikäiset ja nuoremmat lapset**

Perxine:a ei saa käyttää vastasyntyneillä ja iältään alle 2-kuukautisilla lapsilla, paitsi jos lääkäri niin määrää. Käytöstä vauvoilla ja pienillä lapsilla ei ole riittävästi kokemusta. 23 kk ikäisten ja sitä nuorempien lasten hoito tulee antaa ainoastaan tarkassa lääketieteellisessä valvonnassa.

### **Muut lääkevalmisteet ja Perxine**

Kerro lääkäriille tai apteekkikenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät, olet äskettäin käytännyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä.

### **Raskaus ja imetyks**

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäristä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Kohtalainen määrä tietoja permetriinin käytöstä raskaana oleville naisille ei viittanut haitallisiiin vaiktuksiin. Joka tapauksessa varotoimenpiteenä Perxine-valmistetta ei pidä raskauden aikana käyttää ellei lääkäri niin määrää.

Permetriini, Perxine-valmisten vaikuttava aine, voi erittyä ihmisen rintamaitoon. Turvallisuussyyistä sinun ei pidä imettää viiteen vuorokauteen Perxine-valmisten käytön jälkeen.

### **Perxine sisältää parafiinea**

Nämä emulsiovoiteen apuaineet voivat heikentää samaan aikaan käytettävien lateksituotteiden (esim. kondomit, pessaarit) tehoa ja näin ollen niiden luotettavuutta.

### **Perxine sisältää setostearyylialkoholia ja sorbiinihappoa**

Setostearyylialkoholi ja sorbiinihappo voivat aiheuttaa paikallisia iholeaktioita (esim. kosketusihottumaa).

## **3. Miten Perxine-valmistetta käytetään**

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan tai kuten lääkäri on määrännyt tai apteekkikenkilökunta tai sairaanhoitaja on neuvonut. Tarkista ohjeet lääkäristä, apteekista tai sairaanhoitajalta, jos olet epävarma.

Levitä huolellisesti ohut kerros emulsiovoidetta iholle (katso kohta ”Miten ja milloin sinun pitäisi käyttää Perxine-valmistetta?”).

#### *Aikuiset ja yli 12-vuotiaat nuoret*

Levitä enintään 30 g emulsiovoidetta (tämä vastaa yhtä 30 g:n putkea)

#### *6–12-vuotiaat lapset*

Levitä enintään 15 g emulsiovoidetta (tämä vastaa puolta 30 g:n putkesta)

#### *2 kuukauden – 5 vuoden ikäiset lapset*

Levitä enintään 7,5 g emulsiovoidetta (tämä vastaa neljännestä 30 g:n putkesta)

*Vastasyntyneet ja alle 2 kuukauden ikäiset vauvat*

Tässä ikäryhmässä tietoja on vain vähän eikä mitään annosta voida suositella (katso myös kohta 2 otsikon ”Varoitukset ja varotoimet” alla).

Edellä mainitut tiedot ovat vain ohjeellisia. Annosta voidaan säätää kunkin potilaan tarpeiden mukaisesti ja kehon yksilöllisen pinta-alan perusteella. Esimerkiksi jotkut aikuiset tarvitsevat suuremman määärän emulsiovoidetta. Mikäli hoidetaan kasvoja, korvia tai päänahkaa, voidaan käyttää suurempaa annosta.

Miten ja milloin sinun pitäisi käyttää Perxine-valmistetta?

Perxine on tarkoitettu käytettäväksi vain iholle.

Varo, ettei emulsiovoidetta joudu silmiin tai limakalvoille (nenän tai kurkun sisälle, sukuelimien alueella) tai avohaavoihin. Epähuomiossa tapahtuneen kosketuksen tapauksessa huuhdo perusteellisesti vedellä.

Aikuisten on levitettävä emulsiovoidetta koko keholle, mukaan lukien kaula, kämmenet ja jalkapohjat. Pää ja kasvot voidaan jättää ilman hoitoa, paitsi jos tällä alueella on syyhykohtia. Emulsiovoidetta levitettäessä on hoidettava erityisen tarkasti sormien ja varpaiden väliset kohdat (myös sormen- ja varpaankynsien alapuoli), ranteet, kyynärpääät, kainalokuopat, ulkoiset sukuelimet ja pakarat.

*Lapset*

Lasten on levitettävä emulsiovoidetta tasaisesti koko keholle, mukaan lukien kämmenet, jalkapohjat, kaula, kasvot, korvat ja päänahka. Ihokohdat suun ympäällä (koska emulsiovoide voidaan nuolla pois) ja silmät on jätettävä hoitamatta.

Estää lastasi nuolemasta emulsiovoidetta käsistä. Lasten on tarvittaessa käytettävä käsineitä. Vauvoilla ja pikkulapsilla ei ole riittävästi käyttökokemusta. Enintään 23 kuukauden ikäisten lasten hoito on annettava vain lääkärin tarkan valvonnan alaisena.

*Iäkkääät*

Läkkäiden potilaiden (yli 65-vuotiaat) on käytettävä emulsiovoidetta samalla tavalla kuin aikuisten, mutta lisäksi kasvot, korvat ja päänahka on myös hoidettava. On varottava levittämästä emulsiovoidetta silmiä ympäröiville ihoalueille.

Kuinka pitkään Perxine-valmistetta on käytettävä?

Yksi Perxine-valmisteen käyttökerta on yleensä riittävä.

Jätä emulsiovoide iholle 8–14 tunnaksi, esimerkiksi yön yli. Vältä kylpemistä, suihkussa käymistä tai peseytymistä tänä aikana, koska tämä voisi vaarantaa hoidon onnistumisen. Jos sinun on poikkeuksellisesti pestävä kädet tänä aikana, levitä sitten emulsiovoidetta uudelleen käsiin ja ranteen alueelle. Sama ohje on voimassa, jos sinun on pestävä muita hoidettuja ihoalueita (pakarat, ulkoiset sukuelimet).

8–14 tunnin jälkeen käy suihkussa tai pese iho saippualla ja vedellä.

Edellyttää, että näitä käyttöohjeita noudatetaan, yksi käyttökerta riittää yleensä onnistuneeseen hoitoon. Kuitenkin tapauksissa, joissa jatkuva tai uusiutuvaa tartuntaa ei voida sulkea pois, on harkittava hoidon toistamista kerran 7–14 päivän kuluttua ensimmäisestä levityksestä.

Mitä muuta on otettava huomioon?

Jokaisen kanssasi kosketuksissa olevan henkilön, erityisesti perheenjäsenten ja kumppaneiden, on käytävä lääkärissä mahdollisimman pian. Lääkäri päättää, onko nämäkin henkilöt hoidettava.

Jos tartunnan saaneen kanssa kontaktissa olleita henkilöitä ei myös hoideta nopeasti, on vaaranala, että he voivat antaa sinulle uuden syyhypunkkitartunnan.

Sinun on myös

- pidettävä sormenkynnet lyhyinä ja puhdistettava ne huolellisesti
- vaihdettava vaatteet, petivaatteet ja pyyhkeet joka päivä 4 päivän ajan ja pestävä ne vähintään 60 °C:n lämpötilassa

- säilytettävä esineitä, joita ei voi pestää, vähintään 60 °C:n lämpötilassa (esim. ulkovaatteet) joitakin päiviä suljetussa muovipussissa
- imuroida matot ja verhoillut huonekalut perusteellisesti.

Jos sinulla on se vaikutelma, että Perxine-valmisteen vaikutus on liian vahva tai liian heikko, keskustele asiasta lääkärin tai apteekkienkilökunnan kanssa.

#### **Jos käytät enemmän Perxine-valmistetta kuin sinun pitäisi**

Sinun ei tarvitse huolehtia yliannoksesta, kun ainetta käytetään ulkoisesti.

Jos emulsiovoidetta on kuitenkin nieltyn vahingossa tai tahallisesti, on käännyttävä mahdollisimman pian lääkärin puoleen. Lääkäri päättää jatkotoimista.

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 11) riskien arvioimiseksi ja lisähjeiden saamiseksi.

#### **Jos unohdat käyttää Perxine-valmistetta**

Käytä emulsiovoidetta mahdollisimman pian unohtuneen käytön korvaamiseksi.

#### **Jos lopetat Perxine-valmisten käytön**

Yleensä yksi Perxine-valmisten käyttökerta on riittävä. Jos lääkäri on kuitenkin käskenyt sinua levittämään emulsiovoidetta uudelleen, noudata hänen ohjeitaan. Muuten sairautesi ei kenties parane kokonaan.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkienkilökunnan puoleen.

#### **4. Mahdolliset haittavaikutukset**

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Jos ilmenee vakavia yliherkkyyssreaktioita, ota heti yhteyttä lääkäriin! Tässä tapauksessa et saa enää käyttää Perxine-valmistetta.

##### Yleinen: voi esiintyä korkeintaan 1 potilaalla 10:stä

Kutina, ihan punoitus tai epätavalliset tuntemukset ihotuntemus (parestesia), kuten kihelmöinti, pistely, polttelun tunne iholla, samoin kuin kuiva iho ovat yleisiä. Sellaiset oireet voivat myös ilmetä itse taudin tuloksena. Kosteusvoiteita ja öljykylpyjä suositellaan kuivan ihan jatkohoitona. Kutina ja ihottuma (syyhyyn jälkeinen ihottuma) voivat jatkua jopa neljä viikkoa hoidon päättymisen jälkeen. Tämä johtuu reaktiosta tapettuja syyhypunkkeja vastaan. Jos Perxine-valmisten käytön jälkeen sinulla on se vaikutelma, että tauti jatkuu, keskustele lääkärin kanssa ennen voiteen levittämistä uudelleen.

##### Harvinainen: voi esiintyä korkeintaan 1 potilaalla 1 000:stä

Harvinaisissa tapauksissa voi ilmetä päänsärkyä.

##### Hyvin harvinainen: voi esiintyä korkeintaan 1 potilaalla 10 000:stä

Iholeesioita (naarmuja), karvatappien tulehdusta (karvatappitulehdus) ja ihan pigmentin määrän alentumista on hyvin harvoin raportoitu Perxine-valmisten käyttöäikana. Herkät/allergiset henkilöt ovat ilmoittaneet hengitysvaikeuksia aikana, jolloin pyretriimiryhmän aineita oli käytetty.

##### Tuntematon: koska saatavissa oleva tieto ei riitä esiintyvyyden arviointiin

Iholla voi ilmetä intoleranssioireita (kosketusallergiareaktioita), jotka ilmenevät kutinana, punoituksena, rakkuloina tai nokkosihottumana (urtikaria). Nämä reaktiot voivat myös levittää hoidettavan ihoalueen ulkopuolelle. Pahoinvointia voi ilmetä. Oksentelua ei raportoitu Perxine-

valmisten käytön jälkeen, mutta sitä tiedetään esiintyneen muiden permetriiniä sisältävien lääkkeiden yhteydessä.

### **Haittavaikutuksista ilmoittaminen**

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisten turvallisuudesta.

www-sivusto: [www.fimea.fi](http://www.fimea.fi)

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

### **5. Perxine-valmisten säilyttäminen**

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tästä lääkettä putkessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän {EXP} jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Tämä lääkevalmiste ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita.

Perxine-valmiste on käytettävä 3 kuukauden sisällä putken ensimmäisestä avaamisesta.

Lääkkeitä ei pidä heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä aptekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

Koska permetriinin tiedetään olevan erittäin myrkkyinen vesielölle, sedimentin eliolle ja maaperäelölle, on tärkeää välttää akvaarioiden, terraarioiden saastumista tai valmisten joutumista kosketuksiin selkärangattomien kanssa, erityisesti hyönteisten kanssa. Tämä koskee myös iholle levitettyä valmistetta.

### **6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa**

#### **Mitä Perxine sisältää**

- Vaikuttava aine on permetriini.  
1 g emulsiovoidetta sisältää 50 mg permetriiniä (25:75).
- Muut aineet ovat: setostearyylialkoholi (tyyppi A), emulgoituva, nestemäinen parafiini, valkovaseljini, sorbiinihappo, puhdistettu vesi.

#### **Lääkevalmisten kuvaus ja pakkauskoko (-koot)**

Perxine on pehmeä, valkoinen emulsiovoide.

Perxine on saatavilla 30 g:n emulsiovoidepakkauksina.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

#### **Myyntiluvan haltija ja valmistaja**

INFECTOPHARM Arzneimittel und Consilium GmbH

Von-Humboldt-Strasse 1

64646 Heppenheim

Saksa

**Lisätietoja antaa: paikallinen edustaja**

Orifarm Generics A/S

Energivej 15

5260 Odense S

Tanska

info@orifarm.com

**Tällä lääkkeellä on myyntilupa Euroopan talousalueeseen kuuluvissa jäsenvaltioissa seuraavilla kauppanimillä:**

Tanska: Perxine

Suomi: Perxine 50 mg/g emulsiovoide

Saksa: Permethrin Infectopharm 50 mg/g Creme

Italia: InfectoScab

Alankomaat: Permetrine InfectoPharm, 50 mg/g, crème

Norja: Perxine

Portugali: InfectoScab

**Tämä pakkaus seloste on tarkistettu viimeksi 02.06.2022.**

## Bipacksedel: Information till patienten

### Perxine 50 mg/g kräm (30 g) permetrin (25:75)

#### Läs nog i genom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
- Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.
- Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.
- Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre.

#### I denna bipackse del finns information om följande:

1. Vad Perxine är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Perxine
3. Hur du använder Perxine
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Perxine ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

#### 1. Vad Perxine är och vad det används för

Den aktiva substansen i Perxine är permelin.

Permetrin tillhör en grupp läkemedel som kallas pyretroider vilka är läkemedel för behandling av parasitsjukdomar.

Perxine används för att behandla skabb (skabbkvalster) hos vuxna, ungdomar och barn som är minst 2 månader gamla.

Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre.

Permetrin som finns i Perxine kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

#### 2. Vad du behöver veta innan du använder Perxine

##### Använd inte Perxine

- om du är allergisk mot permelin, andra pyretriner eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

##### Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Perxine

- om du behandlar spädbarn – se nedan i avsnittet ”Barn upp till 23 månaders ålder”.
- om du vet att du är allergisk mot krysantemum eller andra korgblommiga växter – du ska endast använda Perxine efter att ha talat med din läkare.

##### Varning

Endast för användning på huden! Svälj inte detta läkemedel.

Krämen kan orsaka irritation i ögats bindhinna. Undvik kontakt med ögon och slemhinnor (i näsa eller svalg, området kring könsorganet) och öppna sår. Vid kontakt, skölj omedelbart det berörda området med vatten.

Vårdare som applicerar permelin tillråds att använda handskar.

Perxine är skadligt för alla typer av insekter, katter och även för vattenlevande djur t.ex. fiskar. Undvik kontakt med Perxine till dessa djur. Se till att Perxine inte hamnar i akvarier eller terrarier.

Perxine kan förvärra symptom på astma och eksem.

#### **Barn upp till 23 månaders ålder**

Använd inte Perxine hos nyfödda och spädbarn under 2 månaders ålder, såvida inte din läkare säger till dig att göra det. Det finns inte tillräcklig erfarenhet från spädbarn och småbarn. Behandling av barn upp till 23 månaders ålder ska endast ges under noggrann medicinsk övervakning.

#### **Andra läkemedel och Perxine**

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.

#### **Graviditet och amning**

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare innan du använder detta läkemedel.

En mättlig mängd data från användning av permelin hos gravida kvinnor tyder inte på några skadliga effekter. Som en försiktighetsåtgärd ska du dock undvika användning av Perxine under graviditet såvida inte din läkare har ordinerat det.

Den aktiva substansen i Perxine kan utsöndras i bröstmjölk. Av säkerhetsskäl ska du inte amma i fem dagar efter användning av Perxine.

#### **Perxine innehåller paraffin**

Hjälpmännen i krämen kan försämra effekten och därmed tillförilitligheten hos latexprodukter (t.ex. kondomer, pessar) som används samtidigt.

#### **Perxine innehåller cetostearylalkohol och sorbinsyra**

Cetostearylalkohol och sorbinsyra kan ge lokala hudreaktioner (t.ex. kontakteksem).

### **3. Hur du använder Perxine**

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Rådfråga läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du är osäker.

Applicera noga ett tunt lager kräm på huden (se ”Hur och när ska du använda Perxine?”).

#### *Vuxna och ungdomar över 12 år*

Applicera upp till 30 g kräm (motsvarande en tub à 30 g)

#### *Barn i åldern 6–12 år*

Applicera upp till 15 g kräm (motsvarande ½ tub à 30 g)

#### *Barn i åldern 2 månader – 5 år*

Applicera upp till 7,5 g kräm (motsvarande ¼ tub à 30 g)

### *Nyfödda och spädbarn under 2 månader*

Det finns endast en begränsad mängd data tillgängliga för denna åldersgrupp och inga dosrekommendationer kan ges (se även avsnitt 2 under ”Varningar och försiktighet”).

Ovanstående information är endast avsedd som vägledning. Dosen kan justeras enligt den enskilda patientens behov och den enskilda kroppsytan. Exempelvis behövs en större mängd kräm till vissa vuxna. En högre dos kan användas vid behandling av ansikte, öron eller hårbotten.

### Hur och när ska du använda Perxine?

Perxine är endast avsett för användning på huden.

Se till att krämen inte hamnar i ögonen eller kommer i kontakt med slemhinnor (i näsa eller svalg, området kring könsorganet) eller öppna sår. Vid oavsiktlig kontakt, skölj noga med vatten.

Vuxna ska applicera krämen över hela kroppen inklusive hals, handflator och fotsular. Huvudet och ansiktet kan lämnas om de inte omfattar ytor som är drabbade av skabb (skabbkvalster). När krämen appliceras ska området mellan fingrarna och tårna (även under finger- och tånaglar), handlederna, armbågarna, armhålorna, de yttre könsorganen och skinkorna behandlas särskilt noggrant.

### *Barn*

Barn ska applicera krämen jämnt över hela kroppen, inklusive handflator och fotsular, hals, ansikte, öron och hårbotten. Delar av huden runt munnen (eftersom krämen kan slickas av) och ögonen ska lämnas.

Hindra barnet från att slicka av krämen från händerna. Vid behov ska barn ha handskar på sig. Det finns inte tillräcklig erfarenhet från spädbarn och småbarn. Behandling av barn upp till 23 månader ska därför endast ges under noggrant medicinskt överinseende.

### *Äldre*

Äldre patienter (över 65 år) ska använda krämen på samma sätt som vuxna, men därutöver ska även ansikte, öron och hårbotten behandlas. Försiktighet ska iakttas för att undvika att krämen appliceras på områden runt ögonen.

### Hur länge ska du använda Perxine?

Vanligtvis är en applicering av Perxine tillräcklig.

Låt krämen sitta kvar på huden i 8 till 14 timmar, exempelvis över natten. Undvik badning eller duschning under denna period, eftersom detta kan göra att behandlingen förlorar effekt. Om du, i undantagsfall, behöver tvätta händerna inom denna period ska du applicera krämen på nytt på händer och handleder. Detsamma gäller om du har behöver tvätta andra delar av behandlad hud (skinkor, yttre könsorgan).

Efter 8 till 14 timmar ska du duscha eller tvätta huden med tvål och vatten.

Förutsatt att dessa bruksanvisningar följs räcker det i allmänhet med en enda applicering för framgångsrik behandling. Men i de fall där ett ihållande eller förnyat angrepp inte kan uteslutas, bör en upprepad behandling en gång 7–14 dagar efter den första appliceringen övervägas.

### Vad mer måste du tänka på?

Alla som kommer i kontakt med dig, särskilt familjemedlemmar och partners, ska uppsöka läkare så snart som möjligt. Läkaren avgör om dessa personer också ska behandlas.

Om smittade personer som du har kommit i kontakt med inte behandlas snarast finns en risk att de kan infektera dig med skabb på nytt.

### Du ska också

- hålla fingernaglar kortklippta och rengöra dem noga
- byta kläder, sängkläder och handdukar varje dag under 4 dagar och tvätta dem i minst 60 °C
- förvara saker som inte tål tvätt (t.ex. ytterkläder) vid minst 60 °C i några dagar i en försluten plastpåse
- dammsuga mattor och stoppade möbler noga.

Om du tycker att effekten av Perxine är för stark eller för svag, tala med läkare eller apotekspersonal.

### **Om du använt för stor mängd av Perxine**

Du behöver inte oroa dig om dosen när en substans appliceras utvärtes.

Om krämen av misstag eller avsiktligt har svalts, ska läkare konsulteras så fort som möjligt. Läkaren avgör vad nästa steg bör vara.

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 0800 147 111) för bedömning av risken samt rådgivning.

### **Om du har glömt att använda Perxine**

Använd krämen så snart du kan för att kompensera för den glömda appliceringen.

### **Om du slutar att använda Perxine**

Vanligtvis är en applicering av Perxine tillräcklig. Om läkaren har sagt åt dig att applicera krämen på nytt ska du dock följa denna ordination. I annat fall kanske sjukdomen inte läker ut helt och hållt.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

## **4. Eventuella biverkningar**

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Om allvarliga överkänslighetsreaktioner inträffar, uppsök läkare omedelbart! I detta fall ska du inte använda Perxine längre.

#### Vanliga: kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare

Kläda (pruritus), hudrodnad eller hudförmimmelser (parestesier) såsom kittlande, stickande eller brännande känsla i huden samt torr hud är vanliga. Dessa symtom kan dock även förekomma till följd av själva sjukdomen. Fuktkrämer och oljebad rekommenderas som uppföljande behandling vid torr hud. Kläda och ett slags eksem som uppstår efter skabb kan kvarstå i upp till fyra veckor efter avslutad behandling. Detta orsakas av en reaktion mot de avdödade skabbskvalstren. Om du, efter att ha använt Perxine, tycker att sjukdomen kvarstår, tala med läkare innan du applicerar det på nytt.

#### Sällsynta: kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare

I sällsynta fall kan huvudvärk förekomma.

#### Mycket sällsynta: kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare

Mycket sällsynta fall av hudsår (exkorationer), inflammation i härsäckarna (follikulit) och reducerad hudpigmentering har rapporterats vid användning av Perxine.

Känsliga/allergiska personer har rapporterat andningssvårigheter vid användning av substanser från pyretringgruppen.

#### Ingen känd frekvens: kan inte beräknas från tillgängliga data

Intoleransreaktioner kan förekomma i huden (kontaktallergireaktioner) som uppträder som kläda, rodnad, blåsor eller nässelutslag (urtikaria). Dessa reaktioner kan även sprida sig till utanför det behandlade området. Illamående kan förekomma. Kräkningar rapporterades inte efter användning av Perxine men förekommer i samband med andra läkemedel som innehåller permethrin.

### **Rapportering av biverkningar**

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

webbplats: [www.fimea.fi](http://www.fimea.fi)

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea  
Biverkningsregistret  
PB 55  
00034 FIMEA

## 5. Hur Perxine ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på tuben och ytterkartongen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Perxine ska användas inom 3 månader efter tubens första öppnande.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

Eftersom permethrin har konstaterats vara mycket giftigt för vatten-, sediment- och marklevande organismer är det viktigt att undvika förorening av akvarier och terrarier och att undvika att läkemedlet kommer i kontakt med ryggradslösa djur, särskilt insekter.

## 6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

### Inne hållsde klaration

- Den aktiva substansen är permethrin.  
1 g kräm innehåller 50 mg permethrin (25:75).
- Övriga innehållsämnen är: emulgerande cetostearylalkohol (typ A), flytande paraffin, vitt vaselin, sorbinsyra, renat vatten.

### Läke medlets utseende och förpackningsstorlekar

Perxine är en soft, vit kräm.

Perxine finns tillgängligt i förpackning med 30 g kräm.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

### Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

INFECTOPHARM Arzneimittel und Consilium GmbH

Von-Humboldt-Strasse 1

64646 Heppenheim

Tyskland

### För ytterligare upplysning om detta läkemedel, kontakta lokal företrädare för innehavaren av godkännande för försäljning:

Orifarm Generics A/S

Energivej 15

5260 Odense S

Danmark

info@orifarm.com

### Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:

Danmark: Perxine

Finland: Perxine 50 mg/g emulsiovoide

Tyskland: Permetherin Infectopharm 50 mg/g Creme

Italien: InfectoScab

Nederlanderna: Permetrine InfectoPharm, 50 mg/g, crème

pal-scab\_OTC-fi-1-2

Norge:

Portugal:

Perxine

InfectoScab

**Den na bipacks edel ändrade s senast 02.06.2022.**