

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle

Propofol-Lipuro 5 mg/ml injektio-/infuusioneste, emulsio propofoli

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

- Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
- Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
- Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

1. Mitä Propofol-Lipuro 5 mg/ml on ja mihin sitä käytetään
2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Propofol-Lipuro 5 mg/ml -valmistetta
3. Miten Propofol-Lipuro 5 mg/ml -valmistetta käytetään
4. Mahdolliset haittavaikutukset
5. Propofol-Lipuro 5 mg/ml -valmisteen säilyttäminen
6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä Propofol-Lipuro 5 mg/ml on ja mihin sitä käytetään

Propofol-Lipuro 5 mg/ml kuuluu yleisanesteettien lääkeryhmään. Yleisanesteetteja käytetään aiheuttamaan tajuttomuus (nukutus), jotta voidaan tehdä kirurgisia tai muita toimenpiteitä. Niitä voidaan käyttää myös potilaan rauhoittamiseen (potilas on uninen, mutta ei täysin unessa).

Propofolia käytetään:

- yleisanestesian aikaansaamiseen aikuisilla ja yli kuukauden ikäisillä lapsilla
- yli 16-vuotiaiden potilaiden rauhoittamiseen lyhytkestoisten diagnostisten ja kirurgisten toimenpiteiden yhteydessä joko yksinään tai yhdessä paikallisen tai laajan puudutuksen kanssa
- rauhoittavan vaikutuksen aikaansaamiseen aikuisille ja yli 1 kuukauden ikäisille lapsille diagnostisten ja kirurgisten toimenpiteiden yhteydessä.

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Propofol-Lipuro 5 mg/ml -valmistetta

Älä käytä Propofol-Lipuro 5 mg/ml -valmistetta:

- jos olet allerginen (yliherkkä) propofolille, soijalle, maapähkinälle tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6)
- yleisanestesian tai rauhoittavan vaikutuksen ylläpitoon lapsipotilailla diagnostisten ja kirurgisten toimenpiteiden yhteydessä
- rauhoittavana lääkkeenä tehohoidossa.

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin sinulle annetaan Propofol-Lipuro 5 mg/ml -valmistetta.

Varovaisuutta on noudatettava

- jos sinulla on vakava päävamma
- jos sinulla on mitokondriosairaus
- jos sinulla on jokin rasva-aineenvaihdunnan häiriö
- jos sinulla on muita terveydellisiä syitä, joiden vuoksi rasvaemulsioita on käytettävä varoen
- jos elimistösiäsi kiertävän veren määrä on liian pieni (hypovolemia)

- jos olet hyvin huonokuntoinen tai sinulla on sydämen, munuaisten tai maksan toimintaan liittyviä ongelmia
- jos sinulla on korkea kallonsisäinen paine
- jos sinulla on hengitysvaikeuksia
- jos sairastat epilepsiaa
- jos sinulle tehdään hoitotoimenpiteitä, joissa äkilliset liikkeet ovat erityisen haitallisia.

Kerro lääkärille, jos sinulla on jokin yllä mainituista sairauksista tai tiloista.

Jos saat samanaikaisesti muita rasva-aineita tiputuksella laskimoon, lääkäri ottaa huomioon rasvan päivittäisen kokonaissaantisi.

Anestesiaan tai tehohoitoon koulutuksen saanut lääkäri antaa sinulle propofolin. Sinua tarkkaillaan koko ajan nukutuksen (anestesian) ja heräämisvaiheen aikana.

Jos sinulle kehittyy nk. ”propofoli-infuusio-oireyhtymän” merkkejä (ks. oireiden yksityiskohtainen luettelo kohdasta 4. Mahdolliset haittavaikutukset, ”Lääkäri on heti kutsuttava paikalle, jos esiintyy seuraavia oireita”), lääkäri lopettaa propofolihoiton välittömästi.

Ks. myös kohdasta ”Ajaminen ja koneiden käyttö” varotoimenpiteet, joihin on ryhdyttävä propofolin käytön jälkeen.

Lapset ja nuoret

Propofol-Lipuro 5 mg/ml -valmistetta ei suositella vastasyntyneille vauvoille.

Muut lääkevalmisteet ja Propofol-Lipuro 5 mg/ml

Kerro lääkärille tai sairaanhoitajalle, jos parhaillaan käytät, olet äskettäin käyttänyt tai saatat joutua käyttämään muita lääkkeitä.

Propofolia on tehokkaasti käytetty eri johtopuudutusmenetelmien kanssa, jotka saavat aikaan tunnottomuutta vain osassa kehoasi (epiduraali- ja selkäydinpuudutus).

Lisäksi turvallinen käyttö on osoitettu seuraavien lääkkeiden kanssa

- ennen leikkausta saamasi lääkkeet
- muut lääkkeet kuten lihaksia rentouttavat (relaksoivat) lääkkeet
- keuhkoihin hengitettävät (inhaloitavat) nukutuslääkkeet
- kipulääkkeet.

Lääkäri saattaa kuitenkin antaa sinulle pienempiä annoksia propofolia, jos yleisanestesia tai rauhoitus on tarpeen johtopuudutusmenetelmien lisäksi.

Hoidossa noudatetaan lisäksi erityistä varovaisuutta, jos saat samanaikaisesti rifampisiinia sisältävää antibioottia, koska tällöin verenpaineesi voi laskea hyvin matalaksi.

Propofol-Lipuro 5 mg/ml alkoholin kanssa

Lääkäri neuvoo sinua alkoholin käyttöä koskevissa kysymyksissä ennen Propofol-Lipuron käyttöä ja sen jälkeen.

Raskaus ja imetys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai sairaanhoitajalta neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Propofol-Lipuro 5 mg/ml -valmistetta ei tule käyttää raskauden aikana, ellei sen käyttö ole aivan välttämätöntä. Se läpäisee istukan ja saattaa lamauttaa vastasyntyneen elintärkeät toiminnot. Propofolia voidaan kuitenkin käyttää kun tehdään abortti.

Jos imetät, keskeytä imetys ja heitä pois se äidinmaito, joka erittyy ensimmäisen 24 tunnin aikana Propofol-Lipuro 5 mg/ml -valmisteen annon jälkeen. Tutkimukset imettävillä äideillä osoittavat propofolin erittyvän rintamaitoon pieninä määrinä.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Sinun on odotettava jonkin aikaa, ennen kuin ajat tai käytät koneita saatuasi Propofol-Lipuro -valmistetta.

Lääkäri kertoo sinulle

- jos sinulla tulee olla saattaja kun lähdet hoidosta
- milloin voit jälleen ajaa autoa ja käyttää koneita
- muiden rauhoittavien lääkkeiden käytöstä (esim. rauhoittavat lääkkeet, voimakkaat kipulääkkeet, alkoholi).

Propofol-Lipuro 5 mg/ml sisältää natriumia ja soijaöljyä.

Tämä lääkevalmiste sisältää alle 1 mmol natriumia (23 mg) per 20 millilitraa eli sen voidaan sanoa olevan ”natriumiton”.

Propofol-Lipuro 5 mg/ml sisältää soijaöljyä. Jos olet allerginen maapähkinälle tai soijalle, älä käytä tätä lääkevalmistetta.

3. Miten Propofol-Lipuro 5 mg/ml -valmistetta käytetään

Propofol-Lipuro 5 mg/ml -valmistetta annetaan ainoastaan nukutuslääkärin tai erikoislääkärin toimesta tehohoitoyksikössä.

Annostus

Saamasi annos riippuu iästäsi, painostasi ja fyysisestä kunnostasi. Lääkäri antaa oikean annoksen nukutuksen aikaansaamiseen tai riittävän tajunnan tason alentamiseen, samalla kun hän seuraa huolellisesti elintoimintojasi (sydämen syke, verenpaine, hengitys jne.). Lääkäri huomioi tarvittaessa myös valmisteen antoon liittyvät aikarajat.

Propofol-Lipuro 5 mg/ml annetaan yleensä injektiona nukutuksen aikaansaamiseen. Käytettäessä tajunnan tason alentamiseen, se tavallisesti annetaan hitaana ja pitkäkestoisena tiputuksena (infuusiona) sopivaa laitetta käyttäen. Kun valmiste annetaan infuusiona, se laimennetaan ensin.

Propofol-Lipuro 5 mg/ml -valmistetta annetaan vain enintään 1 tunnin ajan.

Antotapa

Saat Propofol-Lipuro 5 mg/ml -valmistetta laskimonsisäisenä injektiona tai infuusiona, ts. laskimoon asetetun neulan tai ohuen letkun kautta.

Verenkiertoasi ja hengitystäsi seurataan jatkuvasti injektion tai infuusion annon aikana.

Jos saat enemmän Propofol-Lipuro 5 mg/ml -valmistetta kuin sinun pitäisi

On erittäin epätodennäköistä, että saisit liian suuren annoksen, sillä annoksesi suuruutta seurataan hyvin tarkasti.

Jos kuitenkin vahingossa saisit yliannoksen, voi seurauksena olla sydämen toiminnan ja hengityksen heikentyminen. Tässä tapauksessa lääkäri antaa välittömästi asianmukaista hoitoa.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai sairaanhoitajan puoleen.

4. Mahdolliset hättävähäikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa hättävähäikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Lääkäri on heti kutsuttava paikalle, jos esiintyy seuraavia oireita.

Yleiset (voi esiintyä korkeintaan yhdellä potilaalla 10:stä)

- matala verenpaine, jolloin suonensisäinen nesteen anto ja propofolin antonopeuden hidastaminen saattaa toisinaan olla tarpeen
- liian alhainen sydämen syke, joka voi olla vakavaa joissakin harvoissa tapauksissa.

Harvinaiset (voi esiintyä korkeintaan yhdellä potilaalla 1 000:sta):

- epilepsian kaltaiset kouristukset.

Hyvin harvinaiset (voi esiintyä korkeintaan yhdellä potilaalla 10 000:sta):

- allergiset reaktiot, mukaan lukien kasvojen, kielen tai nielun turvotus, hengityksen vinkuminen, ihon punoitus ja verenpaineen lasku
- leikkauksen jälkeistä tajuttomuutta on raportoitu. Tilaasi seurataan sen vuoksi huolellisesti heräämisvaiheen aikana.
- nesteen kertyminen keuhkoihin (keuhkoedeema) propofolin annon jälkeen
- haimatulehdus.

Tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin):

- Yksittäistapauksissa on raportoitu vakavista hättävähäikutustapauksista, joihin on kuulunut yhdistelmä seuraavia oireita: lihaskudoksen tuhoutuminen, happamien aineiden kertyminen vereen, veren epätavallisen korkea kaliumpitoisuus, veren rasva-arvojen kohoaminen, poikkeava sydänfilmi (Brugadatyypinen EKG), maksan laajentuma, epäsäännöllinen sydämensyke, munuaisten ja sydämen vajaatoiminta. Tätä ilmiötä on kutsuttu myös ”propofoli-infuusio-oireyhtymäksi”. Jotkut raportoiduista tapauksista ovat johtaneet kuolemaan. Näitä vaikutuksia on havaittu ainoastaan tehohoitopotilailla, joille oli annettu propofolia yli 4 mg/kg/h. Ks. myös kohta 2, ”Varoitukset ja varotoimet”.

Muita hättävähäikutuksia ovat:

Hyvin yleiset (esiintyy useammalla kuin yhdellä potilaalla 10:stä):

- pistoskohdan kipu ensimmäisen injektion aikana. Kipua voidaan lievittää antamalla propofoli käsivarren suurempiin laskimoihin. Lidokaiinin (paikallispudute) ja propofolin samanaikainen antaminen auttaa myös lievittämään kipua injektio kohdassa.

Yleiset (voi esiintyä korkeintaan yhdellä potilaalla 10:stä):

- lyhyet hengityskatkokset
- päänsärky heräämisvaiheessa
- huonovointisuus tai oksentelu heräämisvaiheessa.

Melko harvinaiset (voi esiintyä korkeintaan yhdellä potilaalla 100:sta):

- verihyytymät laskimoissa tai laskimotulehdus pistoskohdassa.

Hyvin harvinaiset (voi esiintyä korkeintaan yhdellä potilaalla 10 000:sta)

- seksuaalinen estottomuus heräämisvaiheessa
- virtsan epänormaali väri propofolin pitempikestoisen annon jälkeen
- leikkauksen jälkeisiä kuumetapauksia
- kudosaaurio, kun lääkettä on vahingossa pistetty verisuonen ulkopuolelle.

Tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin):

- tahattomat liikkeet

- epänormaali hyväntuulisuus
- lääkkeiden väärinkäyttö ja lääkeaineriippuvuus
- sydämen vajaatoiminta
- pinnallinen hengitys
- pistoskohdan kipu ja/tai turvotus, kun lääkettä on vahingossa pistetty verisuonen ulkopuolelle
- lihaskudosten rappeutumaa on raportoitu hyvin harvoin tapauksissa, joissa propofolia on annettu suosituksia suurempina annoksina rauhoitukseen tehohoitoyksiköissä.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla) seuraavalle taholle. Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

5. Propofol-Lipuro 5 mg/ml -valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä ulkopakkauksessa ja etiketissä mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (Käyt. viim. tai EXP) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Säilytä alle 25 °C. Ei saa jäätyä.

Propofol-Lipuro 5 mg/ml on käytettävä välittömästi ampullin avaamisen/laimentamisen jälkeen.

Älä käytä Propofol-Lipuro 5 mg/ml -valmistetta, jos valmisteessa on näkyvissä kaksi eri kerrosta ravistamisen jälkeen.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Propofol-Lipuro 5 mg/ml sisältää

- Vaikuttava aine on propofoli.
Yksi millilitra Propofol-Lipuro 5 mg/ml -injektio-/infusionestettä sisältää 5 mg propofolia.
Yksi 20 ml:n ampulli sisältää 100 mg propofolia.
- Muut aineet ovat:
puhdistettu soijaöljy
keskipitkäketjuiset tyydyttyneet triglyseridit
munalesitiini
glyseroli
natriumoleaatti
injektionesteisiin käytettävä vesi.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko

Propofol-Lipuro on injektio-/infusioneste, emulsio.

Propofol-Lipuro on valkoinen, maitomainen öljy–vesi-emulsio.

Propofol-Lipuro toimitetaan 20 millilitran lasiampulleissa 5 ampullin pakkauksina.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

B. Braun Melsungen AG
Carl-Braun-Straße 1
34212 Melsungen, Saksa

Postiosoite:
34209 Melsungen, Saksa

Lisätietoja antaa:
B. Braun Medical Oy
Huopalahdentie 24
00350 Helsinki

Tällä lääkevalmisteella on myyntilupa Euroopan talousalueeseen kuuluvissa jäsenvaltioissa seuraavilla kauppanimillä:

Propofol-Lipuro 0.5% (5 mg/ml):	Espanja, Irlanti, Iso-Britannia, Portugali, Slovakia, Tshekki
Propofol B. Braun 0.5 %:	Italia
Propofol “B. Braun” 5 mg/ml:	Tanska
Propofol-Lipuro 5 mg/ml:	Norja, Puola, Suomi, Ranska, Ruotsi, Unkari
Propofol-Lipuro 5 mg/ml Emulsion zur Injektion oder Infusion:	Itävalta, Saksa, Luxemburg

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 18.10.2018.

Seuraavat tiedot on tarkoitettu vain hoitoalan ammattilaisille:

Valmiste on tarkoitettu kertakäyttöön ja vain yhdelle potilaalle.

Käyttämättä jäänyt emulsio on hävitettävä käytön jälkeen.

Pakkauksia on ravistettava ennen käyttöä.

Tarkempia tietoja tästä lääkevalmisteesta on valmisteyhteenvedossa.

Bipacksedel: Information till användaren

Propofol-Lipuro 5 mg/ml injektions-/infusionsvätska, emulsion propofol

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.
- Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad Propofol-Lipuro 5 mg/ml är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Propofol-Lipuro 5 mg/ml
3. Hur du använder Propofol-Lipuro 5 mg/ml
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Propofol-Lipuro 5 mg/ml ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Propofol-Lipuro 5 mg/ml är och vad det används för

Propofol-Lipuro 5 mg/ml tillhör en grupp läkemedel som kallas allmänanestetika. Allmänanestetika används för att uppnå medvetslöshet (sömn) så att kirurgiska operationer eller andra ingrepp kan utföras. De kan även användas för att lugna (sedera) dig så att du är sömning men inte fullständigt insomnad.

Propofol 5mg/ml används för att

- starta allmän anestesi hos vuxna och över 1 månad gamla barn
- sedera patienter > 16 års ålder under diagnostiska och kirurgiska ingrepp under en kort tid, ensamt eller i kombination med lokal eller regional anestesi.
- starta sedering hos vuxna och över 1 månad gamla barn under diagnostiska och kirurgiska ingrepp.

2. Vad du behöver veta innan du använder Propofol-Lipuro 5 mg/ml

Använd inte Propofol-Lipuro 5 mg/ml

- om du är allergisk (överkänslig) mot propofol, soja, jordnötter eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).
- för att underhålla allmän anestesi eller sedering hos barn vid diagnostiska och kirurgiska ingrepp
- för sedering i samband med intensivvård.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du får Propofol-Lipuro 5 mg/ml.

Särskild försiktighet måste iakttas

- om du har allvarliga skallskador
- om du har en mitokondriell sjukdom
- om du har någon störning i kroppens omsättning av fetter
- om du har några andra hälsoproblem som förutsätter stor försiktighet vid användning av fettemulsioner
- om din blodvolym är för liten (hypovolemi)
- om du är mycket svag eller har problem med hjärtat, njurarna eller levern
- om du har högt tryck i skallen
- om du har problem med andningen

- om du har epilepsi
- om du ska genomgå något ingrepp där spontana rörelser är särskilt oönskade.

Tala om för läkaren om du har någon av de ovan angivna sjukdomarna eller tillstånden.

Om du samtidigt får andra lipider via ett intravenöst dropp kommer din läkare att vara uppmärksam på ditt totala dagliga fettintag.

Propofol administreras av en läkare med utbildning i anestesi eller intensivvård. Du övervakas kontinuerligt under anestesi och uppvaknande.

Om du visar tecken på s.k. propofolinfusionssyndrom (en detaljerad lista över symtom finns i avsnitt 4. Eventuella biverkningar, "Läkare ska genast tillkallas om följande uppkommer") kommer din läkare att omedelbart avsluta doseringen av propofol.

Se även avsnittet 'Körförmåga och användning av maskiner' för försiktighetsåtgärder som ska vidtas efter användning av propofol.

Barn och ungdomar

Användning av Propofol-Lipuro 5 mg/ml rekommenderas inte hos nyfödda spädbarn.

Andra läkemedel och Propofol-Lipuro 5 mg/ml

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Propofol har effektivt använts med olika regionalbedövningstekniker som endast bedövar en del av kroppen (epidural och spinal anestesi).

Säker användning har dessutom påvisats med

- läkemedel du får före operationen
- andra läkemedel såsom muskelavslappnande medel
- anestesimedel som kan inhaleras
- smärtstillande medel.

Din läkare kan dock ge dig en lägre dos propofol om allmänbedövning eller sedering behövs som tillägg till bedövningstekniker som endast bedövar en del av kroppen.

Särskild försiktighet kommer också att iaktas om du samtidigt behandlas med ett antibiotikum som innehåller rifampicin, eftersom det kan leda till att du utvecklar mycket lågt blodtryck.

Propofol-Lipuro 5 mg/ml med alkohol

Din läkare informerar dig angående intag av alkohol före och efter användning av Propofol-Lipuro.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel

Propofol-Lipuro 5 mg/ml ska inte användas under graviditet om det inte är absolut nödvändigt. Det passerar placenta och kan hämma livsviktiga funktioner hos den nyfödda.

Propofol kan dock användas under en framkallad abort.

Om du ammar ska du avhålla dig från amning i 24 timmar efter att du fått Propofol-Lipuro 5 mg/ml. Bröstmjolk som pumpas ut under denna tid ska kasseras. Studier med ammande kvinnor har visat att små mängder propofol utsöndras i bröstmjolk.

Körförmåga och användning av maskiner

Du ska undvika att köra bil och använda maskiner under ett tag efter en injektion eller infusion med Propofol-Lipuro.

Din läkare informerar dig

- om du bör ha någon med dig när du skrivs ut
- angående när du kan köra och använda maskiner igen
- om användning av andra lugnande medel (t.ex. sömnmedel, starka smärtstillande medel, alkohol).

Propofol-Lipuro 5 mg/ml innehåller natrium och sojaolja

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per 20 ml, d.v.s. det är näst intill "natriumfritt".

Propofol-Lipuro 5 mg/ml innehåller sojaolja. Om du är allergisk mot jordnötter eller soja ska du inte använda detta läkemedel.

3. Hur du använder Propofol-Lipuro 5 mg/ml

Propofol-Lipuro 5 mg/ml ges endast av narkosläkare eller av särskilt utbildade läkare på en intensivvårdavdelning.

Dosering

Den dos som du får beror på din ålder, vikt och ditt hälsotillstånd. Läkaren ger rätt dos för att starta narkosen (= nedsövningen) eller för att nå önskad sänkning av medvetandegraden genom att omsorgsfullt iaktta dina reaktioner och dina kroppsfunktioner (puls, blodtryck, andning o.s.v.). Läkaren observerar även begränsningarna för administreringstiden, om nödvändigt.

Propofol-Lipuro 5 mg/ml ges i allmänhet som en injektion för att starta narkosen. Om läkemedlet används för sänkning av medvetandegraden, ges det i allmänhet långsamt och kontinuerligt som en infusion med hjälp av lämplig apparatur. Vid användning som infusion späds läkemedlet ut före användning.

Propofol-Lipuro 5 mg/ml ges i högst 1 timme.

Administreringsätt

Du får Propofol-Lipuro 5 mg/ml som en injektion eller infusion i en ven, d.v.s. genom en nål eller en liten slang som sticks in i någon av dina vener.

Din blodcirkulation och andning övervakas fortgående medan injektionen eller infusionen ges.

Om du fått för stor mängd av Propofol-Lipuro 5 mg/ml

Det är osannolikt att så skulle ske, eftersom den dos som du får övervakas mycket omsorgsfullt.

Om du dock av misstag skulle få en överdos, kunde detta ge dämpad hjärtfunktion och andning. I detta fall vidtar läkaren omedelbart nödvändiga åtgärder.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

Läkare ska genast tillkallas om följande uppkommer:

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer):

- lågt blodtryck som ibland kan kräva infusion av vätskor samt att propofol ges långsammare
- alltför långsamma hjärtslag, vilket i sällsynta fall kan vara allvarligt.

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 personer):

- epilepsilikhande krampanfall.

Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 personer):

- allergiska reaktioner inklusive svullnad i ansikte, tunga eller svalg, pipande andning, hudrodnad och lågt blodtryck
- fall av medvetslöshet efter operation har förekommit. Därför kommer du att övervakas omsorgsfullt under uppvakningen.
- vätskeansamling i lungorna (lungödem) efter administration av propofol
- bukspottkörtelinflammation.

Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data):

- Rapporter om enstaka fall av allvarliga biverkningar som yppat sig som en kombination av följande symptom har förekommit: nedbrytning av muskelvävnad, ansamling av sura ämnen i blodet, onormalt hög kaliumhalt i blodet, förhöjda blodfettvärden, avvikande elektrokardiogram (Brugada-liknande EKG), leverförstoring, oregelbunden puls, njursvikt samt hjärtsvikt. Detta har kallats för "propofolinfusionssyndrom". Några av de rapporterade fallen har haft dödlig utgång. Dessa biverkningar har endast observerats hos intensivvårdspatienter som fått högre propofoldoser än 4 mg per kg kroppsvikt per timme. Se även avsnitt 2, 'Varningar och försiktighet.

Andra biverkningar är:

Mycket vanliga (förekommer hos fler än 1 behandlad patient av 10):

- smärta vid injektionsstället under den första injektionen. Smärtan kan minskas genom att injicera propofol i de större venerna i underarmen. Samtidig injektion av lidokain (lokalbedövningsmedel) och propofol minskar också smärtan vid injektionsstället.

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer):

- korta andningsstopp
- huvudvärk under uppvakningen
- illamående eller kräkningar under uppvakningen.

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 personer):

- blodproppar i vener eller inflammation i vener vid injektionsstället.

Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 personer):

- förlust av kontrollen över könsdriften under uppvakningen
- onormal färg på urinen efter en längre tids administration av propofol
- fall av feber efter operation
- vävnadsskada efter oavsiktlig injektion av läkemedlet utanför en ven.

Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data):

- ofrivilliga rörelser
- onormalt gott humör
- läkemedelsmissbruk och läkemedelsberoende
- hjärtsvikt
- yttlig andning
- smärta och/eller svullnad vid injektionsstället efter oavsiktlig injektion av läkemedlet utanför en ven
- sällsynta fall av nedbrytning av muskelvävnad har rapporterats då en högre dos än den rekommenderade använts för sederings på intensivvårdsavdelningar.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

webbplats: www.fimea.fi

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea

Biverkningsregistret

PB 55

00034 Fimea

5. Hur Propofol-Lipuro 5 mg/ml ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på etiketten och på kartongen efter Utg. dat eller EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Förvaras vid högst 25° C. Får ej frysas.

Propofol-Lipuro 5 mg/ml ska användas omedelbart efter öppnande av ampullen/utspädning.

Använd inte Propofol-Lipuro 5 mg/ml, om två skilda lager kan ses sedan ampullen skakats.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

- Den aktiva substansen är propofol.
En milliliter Propofol-Lipuro 5 mg/ml innehåller 5 mg propofol.
1 ampull på 20 ml innehåller 100 mg propofol.
- Övriga innehållsämnen är:
Sojaolja, raffinerad,
Triglycerider, medellångkedjiga,
Ägglecitin,
Glycerol,
Natriumoleat,
Vatten för injektionsvätskor.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Propofol-Lipuro 5 mg/ml är en injektions-/infusionsvätska, emulsion

Emulsionen är en mjölkvit olja-i-vatten emulsion.

Produkten saluförs i glasampuller på 20 ml som finns att få i förpackningar på 5 ampuller.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare:

B. Braun Melsungen AG
Carl-Braun-Strasse 1

34212 Melsungen, Tyskland

Postadress:

34209 Melsungen, Tyskland

Information lämnas av:

B. Braun Medical Oy

Hoplaksvägen 24

00350 Helsingfors

Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:

Propofol-Lipuro 0,5 % (5 mg/ml): Irland, Slovakien, Spanien, Storbritannien, Portugal, Tjeckien

Propofol B. Braun 0,5 %: Italien

Propofol "B.Braun" 5 mg/ml: Danmark

Propofol-Lipuro 5 mg/ml: Finland, Frankrike, Norge, Polen, Sverige, Ungern

Propofol-Lipuro 5 mg/ml Emulsion
zur Injektion oder Infusion: Österrike, Tyskland, Luxemburg

Denna bipacksedel ändrades senast 18.10.2018.

Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

Produkten är endast avsedd för engångsbruk till en patient.

Oanvänd emulsion måste kasseras vid avslutad administrering.

Förpackningarna måste skakas före användning.

För fullständig information om detta läkemedel, se produktresumén.