

Käyttöohjeet



Syövyttävä

Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen käyttöä.

Säästä käyttöohje, jotta voit tarvittaessa lukea sen uudelleen.

Vain ulkoiseen käyttöön.

Ole varovainen avatessasi korkkia, älä käytä voimaa äläkä vedä. Poista korkki hitaasti ja käsittele varovasti tahattoman roiskumisen välttämiseksi.

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

SyylEnd®

PEN C

SISÄLTÖ:

SyylEnd PEN C, 3 ml.

AINESOSAT:

Muurahaishappo (75 paino%), vesi, glyseroli, väriaine.

KUVAUS:

SyylEnd PEN C on syylien poistoon tarkoitettu liuos kynänostelijassa, joka sisältää 3 ml liuosta.

KÄYTTÖAIHEET:

SyylEnd PEN C on tehokas liuos käsien, jalkojen, kyynäpäiden ja polvien syylien käsittelyyn sekä lapsille että aikuisille.



OMINAISUUDET:

SyylEnd PEN C -liuoksen ainutlaatuinen koostumus auttaa kehoa kuivattamaan ja hylkimään syylä. Liuos kuivattaa syylän. Voit heti käsittelyn jälkeen esim. pukea sukat jalkaan tai käydä kylvyssä. SyylEnd PEN C ei oikein käytettynä jätä arpia tai aiheuta tulehdusta. Sisältö riittää noin 30 hoitokertaan.

VASTA-AIHEET:

- Älä käytä kasvojen tai sukuelinten syyliin, ontelosityyliin (molluska), syntymämerkkeihin, liikavarpaisiin, ihokovettumiin tai muihin ihomuutoksiin. Jos diagnoosi on epävarma, ota yhteys lääkäriisi.
- Älä peitä syylää laastarilla SyylEnd PEN C -käsittelyn jälkeen. Laastarin käyttö käsittelyn jälkeen voi aiheuttaa ihovaurioita.
- Älä suojaa syylää ympäröivää normaalia ihoa öljyllä tai voiteella juuri ennen käsittelyä, sen aikana tai sen jälkeen.



- Älä käytä, jos käsittely syylä alkaa aristaa, vuotaa verta tai iho ärtyy. Pidä taukoa hoidossa, kunnes iho on palautunut.
- Älä käytä SyylEnd PEN C -kynää samanaikaisesti muiden syylänpoistomenetelmien kanssa.
- Älä käytä SyylEnd PEN C -kynää, jos olet allerginen jollekin sen ainesosista.
- Älä käytä SyylEnd PEN C -kynää, jos kynä ja/tai kärki on näkyvästi vahingoittunut.

VAROITUKSET JA VAROTOIMET:

 SyylEnd PEN C on **syövyttävää** sekä ärsyttävän voimakkaan hajuista. Ei saa hengittää. **Vain ulkoiseen käyttöön.** **Ei lasten ulottuville eikä näkyville.**

Ei saa käyttää liikaa! Liika liuos tai virheellinen käyttö voivat aiheuttaa kipua ja ihovaurioita.

- Jos käytät liuosta liikaa tai vahingossa levität sitä ympäröivälle iholle, huuhtelee alue heti runsaalla kylmällä vedellä ihovaurioiden vähentämiseksi.
- Jos liuosta joutuu **silmiin**, huuhtelee heti useaan kertaan kylmällä vedellä vähintään 15 minuutin ajan ja hakeudu lääkäriin hoitoon. Jos sinulla on piilolinssit, poista ne välittömästi ja huuhtelee silmäsi kuvatulla tavalla. Ole erityisen varovainen hoitaessasi syylää herkällä ja ohuella ihoalueella, esim. pienillä lapsilla tai kämmenselässä. Älä vahingoita kynää (älä avaa, leikkaa tai lävistä sitä).

ANNOSTELU JA KÄYTTÖ:

Lue alla olevat käyttöohjeet huolellisesti ennen käyttöä, koska liuos on syövyttävää.


Ole varovainen, että kosket vain syylään ja **vältä koskemasta ympäröivään ihoon**; jos kosket ympäröivään ihoon tai liuos kirvelee, huuhtelee välittömästi kylmällä vedellä kivun lievittämiseksi.



Jotta liuosta ei joudu ympäröivälle ihoalueelle, ole varovainen ja pidä kynästä kiinni tukevalla otteella liuosta annostellessasi. Roiskeet voivat aiheuttaa ihovaurioita tai vahingoittaa maalattuja pintoja, tekstiilejä jne. Sulje korkki kunnolla käytön jälkeen. SyylEnd PEN C -kynää voi käyttää useampi henkilö. Ennen kuin SyylEnd PEN C -kynää käytetään toiselle henkilölle, kynän korkki suljetaan ja kynää pidetään pystyasennossa korkki alaspäin vähintään 5 minuutin ajan, jotta kynän kärki pysyy kosketuksissa liuokseen. Näin välttyään tartuttamasta syylä henkilöstä toiseen. SyylEnd PEN C -liuosta tarvitaan vain hyvin pieni määrä vaikutuksen aikaan saamiseksi.

Kynästä tulee hyvin pieni määrä värillistä liuosta, kunärkeä painetaan syylää vasten. Kynä voi vaikuttaa kuivalta. Kynä on suunniteltu siten, että siitä tulee ulos vain tarvittava määrä liuosta syylän hoitoon. Kynän toiminnan voi tarkastaa painamalla kynänärkeä paperia vasten, jolloin paperille jää pieni märkä ja/tai värillinen jälki. Voit myös havaita tuotteen pistävän hajun korkkia avatessa.

Kuva 1



Avaa korkki kiertämällä sitä, kunnes kynässä oleva sininen värikaistale on linjassa korkissa olevan loven kanssa. Kun korkki on oikeassa asennossa, se voidaan turvallisesti vetää pois.

Ole varovainen korkkia avatessasi, älä käytä voimaa äläkä vedä. Liuosta saattaa tulla ulos kynästä.


Suljettaessa paina korkki tiukasti kiinni ja kierrä lukitusasentoon. Ks. kuva 1 yllä.



Käyttö:

- Paina kynänärkeä kevyesti syylää vasten ja **peitä syylän pinta** liuoksella
- Annostele ainoastaan syylälle ja peitä koko syylä (kuva A)
- Hoidettaessa isoja syylä kallista kynää (kuva B)
- Käsittele syylää kynällä **kolmen sekunnin ajan**
- Älä annostele terveelle iholle

Kuva A



Kuva B



Saavuttaaksesi onnistuneen lopputuloksen, käsittele syylää **säännöllisesti** kerran viikossa, kunnes se on kokonaan hävinnyt, muuten prosessi pysähtyy. Jos hoito on epäsäännöllistä, koko prosessi kestää kauemmin.

ERITYISTAPAUKSET:

- Isoja, vanhoja syylä sekä jalkapohjassa ja paksulla ihoalueella olevia syylä** voidaan käsitellä **useammin** kuin kerran viikossa.
- Hoidettaessa syylä **ohuilla ihoalueilla (esim. kämmenselässä, jalkapöydässä tai sormissa)** käsittely joka toinen tai kolmas viikko saattaa riittää.
- Syylä, jotka sijaitsevat **kämmenselässä, jalkapöydässä, polvien sisäsiivuilla tai kyynäpäiden ulkosivuilla**, joissa iho on herkempää, on hoidettava varovasti välttämättä koskettamasta ympäröivää ihoa.
- Jos hoidetaan **useampia syylä**, käsittele ensin vain paria syylää kahden viikon ajan nähdäksesi, kuinka iho reagoi. Jos iho on tämän jälkeen ennallaan, jatka jäljellä olevien syylien hoitoa. Aloita isoimmista syylästä.

LISÄTIETOJA JA SUOSITUKSET HOIDON AIKANA:

- Pidä syylä pehmeänä** käsittelykertojen välillä voitelemalla sitä tavallisella ihovoiteella tai öljyllä. Tällöin myös syylän jäänteet saadaan helpommin poistettua.
- Väri on tarkoitettu ainoastaan opastamaan sinua SyylEnd PEN C -hoidon aikana ja varmistamaan, että liuosta on syyllällä. Käsittelykertojen välillä värin voimakkuus syyllällä voi muuttua: älä muuta yllämainittua käsittelytapaa, mukaan lukien tiheyttä.
- ÄLÄ KÄYTÄ LIIKAA** – käsittele vain kolmen sekunnin ajan ja ainoastaan syylää.
- Jos tunnet polttavaa tunnetta tai huomaat ärsytystä (iho muuttuu punaiseksi, sitä pistelee tai kirvelee), lopeta hoito. Älä aloita hoitoa uudelleen ennen kuin ärsytys on loppunut.
- Jos tuote ei tehoa syylään usean hoitokerran jälkeen, ota yhteyttä lääkäriisi.
- Jos syylä ei parane kerran viikossa tapahtuvalla hoidolla, hoida kaksi kertaa viikossa tai joka toinen päivä, jos iho ei ole ärtynyt.
- Hoidon alussa syylä voi ensin vaalentua ja kasvaa ulospäin ennen kuin se alkaa kuivua kokoon. Kun syylä laajenee, ympäröivästä ihosta voi tulla arka. Pidä huolta, että iho ei peitä syylää, ks. alla.
- Jos syylää aristaa tai tykyttää, voi se johtua siitä, että liuosta on annosteltu liikaa tai syylä ei pääse sitä **peittävän ihon** läpi. Jos iho peittää syylää, on se avattava pinseteillä, jotta syylä tulee esiin. Hoidon alussa syylä voi ensin vaalentua ja kasvaa ulospäin ennen kuin se alkaa kuivua kokoon. Kun syylä laajenee, ympäröivästä ihosta voi tulla arka. Pidä huolta, että iho ei peitä syylää, ks. alla.
- Jos syylää aristaa tai tykyttää, voi se johtua siitä, että liuosta on annosteltu liikaa tai syylä ei pääse sitä **peittävän ihon** läpi. Jos iho peittää syylää, on se avattava pinseteillä, jotta syylä tulee esiin. Hoidon alussa syylä voi ensin vaalentua ja kasvaa ulospäin ennen kuin se alkaa kuivua kokoon. Kun syylä laajenee, ympäröivästä ihosta voi tulla arka. Pidä huolta, että iho ei peitä syylää, ks. alla.
- Jos syylää aristaa tai tykyttää, voi se johtua siitä, että liuosta on annosteltu liikaa tai syylä ei pääse sitä **peittävän ihon** läpi. Jos iho peittää syylää, on se avattava pinseteillä, jotta syylä tulee esiin. Hoidon alussa syylä voi ensin vaalentua ja kasvaa ulospäin ennen kuin se alkaa kuivua kokoon. Kun syylä laajenee, ympäröivästä ihosta voi tulla arka. Pidä huolta, että iho ei peitä syylää, ks. alla.
- Jos syylää aristaa tai tykyttää, voi se johtua siitä, että liuosta on annosteltu liikaa tai syylä ei pääse sitä **peittävän ihon** läpi. Jos iho peittää syylää, on se avattava pinseteillä, jotta syylä tulee esiin. Hoidon alussa syylä voi ensin vaalentua ja kasvaa ulospäin ennen kuin se alkaa kuivua kokoon. Kun syylä laajenee, ympäröivästä ihosta voi tulla arka. Pidä huolta, että iho ei peitä syylää, ks. alla.
- Jos syylää aristaa tai tykyttää, voi se johtua siitä, että liuosta on annosteltu liikaa tai syylä ei pääse sitä **peittävän ihon** läpi. Jos iho peittää syylää, on se avattava pinseteillä, jotta syylä tulee esiin. Hoidon alussa syylä voi ensin vaalentua ja kasvaa ulospäin ennen kuin se alkaa kuivua kokoon. Kun syylä laajenee, ympäröivästä ihosta voi tulla arka. Pidä huolta, että iho ei peitä syylää, ks. alla.
- Jos syylää aristaa tai tykyttää, voi se johtua siitä, että liuosta on annosteltu liikaa tai syylä ei pääse sitä **peittävän ihon** läpi. Jos iho peittää syylää, on se avattava pinseteillä, jotta syylä tulee esiin. Hoidon alussa syylä voi ensin vaalentua ja kasvaa ulospäin ennen kuin se alkaa kuivua kokoon. Kun syylä laajenee, ympäröivästä ihosta voi tulla arka. Pidä huolta, että iho ei peitä syylää, ks. alla.
- Jos syylää aristaa tai tykyttää, voi se johtua siitä, että liuosta on annosteltu liikaa tai syylä ei pääse sitä **peittävän ihon** läpi. Jos iho peittää syylää, on se avattava pinseteillä, jotta syylä tulee esiin. Hoidon alussa syylä voi ensin vaalentua ja kasvaa ulospäin ennen kuin se alkaa kuivua kokoon. Kun syylä laajenee, ympäröivästä ihosta voi tulla arka. Pidä huolta, että iho ei peitä syylää, ks. alla.
- Jos syylää aristaa tai tykyttää, voi se johtua siitä, että liuosta on annosteltu liikaa tai syylä ei pääse sitä **peittävän ihon** läpi. Jos iho peittää syylää, on se avattava pinseteillä, jotta syylä tulee esiin. Hoidon alussa syylä voi ensin vaalentua ja kasvaa ulospäin ennen kuin se alkaa kuivua kokoon. Kun syylä laajenee, ympäröivästä ihosta voi tulla arka. Pidä huolta, että iho ei peitä syylää, ks. alla.
- Jos syylää aristaa tai tykyttää, voi se johtua siitä, että liuosta on annosteltu liikaa tai syylä ei pääse sitä **peittävän ihon** läpi. Jos iho peittää syylää, on se avattava pinseteillä, jotta syylä tulee esiin. Hoidon alussa syylä voi ensin vaalentua ja kasvaa ulospäin ennen kuin se alkaa kuivua kokoon. Kun syylä laajenee, ympäröivästä ihosta voi tulla arka. Pidä huolta, että iho ei peitä syylää, ks. alla.
- Jos syylää aristaa tai tykyttää, voi se johtua siitä, että liuosta on annosteltu liikaa tai syylä ei pääse sitä **peittävän ihon** läpi. Jos iho peittää syylää, on se avattava pinseteillä, jotta syylä tulee esiin. Hoidon alussa syylä voi ensin vaalentua ja kasvaa ulospäin ennen kuin se alkaa kuivua kokoon. Kun syylä laajenee, ympäröivästä ihosta voi tulla arka. Pidä huolta, että iho ei peitä syylää, ks. alla.
- Jos syylää aristaa tai tykyttää, voi se johtua siitä, että liuosta on annosteltu liikaa tai syylä ei pääse sitä **peittävän ihon** läpi. Jos iho peittää syylää, on se avattava pinseteillä, jotta syylä tulee esiin. Hoidon alussa syylä voi ensin vaalentua ja kasvaa ulospäin ennen kuin se alkaa kuivua kokoon. Kun syylä laajenee, ympäröivästä ihosta voi tulla arka. Pidä huolta, että iho ei peitä syylää, ks. alla.
- Jos syylää aristaa tai tykyttää, voi se johtua siitä, että liuosta on annosteltu liikaa tai syylä ei pääse sitä **peittävän ihon** läpi. Jos iho peittää syylää, on se avattava pinseteillä, jotta syylä tulee esiin. Hoidon alussa syylä voi ensin vaalentua ja kasvaa ulospäin ennen kuin se alkaa kuivua kokoon. Kun syylä laajenee, ympäröivästä ihosta voi tulla arka. Pidä huolta, että iho ei peitä syylää, ks. alla.
- Jos syylää aristaa tai tykyttää, voi se johtua siitä, että liuosta on annosteltu liikaa tai syylä ei pääse sitä **peittävän ihon** läpi. Jos iho peittää syylää, on se avattava pinseteillä, jotta syylä tulee esiin. Hoidon alussa syylä voi ensin vaalentua ja kasvaa ulospäin ennen kuin se alkaa kuivua kokoon. Kun syylä laajenee, ympäröivästä ihosta voi tulla arka. Pidä huolta, että iho ei peitä syylää, ks. alla.
- Jos syylää aristaa tai tykyttää, voi se johtua siitä, että liuosta on annosteltu liikaa tai syylä ei pääse sitä **peittävän ihon** läpi. Jos iho peittää syylää, on se avattava pinseteillä, jotta syylä tulee esiin. Hoidon alussa syylä voi ensin vaalentua ja kasvaa ulospäin ennen kuin se alkaa kuivua kokoon. Kun syylä laajenee, ympäröivästä ihosta voi tulla arka. Pidä huolta, että iho ei peitä syylää, ks. alla.
- Jos syylää aristaa tai tykyttää, voi se johtua siitä, että liuosta on annosteltu liikaa tai syylä ei pääse sitä **peittävän ihon** läpi. Jos iho peittää syylää, on se avattava pinseteillä, jotta syylä tulee esiin. Hoidon alussa syylä voi ensin vaalentua ja kasvaa ulospäin ennen kuin se alkaa kuivua kokoon. Kun syylä laajenee, ympäröivästä ihosta voi tulla arka. Pidä huolta, että iho ei peitä syylää, ks. alla.
- Jos syylää aristaa tai tykyttää, voi se johtua siitä, että liuosta on annosteltu liikaa tai syylä ei pääse sitä **peittävän ihon** läpi. Jos iho peittää syylää, on se avattava pinseteillä, jotta syylä tulee esiin. Hoidon alussa syylä voi ensin vaalentua ja kasvaa ulospäin ennen kuin se alkaa kuivua kokoon. Kun syylä laajenee, ympäröivästä ihosta voi tulla arka. Pidä huolta, että iho ei peitä syylää, ks. alla.
- Jos syylää aristaa tai tykyttää, voi se johtua siitä, että liuosta on annosteltu liikaa tai syylä ei pääse sitä **peittävän ihon** läpi. Jos iho peittää syylää, on se avattava pinseteillä, jotta syylä tulee esiin. Hoidon alussa syylä voi ensin vaalentua ja kasvaa ulospäin ennen kuin se alkaa kuivua kokoon. Kun syylä laajenee, ympäröivästä ihosta voi tulla arka. Pidä huolta, että iho ei peitä syylää, ks. alla.
- Jos syylää aristaa tai tykyttää, voi se johtua siitä, että liuosta on annosteltu liikaa tai syylä ei pääse sitä **peittävän ihon** läpi. Jos iho peittää syylää, on se avattava pinseteillä, jotta syylä tulee esiin. Hoidon alussa syylä voi ensin vaalentua ja kasvaa ulospäin ennen kuin se alkaa kuivua kokoon. Kun syylä laajenee, ympäröivästä ihosta voi tulla arka. Pidä huolta, että iho ei peitä syylää, ks. alla.
- Jos syylää aristaa tai tykyttää, voi se johtua siitä, että liuosta on annosteltu liikaa tai syylä ei pääse sitä **peittävän ihon** läpi. Jos iho peittää syylää, on se avattava pinseteillä, jotta syylä tulee esiin. Hoidon alussa syylä voi ensin vaalentua ja kasvaa ulospäin ennen kuin se alkaa kuivua kokoon. Kun syylä laajenee, ympäröivästä ihosta voi tulla arka. Pidä huolta, että iho ei peitä syylää, ks. alla.
- Jos syylää aristaa tai tykyttää, voi se johtua siitä, että liuosta on annosteltu liikaa tai syylä ei pääse sitä **peittävän ihon** läpi. Jos iho peittää syylää, on se avattava pinseteillä, jotta syylä tulee esiin. Hoidon alussa syylä voi ensin vaalentua ja kasvaa ulospäin ennen kuin se alkaa kuivua kokoon. Kun syylä laajenee, ympäröivästä ihosta voi tulla arka. Pidä huolta, että iho ei peitä syylää, ks. alla.
- Jos syylää aristaa tai tykyttää, voi se johtua siitä, että liuosta on annosteltu liikaa tai syylä ei pääse sitä **peittävän ihon** läpi. Jos iho peittää syylää, on se avattava pinseteillä, jotta syylä tulee esiin. Hoidon alussa syylä voi ensin vaalentua ja kasvaa ulospäin ennen kuin se alkaa kuivua kokoon. Kun syylä laajenee, ympäröivästä ihosta voi tulla arka. Pidä huolta, että iho ei peitä syylää, ks. alla.
- Jos syylää aristaa tai tykyttää, voi se johtua siitä, että liuosta on annosteltu liikaa tai syylä ei pääse sitä **peittävän ihon** läpi. Jos iho peittää syylää, on se avattava pinseteillä, jotta syylä tulee esiin. Hoidon alussa syylä voi ensin vaalentua ja kasvaa ulospäin ennen kuin se alkaa kuivua kokoon. Kun syylä laajenee, ympäröivästä ihosta voi tulla arka. Pidä huolta, että iho ei peitä syylää, ks. alla.
- Jos syylää aristaa tai tykyttää, voi se johtua siitä, että liuosta on annosteltu liikaa tai syylä ei pääse sitä **peittävän ihon** läpi. Jos iho peittää syylää, on se avattava pinseteillä, jotta syylä tulee esiin. Hoidon alussa syylä voi ensin vaalentua ja kasvaa ulospäin ennen kuin se alkaa kuivua kokoon. Kun syylä laajenee, ympäröivästä ihosta voi tulla arka. Pidä huolta, että iho ei peitä syylää, ks. alla.
- Jos syylää aristaa tai tykyttää, voi se johtua siitä, että liuosta on annosteltu liikaa tai syylä ei pääse sitä **peittävän ihon** läpi. Jos iho peittää syylää, on se avattava pinseteillä, jotta syylä tulee esiin. Hoidon alussa syylä voi ensin vaalentua ja kasvaa ulospäin ennen kuin se alkaa kuivua kokoon. Kun syylä laajenee, ympäröivästä ihosta voi tulla arka. Pidä huolta, että iho ei peitä syylää, ks. alla.
- Jos syylää aristaa tai tykyttää, voi se johtua siitä, että liuosta on annosteltu liikaa tai syylä ei pääse sitä **peittävän ihon** läpi. Jos iho peittää syylää, on se avattava pinseteillä, jotta syylä tulee esiin. Hoidon alussa syylä voi ensin vaalentua ja kasvaa ulospäin ennen kuin se alkaa kuivua kokoon. Kun syylä laajenee, ympäröivästä ihosta voi tulla arka. Pidä huolta, että iho ei peitä syylää, ks. alla.
- Jos syylää aristaa tai tykyttää, voi se johtua siitä, että liuosta on annosteltu liikaa tai syylä ei pääse sitä **peittävän ihon** läpi. Jos iho peittää syylää, on se avattava pinseteillä, jotta syylä tulee esiin. Hoidon alussa syylä voi ensin vaalentua ja kasvaa ulospäin ennen kuin se alkaa kuivua kokoon. Kun syylä laajenee, ympäröivästä ihosta voi tulla arka. Pidä huolta, että iho ei peitä syylää, ks. alla.
- Jos syylää aristaa tai tykyttää, voi se johtua siitä, että liuosta on annosteltu liikaa tai syylä ei pääse sitä **peittävän ihon** läpi. Jos iho peittää syylää, on se avattava pinseteillä, jotta syylä tulee esiin. Hoidon alussa syylä voi ensin vaalentua ja kasvaa ulospäin ennen kuin se alkaa kuivua kokoon. Kun syylä laajenee, ympäröivästä ihosta voi tulla arka. Pidä huolta, että iho ei peitä syylää, ks. alla.
- Jos syylää aristaa tai tykyttää, voi se johtua siitä, että liuosta on annosteltu liikaa tai syylä ei pääse sitä **peittävän ihon** läpi. Jos iho peittää syylää, on se avattava pinseteillä, jotta syylä tulee esiin. Hoidon alussa syylä voi ensin vaalentua ja kasvaa ulospäin ennen kuin se alkaa kuivua kokoon. Kun syylä laajenee, ympäröivästä ihosta voi tulla arka. Pidä huolta, että iho ei peitä syylää, ks. alla.
- Jos syylää aristaa tai tykyttää, voi se johtua siitä, että liuosta on annosteltu liikaa tai syylä ei pääse sitä **peittävän ihon** läpi. Jos iho peittää syylää, on se avattava pinseteillä, jotta syylä tulee esiin. Hoidon alussa syylä voi ensin vaalentua ja kasvaa ulospäin ennen kuin se alkaa kuivua kokoon. Kun syylä laajenee, ympäröivästä ihosta voi tulla arka. Pidä huolta, että iho ei peitä syylää, ks. alla.
- Jos syylää aristaa tai tykyttää, voi se johtua siitä, että liuosta on annosteltu liikaa tai syylä ei pääse sitä **peittävän ihon** läpi. Jos iho peittää syylää, on se avattava pinseteillä, jotta syylä tulee esiin. Hoidon alussa syylä voi ensin vaalentua ja kasvaa ulospäin ennen kuin se alkaa kuivua kokoon. Kun syylä laajenee, ympäröivästä ihosta voi tulla arka. Pidä huolta, että iho ei peitä syylää, ks. alla.
- Jos syylää aristaa tai tykyttää, voi se johtua siitä, että liuosta on annosteltu liikaa tai syylä ei pääse sitä **peittävän ihon** läpi. Jos iho peittää syylää, on se avattava pinseteillä, jotta syylä tulee esiin. Hoidon alussa syylä voi ensin vaalentua ja kasvaa ulospäin ennen kuin se alkaa kuivua kokoon. Kun syylä laajenee, ympäröivästä ihosta voi tulla arka. Pidä huolta, että iho ei peitä syylää, ks. alla.
- Jos syylää aristaa tai tykyttää, voi se johtua siitä, että liuosta on annosteltu liikaa tai syylä ei pääse sitä **peittävän ihon** läpi. Jos iho peittää syylää, on se avattava pinseteillä, jotta syylä tulee esiin. Hoidon alussa syylä voi ensin vaalentua ja kasvaa ulospäin ennen kuin se alkaa kuivua kokoon. Kun syylä laajenee, ympäröivästä ihosta voi tulla arka. Pidä huolta, että iho ei peitä syylää, ks. alla.
- Jos syylää aristaa tai tykyttää, voi se johtua siitä, että liuosta on annosteltu liikaa tai syylä ei pääse sitä **peittävän ihon** läpi. Jos iho peittää syylää, on se avattava pinseteillä, jotta syylä tulee esiin. Hoidon alussa syylä voi ensin vaalentua ja kasvaa ulospäin ennen kuin se alkaa kuivua kokoon. Kun syylä laajenee, ympäröivästä ihosta voi tulla arka. Pidä huolta, että iho ei peitä syylää, ks. alla.
- Jos syylää aristaa tai tykyttää, voi se johtua siitä, että liuosta on annosteltu liikaa tai syylä ei pääse sitä **peittävän ihon** läpi. Jos iho peittää syylää, on se avattava pinseteillä, jotta syylä tulee esiin. Hoidon alussa syylä voi ensin vaalentua ja kasvaa ulospäin ennen kuin se alkaa kuivua kokoon. Kun syylä laajenee, ympäröivästä ihosta voi tulla arka. Pidä huolta, että iho ei peitä syylää, ks. alla.
- Jos syylää aristaa tai tykyttää, voi se johtua siitä, että liuosta on annosteltu liikaa tai syylä ei pääse sitä **peittävän ihon** läpi. Jos iho peittää syylää, on se avattava pinseteillä, jotta syylä tulee esiin. Hoidon alussa syylä voi ensin vaalentua ja kasvaa ulospäin ennen kuin se alkaa kuivua kokoon. Kun syylä laajenee, ympäröivästä ihosta voi tulla arka. Pidä huolta, että iho ei peitä syylää, ks. alla.
- Jos syylää aristaa tai tykyttää, voi se johtua siitä, että liuosta on annosteltu liikaa tai syylä ei pääse sitä **peittävän ihon** läpi. Jos iho peittää syylää, on se avattava pinseteillä, jotta syylä tulee esiin. Hoidon alussa syylä voi ensin vaalentua ja kasvaa ulospäin ennen kuin se alkaa kuivua kokoon. Kun syylä laajenee, ympäröivästä ihosta voi tulla arka. Pidä huolta, että iho ei peitä syylää, ks. alla.
- Jos syylää aristaa tai tykyttää, voi se johtua siitä, että liuosta on annosteltu liikaa tai syylä ei pääse sitä **peittävän ihon** läpi. Jos iho peittää syylää, on se avattava pinseteillä, jotta syylä tulee esiin. Hoidon alussa syylä voi ensin vaalentua ja kasvaa ulospäin ennen kuin se alkaa kuivua kokoon. Kun syylä laajenee, ympäröivästä ihosta voi tulla arka. Pidä huolta, että iho ei peitä syylää, ks. alla.
- Jos syylää aristaa tai tykyttää, voi se johtua siitä, että liuosta on annosteltu liikaa tai syylä ei pääse sitä **peittävän ihon** läpi. Jos iho peittää syylää, on se avattava pinseteillä, jotta syylä tulee esiin. Hoidon alussa syylä voi ensin vaalentua ja kasvaa ulospäin ennen kuin se alkaa kuivua kokoon. Kun syylä laajenee, ympäröivästä ihosta voi tulla arka. Pidä huolta, että iho ei peitä syylää, ks. alla.
- Jos syylää aristaa tai tykyttää, voi se johtua siitä, että liuosta on annosteltu liikaa tai syylä ei pääse sitä **peittävän ihon** läpi. Jos iho peittää syylää, on se avattava pinseteillä, jotta syylä tulee esiin. Hoidon alussa syylä voi ensin vaalentua ja kasvaa ulospäin ennen kuin se alkaa kuivua kokoon. Kun syylä laajenee, ympäröivästä ihosta voi tulla arka. Pidä huolta, että iho ei peitä syylää, ks. alla.
- Jos syylää aristaa tai tykyttää, voi se johtua siitä, että liuosta on annosteltu liikaa tai syylä ei pääse sitä **peittävän ihon** läpi. Jos iho peittää syylää, on se avattava pinseteillä, jotta syylä tulee esiin. Hoidon alussa syylä voi ensin vaalentua ja kasvaa ulospäin ennen kuin se alkaa kuivua kokoon. Kun syylä laajenee, ympäröivästä ihosta voi tulla arka. Pidä huolta, että iho ei peitä syylää, ks. alla.
- Jos syylää aristaa tai tykyttää, voi se johtua siitä, että liuosta on annosteltu liikaa tai syylä ei pääse sitä **peittävän ihon** läpi. Jos iho peittää syylää, on se avattava pinseteillä, jotta syylä tulee esiin. Hoidon alussa syylä voi ensin vaalentua ja kasvaa ulospäin ennen kuin se alkaa kuivua kokoon. Kun syylä laajenee, ympäröivästä ihosta voi tulla arka. Pidä huolta, että iho ei peitä syylää, ks. alla.
- Jos syylää aristaa tai tykyttää, voi se johtua siitä, että liuosta on annosteltu liikaa tai syylä ei pääse sitä **peittävän ihon** läpi. Jos iho peittää syylää, on se avattava pinseteillä, jotta syylä tulee esiin. Hoidon alussa syylä voi ensin vaalentua ja kasvaa ulospäin ennen kuin se alkaa kuivua kokoon. Kun syylä laajenee, ympäröivästä ihosta voi tulla arka. Pidä huolta, että iho ei peitä syylää, ks. alla.
- Jos syylää aristaa tai tykyttää, voi se johtua siitä, että liuosta on annosteltu liikaa tai syylä ei pääse sitä **peittävän ihon** läpi. Jos iho peittää syylää, on se avattava pinseteillä, jotta syylä tulee esiin. Hoidon alussa syylä voi ensin vaalentua ja kasvaa ulospäin ennen kuin se alkaa kuivua kokoon. Kun syylä laajenee, ympäröivästä ihosta voi tulla arka. Pidä huolta, että iho ei peitä syylää, ks. alla.
- Jos syylää aristaa tai tykyttää, voi se johtua siitä, että liuosta on annosteltu liikaa tai syylä ei pääse sitä **peittävän ihon** läpi. Jos iho peittää syylää, on se avattava pinseteillä, jotta syylä tulee esiin. Hoidon alussa syylä voi ensin vaalentua ja kasvaa ulospäin ennen kuin se alkaa kuivua kokoon. Kun syylä laajenee, ympäröivästä ihosta voi tulla arka. Pidä huolta, että iho ei peitä syylää, ks. alla.
- Jos syylää aristaa tai tykyttää, voi se johtua siitä, että liuosta on annosteltu liikaa tai syylä ei pääse sitä **peittävän ihon** läpi. Jos iho peittää syylää, on se avattava pinseteillä, jotta syylä tulee esiin. Hoidon alussa syylä voi ensin vaalentua ja kasvaa ulospäin ennen kuin se alkaa kuivua kokoon. Kun syylä laajenee, ympäröivästä ihosta voi tulla arka. Pidä huolta, että iho ei peitä syylää, ks. alla.
- Jos syylää aristaa tai tykyttää, voi se johtua siitä, että liuosta on annosteltu liikaa tai syylä ei pääse sitä **peittävän ihon** läpi. Jos iho peittää syylää, on se avattava pinseteillä, jotta syylä tulee esiin. Hoidon alussa syylä voi ensin vaalentua ja kasvaa ulospäin ennen kuin se alkaa kuivua kokoon. Kun syylä laajenee, ympäröivästä ihosta voi tulla arka. Pidä huolta, että iho ei peitä syylää, ks. alla.
- Jos syylää aristaa tai tykyttää, voi se johtua siitä, että liuosta on annosteltu liikaa tai syylä ei pääse sitä **peittävän ihon** läpi. Jos iho peittää syylää, on se avattava pinseteillä, jotta syylä tulee esiin. Hoidon alussa syylä voi ensin vaalentua ja kasvaa ulospäin ennen kuin se alkaa kuivua kokoon. Kun syylä laajenee, ympäröivästä ihosta voi tulla arka. Pidä huolta, että iho ei peitä syylää, ks. alla.
- Jos syylää aristaa tai tykyttää, voi se johtua siitä, että liuosta on annosteltu liikaa tai syylä ei pääse sitä **peittävän ihon** läpi. Jos iho peittää syylää, on se avattava pinseteillä, jotta syylä tulee esiin. Hoidon alussa syylä voi ensin vaalentua ja kasvaa ulospäin ennen kuin se alkaa kuivua kokoon. Kun syylä laajenee, ympäröivästä ihosta voi tulla arka. Pidä huolta, että iho ei peitä syylää, ks. alla.
- Jos syylää aristaa tai tykyttää, voi se johtua siitä, että liuosta on annosteltu liikaa tai syylä ei pääse sitä **peittävän ihon** läpi. Jos iho peittää syylää, on se avattava pinseteillä, jotta syylä tulee esiin. Hoidon alussa syylä voi ensin vaalentua ja kasvaa ulospäin ennen kuin se alkaa kuivua kokoon. Kun syylä laajenee, ympäröivästä ihosta voi tulla arka. Pidä huolta, että iho ei peitä syylää, ks. alla.
- Jos syylää aristaa tai tykyttää, voi se johtua siitä, että liuosta on annosteltu liikaa tai syylä ei pääse sitä **peittävän ihon** läpi. Jos iho peittää syylää, on se avattava pinseteillä, jotta syylä tulee esiin. Hoidon alussa syylä voi ensin vaalentua ja kasvaa ulospäin ennen kuin se alkaa kuivua kokoon. Kun syylä laajenee, ympäröivästä ihosta voi tulla arka. Pidä huolta, että iho ei peitä syylää, ks. alla.
- Jos syylää aristaa tai tykyttää, voi se johtua siitä, että liuosta on annosteltu liikaa tai syylä ei pääse sitä **peittävän ihon** läpi. Jos iho peittää syylää, on se avattava pinseteillä, jotta syylä tulee esiin. Hoidon alussa syylä voi ensin vaalentua ja kasvaa ulospäin ennen kuin se alkaa kuivua kokoon. Kun syylä laajenee, ympäröivästä ihosta voi tulla arka. Pidä huolta, että iho ei peitä syylää, ks. alla.
- Jos syylää aristaa tai tykyttää, voi se johtua siitä, että liuosta on annosteltu liikaa tai syylä ei pääse sitä **peittävän ihon** läpi. Jos iho peittää syylää, on se avattava

Bruksanvisning



Frätande

Läs bruksanvisningen noga före användning. Spara bruksanvisningen. Du kan behöva läsa den igen. Endast för utvärtes bruk. Var försiktig när du öppnar korken, använd inte kraft eller dra. Ta bort korken långsamt och hantera det försiktigt för att undvika oavsiktligt spill. Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

SyylEnd®

PEN C

INNEHÅLL:

SyylEnd PEN C, 3 ml.

INNEHÅLLSÄMNE:

Myrsyra (75 vikt%), vatten, glycerol, färgämne.

BESKRIVNING:

SyylEnd PEN C är en lösning för borttagning av vårtor som tillhandahålls i en pennapplikator som innehåller 3 ml lösning.

INDIKATION:

SyylEnd PEN C är ett effektivt vårtborttagningsmedel för behandling av vårtor på händer, fötter, armbågar och knän på både barn och vuxna.



EGENSKAPER:

Den unika sammansättningen i SyylEnd PEN C hjälper kroppen att torka ut och stöta bort vårtor. Lösningen dehydrerar vårtan och torkar den. Du kan genast efter applicering t.ex. ta på strumpor eller bada. Vid korrekt användningen SyylEnd PEN C ger inga ärr eller infektioner. Innehållet i SyylEnd PEN C räcker till cirka 30 behandlingar.

KONTRAINDIKATIONER:

- Använd inte på ansiktsvårtor, könsvårtor, mollusker, leverfläckar, liktornar, hudförhårdnader eller andra hudförändringar. Vid osäkerhet om diagnosen kontakta din läkare.
- Täck inte vårtan med plåster efter behandling med SyylEnd PEN C. Användning av plåster efter behandling kan orsaka hudskador.
- Skydda inte den normala huden som omger vårtan med oljor eller lotioner omedelbart före, under eller efter appliceringen.



- Använd inte om behandlad vårta blir öm, blöder eller om huden blir irriterad. Gör uppehåll i behandlingen tills huden är återställd.
- Använd inte SyylEnd PEN C i kombination med andra vårtborttagningsmetoder.
- Använd inte SyylEnd PEN C om du är överkänslig mot något innehållsämne.
- Använd inte SyylEnd PEN C om pennan och/eller spetsen är synligt skadad.

VARNINGAR OCH FÖRSIKTIGHET:



SyylEnd PEN C är **frätande** med irriterande och stark lukt. Får inte inandas. **Endast för utvärtes bruk.** Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Använd inte för mycket! För mycket lösning eller felaktig användning kan ge upphov till smärta och hudskador.

- Om du använder för mycket eller av misstag får lösning på omgivande hud, skölj genast rikligt med kallt vatten för att minska hudskada.
- Om du får lösning i **ögat**, skölj genast rikligt upprepade gånger med kallt vatten i minst 15 minuter och kontakta läkare. Om du bär kontaktlinser, ta bort dem omedelbart och skölj ögonen enligt beskrivningen.

Var särskilt försiktig vid behandling på känslig och tunn hud, t.ex. på små barn och oavsida händer. Gör ingen överkan på pennan. Den ska inte öppnas, skäras eller stickas hål i.

DOSERING OCH ANVÄNDNING:

Läs instruktionen nedan noga före användning eftersom lösningen är frätande.

Var noga med att bara röra vårtan och **undvik att röra den omgivande huden**; om du vidrör den omgivande huden eller om den svider, tvätta omedelbart med kallt vatten för att lindra smärtan.




För att undvika att få lösning på den omgivande huden, var försiktig och håll pennan med ett fast grepp vid appliceringen. Spill kan orsaka hudskador eller skador på målade ytor, textilier etc. Stäng korken ordentligt efter användning.

SyylEnd PEN C kan användas av mer än en person. Innan en annan person börjar använda SyylEnd PEN C efter dig, stäng pennan, håll pennan upprätt med korken nedåt i minst 5 minuter så att spetsen på pennan förblir i kontakt med lösningen. Detta undviker kontaminering från dina vårtor till den andra personen.

Endast en liten mängd SyylEnd PEN C lösning behövs för att vara effektiv. Pennan tillför en mycket liten mängd färgad lösning då pennspetsen trycks mot vårtan. Pennan kan upplevas som torr. Pennan är utvecklad så att endast den mängd som behövs för behandling av vårtan, kommer ut. Du kan kontrollera att pennan fungerar genom att trycka pennan mot ett papper. Pennan lämnar ett litet vått och/eller färgat märke på pappret. Du kommer också att känna en frän lukt då du drar ut korken.

Bild 1



För att öppna, vrid korken tills blå färg syns i den lilla öppningen i korken. När korken är i rätt position, kan den dras ut från pennan. Var försiktig när du öppnar korken, använd inte kraft eller dra. Lösningen kan komma ut ur pennan.

För att stänga korken, tryck tillbaka den ordentligt och vrid till låst position. Se bild 1 ovan.



Användning:

- Tryck pennspetsen lätt mot vårtan och **stryk lösningen över vårtans yta**
- Applicera endast på vårtan och täck hela vårtan (bild A)
- Om vårtor är stora, vinkla pennan (bild B)
- Applicera i **tre sekunder**
- Applicera inte på frisk hud

Bild A



Bild B



För framgångsrika resultat, behandla **regelbundet** en gång i veckan tills vårtan helt har försvunnit, annars stannar processen. Om behandlingen är oregelbunden tar hela processen längre tid.

SPECIFIKA FALL:

- För större, gamla vårtor, vårtor under fotsulan och vårtor med ett tjockt hudlager** kan man prova att applicera **oftare**.
- Vid behandling av vårtor på **tunn hud (t.ex. på handrygg, fötter eller fingrar)** kan det räcka att behandla varannan eller var tredje vecka.
- Vårtor på **baksidan av händerna, på baksidan av fötterna, på insidan av knäna eller på utsidan av armbågarna**, där huden är mer känslig bör behandlas noggrant för att undvika att vidröra den omgivande huden.
- Vid behandling av **många vårtor**, börja med att behandla ett par stycken i några veckor för att se hur huden reagerar. Om huden är opåverkad kan du börja behandla återstående vårtor. Börja med de största vårtorna.

YTTERLIGARE INFORMATION OCH REKOMMENDATIONER UNDER BEHANDLINGEN:

- Håll vårtan mjuk** mellan behandlingarna genom att smörja in med vanlig hudlotion eller olja. Då kan vårtan lättare komma ut.
- Färgen är endast avsedd att vägleda dig under appliceringen av SyylEnd PEN C och för att vara säker på att lösningen levereras på vårtan. Mellan appliceringarna kan färgintensiteten på vårtan ändras: ändra inte appliceringsproceduren enligt ovan, inklusive frekvens.
- ANVÄND INTE FÖR MYCKET** – behandla endast i upp till 3 sekunder och endast på vårtan.
- Om du känner brännande känsla eller märker irriterande (huden blir röd, stickande, svidande), avbryt behandlingen. Återuppta inte behandlingen förrän irritationen har gått över.
- Om produkten inte fungerar mot vårtan efter flera behandlingar, kontakta din läkare.
- Om vårtan inte går tillbaka vid behandling en gång i veckan, behandla två gånger i veckan eller varannan dag så länge huden inte är irriterad.
- I början av behandlingen kan vårtan vitna och växa ut inledningsvis, innan den börjar torka ut. När vårtan utvidgas kan det ömma i den omgivande huden. Se till att vårtan inte täcks av hud, se nedan.
- Om vårtan känns öm, eller det dunkar i den, kan det bero på att du har använt för mycket lösning eller på att vårtan inte kan komma ut genom **huden som täcker vårtan**. Om huden ligger som ett lock över vårtan måste man göra en öppning i huden t.ex. med en pincett för att släppa ut vårtan. Om du har en **gammal eller hård vårta**, bör du innan behandling blötlägga området i varmt vatten tills huden är mjuk. Peta eller rugga upp huden på vårtan t.ex. med en pincett. Vid **tjock hud** på inåtgående fotvårtor, ta försiktigt bort hård hud. På **nagelbandsvårtor** kan det behöva göras ett litet hål i yttersta huden så att medlet kan komma in i vårtan. Fila inte på vårtorna utan rekommendation. Vårtorna kan bli ömma och det bildas ny hård yta på vårtan.
- Efter några behandlingar syns oftast **svarta prickar** i vårtan. Det är små blodkärl som försör vårtan med blod. Det är tecken på att vårtan är på väg att försvinna och behandling skall fortgå tills svarta prickarna och vårtan är helt borta. Ibland kan de svarta prickarna blöda lite då du skrapat på vårtan. Vänta några minuter med att applicera SyylEnd PEN C tills det slutat blöda, annars kan det svida. Om det svider, ha på kallt vatten för att lindra obehaget.

ANVÄNDNING PÅ BARN:

För barn bör en vuxen alltid applicera behandlingen försiktigt, eftersom lösningen är frätande.

Små barn har mjuk och tunn hud. Använd ytterst lite SyylEnd PEN C -lösning på barnvårtor. Vårtorna är oftast borta efter 2-3 behandlingar.

Barn **under 4 år** kan behandlas med SyylEnd PEN C men säkerställ alltid att det verkligen är en vårta och inte någon annan hudförändring. Råd gör med din läkare eller barnrådgivningen före behandlingen. För barn under 4 år är det extra viktigt att minska mängden av lösning. Behandla **mer sällan**, såsom varannan eller var tredje vecka.

- Tryck lätt pennspetsen på vårtan i tre sekunder endast **en gång** och stryk lösningen på vårtans yta.
- Var noga med att inte vidröra omgivande hud.
- Om barnet kommer åt att slicka på området där vårtan finns kan man tvätta det behandlade området med vatten. Lösningen har redan trängt igenom vårtan.
- Om det svider eller sticker till vid behandling, skölj vårtan med kallt vatten och **sätt inte på mer lösning**. Den har redan hunnit tränga ner i vårtan. Om barnet känner en brännande känsla eller känner irritation (huden blir röd, stickande, svidande), avbryt behandlingen. Pausa behandlingen och återuppta den inte förrän irritationen har gått över.

ANVÄNDNING PÅ DIABETIKER:



Diabetiker ska enbart använda SyylEnd PEN C på **vårtor på frisk hud** (oskadad och av sjukdom opåverkad) och med extra försiktighet. Vid besvär, råd gör alltid med din läkare, sköterska eller fotvårdsspecialist.

ANVÄNDNING UNDER GRAVIDITET OCH AMNING:



Riskerna med att använda SyylEnd PEN C på **gravida och ammande kvinnor** är inte kända.

BEHANDLINGSLÄNGD:

SyylEnd PEN C är mycket effektivt – de flesta vårtor går bort och kommer inte tillbaka. Ibland kan dock vårtor som redan finns under huden komma fram då du börjar behandla.

Vårtor kan se olika ut och det kan ta olika lång tid att ta bort dem. Vanligast är 5 till 15 behandlingar, men det kan också ta kortare eller längre tid.

Faktorer som kan påverka hur lång tid du måste behandla innan vårtorna försvinner är din ålder, vilken sorts vårta det är, ditt immunförsvar, var vårtan sitter och hur länge du haft vårtan. Nedsatt immunförsvar och mediciner med t.ex. kortison kan göra att det tar längre tid att bli av med vårtorna. Nya vårtor är oftast enklare att ta bort än gamla vårtor. Barnvårtor är oftast lättare att ta bort än vuxenvårtor. För inåtgående fotvårtor och nagelbandsvårtor som suttit många år kan det ta lång tid innan man ser en tydlig effekt av behandlingen och det tar betydligt längre tid innan vårtan är helt borta.

Sluta med SyylEnd PEN C när inga svarta prickar syns eller om vårtan har ramlat bort, skrumpnat ihop eller det är en "grop" där vårtan suttit. Huden blir slät efteråt. Om man fortsätter behandla för länge efter att vårtan är borta blir huden lätt rosa och lite vattnig. Sluta då genast att använda SyylEnd PEN C. Kontrollera efter några veckor där vårtan suttit. Om det syns liten prick kan det tyda på vårtrester. Behandla då med SyylEnd PEN C ett par gånger till.

Efter behandlingen, stäng pennan med korken och kassera den tomma produkten enligt gällande bestämmelser för avfallshantering.

EVENTUELLA BIVERKNINGAR:

Övergående biverkningar på det behandlade området kan förekomma, som t.ex. ömhet, sveda, smärta, rodnad, brännande känsla eller blödning från blodkapillärerna. Gör uppehåll i behandlingen tills huden är återställd. För mycket lösning, felanvändning eller spill kan leda till kraftiga biverkningar, t.ex. blåsor, sår, mörk pigmentering av huden, kemisk brännskada, inflammation, vävnadsdöd (nekros) eller ärrbildning. Det skadade området ska hållas rent för att det inte ska bli infekterat. Avbryt behandlingen och vid allvarlig hudskada kontakta läkare.

SyylEnd PEN C har stark lukt som kan vara irriterande för andningsvägar och ögon. Lukta inte på innehållet i pennan. Biverkningar kan vara t.ex. irritation i luftvägarna och/eller hals, rinnande snuva, rinnande ögon eller andnöd.

I enstaka fall har överkänslighetsreaktioner som t.ex. rodnad, utslag och klåda rapporterats.

I händelse av allvarliga incidenter, kontakta omedelbart Meda Pharma S.p.A. och den nationella myndigheten.

FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL:

Pennapplikator innehållande 3 ml lösning, med kork med öppningsfunktion i två steg, bruksanvisning.

FÖRVARING:

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Förvaras i 15–25°C, helst upprätt med korken nedåt.

HÅLLBARHET:

Se utgångsdatum på pennan och ytterförpackningen. Använd inom 6 månader efter öppning.

Denna bruksanvisning ändrades senast i juli 2022.

SYMBOLER PÅ FÖRPACKNINGEN:



Tillverkare



Utgångsdatum



Batchnummer



Temperaturgräns



Varning



Läs bruksanvisningen



Distributör



Medicinteknisk produkt