

Pakkausseloste : Tietoa käyttäjälle

Acitretin Orifarm 10 mg kovat kapselit Acitretin Orifarm 25 mg kovat kapselit

asitretiimi

VAROITUS

VOI AIHEUTTAÄ VAKAVAA HAITTAA SIKIÖLLE

Naisten on käytettävä tehokasta ehkäisymenetelmää.

Älä käytä valmistetta, jos olet raskaana tai epäilet olevasi raskaana.

▼ Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta. Tällä tavalla voidaan havaita nopeasti uutta turvallisuutta koskevaa tietoa. Voit auttaa ilmoittamalla kaikista mahdollisesti saamistasi haittavaikutuksista. Ks. kohdan 4 lopusta, miten haittavaikutuksista ilmoitetaan.

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

- Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
- Jos sinulla on kysyttävästä, käännä lääkärin, apteekkienkilökunnan tai sairaanhoitajan puoleen.
- Tämä lääke on määritetty vain sinulle, eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
- Jos havaitset haittavaikutuksia, käännä lääkärin, apteekkienkilökunnan tai sairaanhoitajan puoleen. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

1. Mitä Acitretin Orifarm on ja mihin sitä käytetään
2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Acitretin Orifarm -valmistetta
3. Miten Acitretin Orifarm -valmistetta käytetään
4. Mahdolliset haittavaikutukset
5. Acitretin Orifarm -valmisteen säilyttäminen
6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä Acitretin Orifarm on ja mihin sitä käytetään

Acitretin Orifarm kuuluu lääkeaineryhmään retinoidit, jotka ovat A-vitamiinin johdannaisia. Tätä lääkettä käytetään vakavien iho-ongelmien hoitoon, kun iho on paksuuntunut ja se saattaa hilseillä.

Acitretin Orifarm normalisoii ulompien ihokerrosten muodostumisprosessia ja hillitsee ihosolujen lisääntynyttä muodostumista esim. psoriaassisissa.

Acitretin Orifarm -valmisteella hoidetaan vaikeaa psoriaasia ja muita ihosairauksia, joissa uuden ihan muodostumisessa on häiriötä, kuten esim. Darierin tautia aikuisilla.

Asitretiini, jota Acitretin Orifarm sisältää, voidaan joskus käyttää myös muiden kuin tässä pakkausselosteessa mainittujen sairauksien hoitoon. Kysy neuvoa lääkäriltä, apteekkienkilökunnalta tai muulta terveydenhuollon ammattilaiselta tarvittaessa ja noudata aina heiltä saamiasi ohjeita.

2. Mitä sinun on tiedettää, ennen kuin käytät Acitretin Orifarm -valmisteetta

Älä käytä Acitretin Orifarm -valmisteetta:

- jos olet allerginen asitretiinille, muille A-vitamiinin johdannaisille (retinoideille) tai tämän lääkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6)
- jos olet raskaana tai imetät
- jos raskaaksi tulo on mahdollista, noudata kohdassa "Raskaudenehkäisyohjelma" mainittuja varotoimia, ks. kohta "Varoitukset ja varotoimet"
- jos maksasi tai munuaisesi eivät toimi kunnolla
- jos veresi rasva- tai kolesteroliarvot ovat kohonneet (hyperlipidemia)
- jos käytät jotakin muuta retinoideihin kuuluva a läkettä tai suuria määriä A-vitamiinia, jolloin on olemassa A-hypervitaminoosin riski (liian korkea A-vitamiinipitoisuus veressä)
- jos käytät tetrasykliini-antibioottia (infektion hoidossa käytettävä lääke)
- jos sinua hoidetaan metotreksaatilla (syövän, psoriaasin ja reumatautien hoidossa käytettävä lääke).

Varoitukset ja varotoimet

Raskaude nehkäisyohjelma

Raskaana olevat naiset eivät saa käyttää Acitretin Orifarm -valmisteetta.

Tämä lääke voi aiheuttaa vakavaa haittaa sikiölle (lääkkeen sanotaan olevan "teratogeeninen") – se voi aiheuttaa vakavia poikkeavuuksia sikiön aivoissa, kasvoissa, korvissa, silmissä, sydämessä ja tietyissä rauhasissa (kateenkorva ja lisäkilpirauhanen). Tämä lääke myös suurentaa keskenmenon todennäköisyyttä. Seuraukset ovat mahdollisia, vaikka Acitretin Orifarm -valmistetta otettaisiin raskauden aikana vain lyhytkestoisesti.

- Älä käytä Acitretin Orifarm -valmistetta, jos olet raskaana tai epäilet olevasi raskaana.
- Älä käytä Acitretin Orifarm -valmistetta, jos imetät. Lääke erittyy todennäköisesti äidinmaitoon ja saattaa vahingoittaa lasta.
- Älä käytä Acitretin Orifarm -valmistetta, jos saatat tulla raskaaksi hoidon aikana.
- Et saa tulla raskaaksi kolmeen vuoteen hoidon päätyttyä, sillä elimistössäsi voi yhä olla lääkeainetta.

Naisille, jotka voivat tulla raskaaksi, Acitretin Orifarm -valmisteetta määritäään tiukoin ehdoin.

Tämä johtuu siitä, että lääke voi aiheuttaa vakavaa haittaa sikiölle.

Ehdot ovat seuraavat:

- Lääkärin on selitettyvä sinulle sikiöön kohdistuva haittariski. Sinun on ymmärrettävä, miksi et saa tulla raskaaksi ja mitä sinun on tehtävä raskauden ehkäisemiseksi.
- Sinun on täytynyt keskustella ehkäisystä lääkärin kanssa. Lääkäri antaa sinulle tietoa raskauden ehkäisystä. Lääkäri saattaa ohjata sinut erikoislääkärin luokseen saamaan ehkäisyneuvontaa.
- Ennen kuin aloitat hoidon, lääkäri kehottaa sinua käymään raskaustestissä. Testin on varmistettava, että et ole raskaana, kun aloitat Acitretin Orifarm -hoidon.

Naisten on käytettävä tehokasta ehkäisymenetelmää ennen Acitretin Orifarm -hoitoa, sen aikana ja sen jälkeen.

- Sinun on suostuttava käyttämään vähintään yhtä, hyvin luotettavaa ehkäisymenetelmää (esimerkiksi ehkäisykierukkaa tai ehkäisyimplanttia) tai kahta tehokasta, eri tavoin toimivaa ehkäisymenetelmää (esimerkiksi ehkäisypillereitä ja kondomia). Keskustele lääkärin kanssa sinulle parhaiten sopivasta vaihtoehdosta.
- Sinun on käytettävä ehkäisyä kuukauden ajan ennen Acitretin Orifarm -hoidon aloittamista, hoidon aikana ja 3 vuoden ajan hoidon päättymisen jälkeen.
- Sinun on käytettävä ehkäisyä, vaikka sinulla ei olisi kuukautisia tai et olisi seksuaalisesti aktiivinen (ellei lääkäri totea ehkäisyä tarpeettomaksi).

Naisten on suostuttava raskaustestiin ennen Acitretin Orifarm -hoitoa, sen aikana ja sen jälkeen.

- Sinun on käytävä säännöllisillä seurantakäyneillä, mieluiten kuukausittain.

- Sinun on suostuttava säännöllisiin raskaustesteihin, mieluiten kuukausittain hoidon aikana. Ellei lääkäri toisin määrää, sinun on suostuttava raskaustestiin 1–3 kuukauden välein 3 vuoden ajan Acitretin Orifarm -hoidon päättymisestä, sillä elimistössäsi saattaa yhä olla lääkeainetta.
- Sinun on suostuttava ylimääräisiin raskaustesteihin, jos lääkäri niihin määrää.
- Et saa tulla raskaaksi hoidon aikana etkä kolmeen vuoteen hoidon päätyttyä, sillä elimistössäsi voi yhä olla lääkeainetta.
- Lääkäri keskustelee näistä kaikista asioista kanssasi käyttäen tarkistuslistaa ja pyytää sinua (tai vanhempaasi/huoltajaasi) allekirjoittamaan sen. Tarkistuslistan avulla varmistetaan, että sinulle on kerrottu riskeistä ja että suostut noudattamaan edellä mainittuja ehtoja.

Jos tulet raskaaksi Acitretin Orifarm -hoidon aikana, **lopetta lääkkeen käyttö välittömästi** ja ota yhteyttä lääkäriin. Lääkäri saattaa ohjata sinut erikoislääkärin luokse neuvontaa varten.

Jos tulet raskaaksi 3 vuoden kuluessa Acitretin Orifarm -hoidon päättymisestä, ota yhteyttä lääkäriin. Lääkäri saattaa ohjata sinut erikoislääkärin luokse neuvontaa varten.

Ohjeita miehille

Suun kautta otettavan retinoidin pitoisuus Acitretin Orifarm -valmistetta käyttävien miesten siemennesteessä on niin matala, ettei se vahingoita kumppanin syntymätöntä lasta. Älä kuitenkaan luovuta lääkettä kenellekään muulle.

Muut varotoimet

Älä missään tapauksessa luovuta tästä lääke valmis tetta kenellekään muulle. Palauta käyttämättömät kapselit apteekkiin hoidon päätyttyä.

Älä luovuta verta tämän lääke hoidon aikana äläkä 3 vuoteen asitretiinihoidon päätyttyä, sillä sikiölle voi aiheuttaa haittaa, jos verensiirron saaja on raskaana.

Keskustele lääkärin, apteekkienkilökunnan tai sairaanhoitajan kanssa, ennen kuin otat Acitretin Orifarm -valmistetta:

- Jos olet verenluovuttaja. Verta ei saa luovuttaa Acitretin Orifarm -valmisteen käytön aikana eikä kolmeen vuoteen sen käytön lopettamisen jälkeen.
- Jos sinulle annetaan luovutettua verta. Asitretiimilla hoidettujen potilaiden verta ei saa antaa hedelmällisessä iässä oleville naisille.
- Jos olet hedelmällisessä iässä oleva nainen, et saa käyttää alkoholia (juomissa, ruoassa tai lääkeissä) Acitretin Orifarm -valmisteen käytön aikana etkä kahteen kuukauteen käytön lopettamisen jälkeen.
- Jos veresi sokeriarvot ovat kohonneet (diabetes). Veren sokeriarvot on mitattava useammin, kun alat käyttää tästä lääketä.
- Jos sinulla on näköongelmia erityisesti pimeässä.
- Jos käytät pöölinssejä. Acitretin Orifarm kuivattaa silmiä, minkä vuoksi sinun on käytettävä silmälaseja koko hoidon ajan.
- Jos Acitretin Orifarm -valmistetta annetaan lapsille, lasten kasvu ja luiden kehitys on tarkastettava säännöllisin väliajoin. Lasten pitkääikaishoidossa lääkäri on tarkkaan punnittava mahdollisia vaikavia haittavaikutuksia ja lääkkeen käytöstä saatavaa hyötyä.
- Jos Acitretin Orifarm -valmistetta käytetään aikuisten ja erityisesti iäkkäiden pitkääikaishoidossa, luiden mahdolliset poikkeavuudet on tutkittava säännöllisin väliajoin.
- Jos menet ulos voimakkaaseen auringonpaisteesseen tai solariumiin. Tarvittaessa on käytettävä aurinkovoidetta, jonka suojakeroon on vähintään 15.
- Jos koet voimakasta päänsärkyä, pahoinvointia, oksentelua ja näköhäiriötä, jotka voivat olla merkkejä kohonneesta kallonsisäisestä paineesta. Ota yhteys lääkäriin.
- Jos sinulla on ollut mielenterveysongelmia, kuten masennusta, taipumusta aggressiivisuuteen tai mielialan vaihtelua. Acitretin Orifarm -valmisteen käyttö voi vaikuttaa mielialaan.

Asitretiini lisää veren rasvoja, kuten kolesterolia ja triglyseridejä, joilla on yhteys haimatulehdukseen. Kerro lääkärlillesi kovasta vatsa- ja selkäkivusta (se saattaa olla haimatulehduksen oire).

On mahdollista, että pitkääikaisen asitretiinihoidon kaikkia seurauksia ei vielä tunneta.

Ennen hoitoa ja hoidon aikana tehtävä kokeet

- Lääkärin on testattava maksan toiminta ja veren rasva-arvot verikokeilla ennen hoidon aloittamista ja hoidon aikana.
- Jos veresi sokeriarvot ovat kohonneet (diabetes) tai rasva-arvot, kuten triglyseridit tai kolesteroli, ovat kohonneet, jos olet ylipainoinen, tai jos juot paljon alkoholia ja olet pitkääikaishoidossa, veren rasva-arvot ja kolesteroli on mitattava.
- Kun Acitretin Orifarm -hoitoa annetaan lapsille tai hoito on pitkääikaista, lääkäri tutkii säännöllisesti tietyt luut, koska lääke voi aiheuttaa luumuutoksia.

Mielenterveysongelmat

Et välttämättä itse huomaa mielialaasi tai käytökseesi liittyviä muutoksia, joten on hyvin tärkeää kertoa ystäville ja perheenjäsenille, että tämä lääke voi vaikuttaa mielialaan ja käytökseen. He saattavat huomata tällaiset muutokset ja auttaa sinua tunnistamaan ongelmat, joista sinun on kerrottava lääkärille.

Muut lääkevalmisteet ja Acitretin Orifarm

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät, tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä.

Acitretin Orifarm voi lisätä fenytoïinin (epilepsialääkkeen) tehoa. Fenytoïniannosta voidaan joutua muuttamaan.

Älä käytä Acitretin Orifarm -valmistetta seuraavien lääkeaineiden kanssa:

- tetrasykliini (infektion hoidossa käytettävä lääke), koska kallonsisäinen paine voi nousta
- metotreksaatti (syövän, psoriaasin ja reumatautien hoidossa käytettävä lääke), koska yhdistelmä voi aiheuttaa maksatulehduksen
- niin sanottu minipilleri (vain pieniä määriä progesteronihormonia sisältävä ehkäisypilleri); asitretiini voi vähentää ehkäisevää vaikutusta, minkä takia minipillereitä ei saa käyttää ehkäisypillereinä Acitretin Orifarm -valmistetta käytettäessä
- lääkkeet tai A-vitamiinilisät, joissa on suuria A-vitamiinipitoisia uusia
- muut retinoidit kuten isotretinoiini.

Acitretin Orifarm ruuan, juoman ja alkoholin kanssa

Acitretin Orifarm otetaan ruoan tai maitolasillisen kanssa.

Acitretin Orifarm -hoidon aikana ei saa juoda alkoholia, koska haittavaikutusten riski kasvaa.

Hedelmällisessä iässä olevat naiset eivät saa käyttää alkoholia (juomissa, ruoassa tai lääkkeissä) Acitretin Orifarm -hoidon aikana eivätkä kahteen kuukauteen hoidon loppumisen jälkeen.

Raskaus, imetys ja hedelmällisyys

Raskaus

Acitretin Orifarm -valmisteita EI saa käyttää, jos olet raskaana, epäilet olevasi raskaana tai suunnittelet lapsen hankkimista.

- Acitretin Orifarm voi aiheuttaa synnynnäisiä vikoja lapselle, minkä vuoksi raskauden mahdollisuus on suljettava pois ennen Acitretin Orifarm -hoidon aloittamista.
- Tehokasta ehkäisyä (mieluiten 2 toisiaan täydentävää menetelmää) on käytettävä keskeytyksettä neljän viikon ajan ennen asitretiinihoidon aloittamista, koko hoidon ajan sekä 3 vuotta hoidon lopettamisen jälkeen.

Lisätietoa raskaudesta ja ehkäisystä, ks. kohta 2 ”Raskaudenehkäisyohjelma”.

Imetys

Acitretin Orifarm -valmistetta ei saa käyttää imetyksen aikana, koska asitretiini erittyy äidinmaitoon ja voi vahingoittaa lasta.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Pimeässä näkeminen voi yhtäkkiä vaikeutua hoidon aikana. Joissain harvoissa tapauksissa näkövaikeudet ovat jatkuneet hoidon lopettamisen jälkeenkin. Ole varovainen, jos ajat tai käytät työkaluja tai koneita yöllä tai tunnelissa.

Lääke voi heikentää kykyä kuljettaa moottoriajoneuvoa tai tehdä tarkkaa keskittymistä vaativia tehtäviä. On omalla vastuullasi arvioda, pystykö näihin tehtäviin lääkehoidon aikana. Lääkkeen vaikutuksia ja haittavaikutuksia on kuvattu muissa kappaleissa. Lue koko pakkausseloste opastukseksesi. Keskustele lääkärin tai apteekkienkilökunnan kanssa, jos olet epävarma.

3. Miten Acitretin Orifarm -valmiste tta käytetään

Käytä tätä läkettä juuri siten kuin lääkäri on määritellyt tai apteekkienkilökunta on neuvonut. Tarkista ohjeet lääkärltä tai aptekista, jos olet epävarma.

Erikoislääkäri määräää yksilöllisen Acitretin Orifarm -annoksen.

Acitretin Orifarm otetaan ruoka-aikaan mieluiten maidon kanssa. Kapselit niellään kokonaisina.

Suositeltu annos on:

Aikuiset ja iäkkääät

- Aikuisten ja iäkkäiden tavallinen aloitusannos on 10 mg, 25 mg tai 30 mg kerran vuorokaudessa.
- 2–4 viikon kuluttua lääkäri voi pienentää tai suurentaa annosta lääkkeen tehon ja vaikutuksen mukaan.
- Maksimiannos on yleensä 30 mg päivässä (75 mg päivässä joissain tapauksissa).
- Useimmat ihmiset käyttävät Acitretin Orifarm -valmistetta enintään kolme kuukautta. Lääkäri voi kuitenkin päättää pitemmästä käyttöajasta.

Voit käyttää lisäksi ihmisen paikallishoitoja mukaan luettuina ihmehoitotuotteet, kun ensin kysyt lääkärltä neuvoa.

Käyttö lapsille ja nuorille

Acitretin Orifarm -valmistetta annetaan lapsille vain erityistilanteissa. Lääkäri päättää lapselle mahdollisesti annettavan annoksen lapsen painon perusteella. Pitkäaikaishoitoa ei suositella lapsille.

Jos otat enemmän Acitretin Orifarm -valmiste tta kuin sinun pitäisi

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut läkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

Liian suuren Acitretin Orifarm -annoksen oireita ovat esim. päänsärky, huimaus, pahoinvointi ja/tai oksentelu, uneliaisuus, ärtyneisyys ja kutina. Lopeta Acitretin Orifarm -valmisteen käyttö ja kysy välittömästi neuvoa lääkärltä.

Jos unohdat ottaa Acitretin Orifarm -valmiste tta

Älä ota kaksinkertaista Acitretin Orifarm -annosta korvataksesi unohtamasi annoksen. Jos unohdat ottaa annoksen, ota se heti kun muistat, ja jatka hoitoa annosohjeiden mukaan. Jos kuitenkin on jo melkein seuraavan annoksen aika, jätä unohtunut annos ottamatta.

Jos lopetat Acitretin Orifarm -valmisteen käytön

Lääkäri pystyy parhaiten arvioimaan, miten ja milloin Acitretin Orifarm -valmisten käyttö pitää lopettaa. Ota aina yhteyttä lääkärin, ennen kuin lopeta Acitretin Orifarm -valmisen käytön.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin, apteekkienkilokunnan tai sairaanhoitajan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Asitretiinin haittavaikutukset ovat annosriippuvaisia. Useimmat haittavaikutukset ilmenevät hoidon alkuvaiheessa, kun annosta voidaan vielä joutua muuttamaan. Useimmat haittavaikutukset häviävät, kun annosta muutetaan tai hoito lopetetaan. Joskus iho-oireet voivat pahentua hoidon alkuvaiheessa. Koska asitretiini on A-vitamiinin johdannainen, useimmat haittavaikutukset ovat samankaltaisia kuin A-vitamiinin liikakäytön aiheuttamat haittavaikutukset.

Lopeta Acitretin Orifarm -valmisten käyttö ja ota yhteyttä lääkäriin, jos seuraavia haittavaikutuksia ilmenee:

Melko harvinaiset (alle 1 potilaalla 100:sta):

- maksatulehdus (kellertävä iho ja silmien väri, tumma virtsa, vaaleat ulosteet, mahakipu, ruokalahun puute ja väsymys)

Hyvin harvinaiset (alle 1 potilaalla 10 000:sta):

- kohonnut kallonsisäinen paine (päänsärky, kipu silmien takana, näköhäiriöt)
- luumuutokset (jäykkyys ja luukipu).

Tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riittä arviointiin):

- silmänympärysten, suun tai huulien turvotus (angioedeema).

Muita haittavaikutuksia:

Hyvin yleiset (yli 1 potilaalla 10:stä):

- kuiva nenä, nenäverenvuodot, nuha
- kuiva suu, jano, kuivat huulet, halkeamia hulessa, kuiva iho, kutina, hiusten lähtö, ihan kuoriutuminen erityisesti kämmenissä ja jalkapohjissa
- kohonneet veren rasva-arvot (triglyseridit, kolesteroli), lisääntynyt valtimoiden kovettumataudin (ateroskleroosin) riski
- ohimeneviä muutoksia maksan toiminnassa (verikokeet).

Yleiset (alle 1 potilaalla 10:stä):

- päänsärky
- silmien limakalvojen kuivuminen ja infektiot (minkä vuoksi ei ehkä voi käyttää piilolinssejä)
- suu- ja huulitulehdut
- mahavaivat (esim. mahakipu, ripuli, pahoinvoindi, oksentelu)
- hauras iho, rasvainen iho, rakkulaiset ihotulehdut, hiusmuutokset, hauraat kynnet, kynsitulehdut, ihan punoitus
- niveli- ja lihaskivut
- käsi-, jalkaterien ja nilkkojen turvotus.

Melko harvinaiset (alle 1 potilaalla 100:sta):

- huimaus
- näön hämärtyminen
- ientulehdus
- ihan halkeamat, rakkulaiset ihotulehdut (infektiot), ihan lisääntynyt valonarkkuus.

Harvinaiset (alle 1 potilaalla 1 000:sta):

- heikotus, pistely, tunnottomuus tai halvaus, käsi- ja jalkakivut.

Hyvin harvinaiset (alle 1 potilaalla 10 000:sta):

- sarveiskalvon kivuliaat haavaumat ja näön hämärtyminen
- näkökyvyn heikkeneminen pimeässä
- makuhäiriöt
- peräsuolen verenvuoto
- luuperäinen kipu, väsymys
- ikterus (ihon, limakalvojen ja silmänvalkuisten keltaisuus).

Tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin):

- nesteen tihkuminen verenkierrosta, mikä voi laskea verenpainetta ja aiheuttaa muutoksia vereen (hiussuonivuoto-oireyhtymä/retinoiinihapposyndrooma)
- emättimen hiivatulehdus
- yliherkkysreaktio
- kuulon heikkeneminen, tinnitus
- punoitus
- pienet, punaiset, vuotavat ihokyhmyt
- silmäripien häviäminen
- nokkosihottuma
- ihan oheneminen
- ihan kuoriutuminen hilseenä tai kerroksittain
- äänen muutokset (dysfonia).

Suuret annokset asitretiiniin kaltaisia lääkkeitä voivat aiheuttaa mielialan muutoksia kuten esim. äartyneisyyttä, aggressioita ja masennusta.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkienkilökunnalle tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselostteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www.sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

5. Acitre tin Orifarm -valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tästä lääkettä pakkauksessa ja pullossa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (EXP) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Acitre tin Orifarm -valmiste sisältää

- Vaikuttava aine on asitretiini. Yhdessä kapselissa on 10 mg tai 25 mg asitretiinia.
- Muut aineet ovat:

Kapselin sisältö: maltodekstriini, mikrokiteinen selluloosa, natriumaskorbaatti, dinatriumedetaatti, poloksameeri.
Kapselin kuori: Liivate, titaanidioksidi (E171), punainen rautaoksidi (E172), keltainen rautaoksidi (E172), musta rauraoksidi (E172).
Muste: Sellakka, titaanidioksidi (E171), propyleeniglykoli.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko

10 mg: ruskea, läpikuultamaton/ valkoinen läpikuultamaton kapseli, johon on painettu valkoisella "U68", ja täytetty keltaisella rakeisella jauheella. Kapselin koko on noin 14,3 x 5,3 mm.

25 mg: ruskea, läpikuultamaton/ keltainen läpikuultamaton kapseli, johon on painettu valkoisella "U69", ja täytetty keltaisella rakeisella jauheella. Kapselin koko on noin 19,4 x 6,9 mm.

Läpipainopakkaus:

10 mg: 50 ja 100 kovaa kapselia

25 mg: 30, 50 ja 100 kovaa kapselia.

Kaikkia pakkauskokoja ei vältämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Orifarm Generics A/S

Energivej 15

DK-5260 Odense S

Tanska

Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja.

info@orifarm.com

Tällä lääkevalmisteella on myyntilupa Euroopan talousalueeseen kuuluvissa jäsenvaltioissa seuraavilla kauppanimillä:

Tanska, Ruotsi, Norja, Suomi: Acitretin Orifarm

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 26.09.2019

Yksityiskohtaista, päivitettyä tietoa tästä valmisteesta seuraavasta verkko-osoitteesta: www.fimea.fi verkkosivusto.

Bipackse del: Information till användaren

Acitretin Orifarm 10 mg hårla kapslar Acitretin Orifarm 25 mg hårla kapslar

acitretin

VARNING

KAN ALLVARLIGT SKADA ETT OFÖTT BARN

Kvinnor måste använda effektivt preventivmedel

Använd inte detta läkemedel om du är gravid eller tror du kan vara gravid

▼ Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till genom att rapportera de biverkningar du eventuellt får. Information om hur du rapporterar biverkningar finns i slutet av avsnitt 4.

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.
- Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.
- Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipackse del finns information om följande :

1. Vad Acitretin Orifarm är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du tar Acitretin Orifarm
3. Hur du tar Acitretin Orifarm
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Acitretin Orifarm ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Acitretin Orifarm är och vad det används för

Acitretin Orifarm tillhör en grupp läkemedel som kallas retinoider. Retinoider härstammar från vitamin A. Läkemedlet används vid behandling av svåra hudproblem med förtjockad hud som kanske fjällar.

Acitretin Orifarm har en normaliseringande inverkan på de processer som sker vid nybildandet av hudens yttersta lager och dämpar det ökade bildandet av hudceller som ses vid t ex psoriasis.

Acitretin Orifarm används vid svåra former av psoriasis och andra hudsjukdomar som karaktäriseras av rubbningar i nybildningen av hud, t ex Dariers sjukdom hos vuxna.

Acitretin som finns i Acitretin Orifarm kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2. Vad du behöver veta innan du tar Acitretin Orifarm

Ta inte Acitretin Orifarm:

- om du är allergisk mot acitretin, andra vitamin A-besläktade substanser (retinoïder) eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).
- om du är gravid eller ammar
- om det finns en möjlighet att du skulle kunna bli gravid måste du följa försiktighetsåtgärderna under ”Graviditetsförebyggande program”, se avsnittet i ”Varningar och försiktighet”.
- om din lever eller njurar inte fungerar ordentligt
- om du har mycket höga nivåer av blodfetter eller kolesterol i blodet (kallas även ”hyperlipidemi”).
- om du tar andra läkemedel som innehåller retinoïder eller höga doser vitamin A. Det finns risk för hypervitaminosis A (för höga nivåer av vitamin A i blodet).
- om du använder ett antibiotikum som kallas tetracyklin (läkemedel vid behandling av infektion)
- om du behandlas med metotrexat (ett läkemedel som används vid behandling av cancer, psoriasis och reumatiska sjukdomar).

Varningar och försiktighet

Graviditetsförebyggande program

Kvinnor som är gravida får inte ta Acitretin Orifarm

Detta läkemedel kan allvarligt skada ett ofött barn (läkemedlet är s.k. ”teratogen”) – det kan orsaka allvarliga missbildningar av det ofödda barnets hjärna, ansikte, öron, ögon, hjärta och vissa körtlar (tymus och bisköldkörteln). Det ökar också risken för missfall. Detta kan hända även om Acitretin Orifarm bara tas under en kort tid av graviditeten.

- Du får inte ta Acitretin Orifarm om du är gravid eller om du tror att du kan vara gravid.
- Du får inte ta Acitretin Orifarm om du ammar. Acitretin Orifarm går sannolikt över i bröstmjölk och kan skada ditt barn.
- Du får inte ta Acitretin Orifarm om du kan bli gravid någon gång under behandlingen.
- Du får inte bli gravid under 3 år efter att du avslutat denna behandling eftersom en viss mängd läkemedel fortfarande kan finnas kvar i din kropp.

Kvinnor som kan bli gravida får Acitretin Orifarm utskrivet under mycket strikta förutsättningar. Detta beror på risken för mycket allvarliga skador hos det ofödda barnet.

Detta är förutsättningarna:

- Din läkare måste ha förklarat den fosterskadande risken: du måste förstå varför du inte får bli gravid och hur du ska förhindra graviditet.
- Du måste ha diskuterat användning av effektiva preventivmedel med din läkare, läkaren ska ge dig information om hur du förhindrar graviditet. Din läkare kan skicka (remittera) dig till en specialist för råd om preventivmedel.
- Innan du påbörjar behandlingen kommer läkaren att be dig göra ett graviditetstest, detta måste vara negativt (dvs. visa att du inte är gravid) för att du ska kunna påbörja behandling med Acitretin Orifarm.

Kvinnor måste använda effektiva preventivmedel före, under och efter behandling med Acitretin Orifarm

- Du måste godkänna att använda åtminstone ett effektivt preventivmedel (t.ex. spiral eller preventivmedelsimplantat) eller två effektiva medel som fungerar på olika sätt (t.ex. ett hormonellt P-piller och kondom). Diskutera med din läkare vilka metoder som passar bäst för dig.
- Du måste använda preventivmedel under 1 månad innan du tar Acitretin Orifarm, under behandlingen och i 3 år efter behandlingen.
- Du måste använda preventivmedel även om du inte har menstruation eller inte är sexuellt aktiv (såvida inte din läkare bedömer att det inte är nödvändigt)

Kvinnor måste gå med på att göra graviditets test före, under och efter behandling med Acitretin Orifarm

- Du måste gå med på att gå på uppföljningsbesök, helst varje månad.
- Du måste gå med på att göra regelbundna graviditetstester, helst varje månad under behandlingen och, eftersom en viss mängd läkemedel fortfarande kan finna kvar i din kropp, varje till var tredje

- månad under 3 års tid efter avslutad behandling med Acitretin Orifarm (om inte din läkare bestämmer att det inte är nödvändigt i ditt fall)
- Du måste gå med på extra graviditetstester om din läkare ber dig om detta.
 - Du får inte bli gravid under behandlingstiden eller inom 3 år efter avslutad behandling eftersom en viss mängd läkemedel fortfarande kan finna kvar i din kropp.
 - Läkaren kommer att diskutera dessa punkter med dig med hjälp av en checklista och kommer att be dig (eller din förälder/vårdnadshavare) att underteckna den. I och med detta bekräftar du att du har informerats om riskerna och att du kommer att följa villkoren ovan.

Om du blir gravid under behandlingen med Acitretin Orifarm **ska du omedelbart sluta ta läkemedlet** och kontakta din läkare. Läkaren kan komma att hänvisa dig till en specialist för råd.

Om du blir gravid inom 3 år efter att behandlingen upphört ska du kontakta din läkare. Läkaren kan komma att hänvisa dig till en specialist för råd.

Råd för män

Nivåerna av retinoider i sädsvätskan hos män som använder Acitretin Orifarm är för låga för att orsaka skada hos partnersns ofödda barn. Du måste dock komma ihåg att aldrig ge ditt läkemedel till någon annan.

Ytterligare försiktighetsåtgärder

Du ska aldrig ge detta läkemedel till någon annan. Återlämna eventuella oanvända kapslar till apoteket när behandlingen är avslutad.

Du ska inte donera blod under behandling med detta läkemedel eller inom 3 år efter avslutad behandling med Acitretin Orifarm eftersom ofödda barn kan skadas om gravida kvinnor får ditt blod.

Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du tar Acitretin Orifarm.

- om du är blodgivare. Du ska inte donera blod under tiden du tar Acitretin Orifarm och 3 år efter du slutat ta det.
- om du får blodtransfusioner. Du ska inte motta blodtransfusioner från patienter som behandlas med acitretin om du är kvinna i barnafödande ålder.
- om du är kvinna i barnafödande ålder måste du undvika alkohol (i drycker, livsmedel eller läkemedel) under tiden du behandlas med Acitretin Orifarm och 2 månader efter avslutad behandling.
- om du har högt blodsocker (diabetes). Du behöver kontrollera dina blodsockernivåer oftare när du börjar ta detta läkemedel.
- om du får problem med synen, särskilt i mörker.
- om du använder kontaktlinser. Acitretin Orifarm orsakar torrhet i ögonen och därför ska du använda glasögon under hela behandlingen.
- om Acitretin Orifarm ska användas till barn måste tillväxt och benutveckling kontrolleras regelbundet. Vid långtidsbehandling av barn måste läkaren noggrant väga risken för svåra biverkningar mot fördelarna med behandling av detta läkemedel.
- om Acitretin Orifarm används under lång tid till personer i vuxen ålder, särskilt äldre, måste regelbundna kontroller utföras med avseende av möjliga benmissbildningar.
- om du vistas i stark sol eller om du använder solarium måste du använda solskydd med minst solskyddsfaktor 15.
- om du får svår huvudvärk, illamående, kräkningar och synrubbningar. Detta kan vara tecken på ökat tryck i huvudet. Kontakta din läkare.
- om du någon gång haft problem med din psykiska hälsa, inklusive depression, aggressiva tendenser eller humörvägningar. Acitretin Orifarm kan nämligen påverka ditt humör.

Acitretin ökar vanligtvis blodfetter, såsom kolesterol eller triglycerider, vilka har associerats med bukspottkörtelinflammation. Tala om för läkaren om du får svår smärta i buken och ryggen (dessa kan vara tecken på inflammation i bukspottkörteln).

Det bör noteras att eventuellt inte alla effekter av långtidsbehandling med acitretin är ännu kända.

Undersökningar före och under behandlingen:

- Din läkare bör testa dina blodvärden före behandlingsstart och under behandlingen för att undersöka din leverfunktion och dina blodfettsnivåer
- Om du har av höga halter socker i blodet (diabetes) eller om du har höga blodfettsnivåer, såsom triglycerider eller kolesterol, om du är överviktig eller om du dricker mycket alkohol och behandlas under lång tid, måste dina nivåer av blodfetter och kolesterol kontrolleras.
- Vid behandling av barn, och vid långtidsbehandling Acitretin Orifarm, kommer vissa delar av skelettet kontrolleras regelbundet av läkare eftersom detta läkemedel kan orsaka benförändringar.

Psykiska problem

Du kanske själv inte lägger märke till vissa förändringar i ditt humör och beteende, så det är mycket viktigt att du berättar för dina vänner och din familj att detta läkemedel kan påverka ditt humör och beteende. De kan lägga märke till dessa förändringar och hjälpa dig att identifiera eventuella problem som du behöver prata med din läkare om.

Andra läkemedel och Acitretin Orifarm

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Effekten av fenytoin (ett läkemedel vid epilepsi) kan öka av Acitretin Orifarm. Fenytoindosen kan behöva justeras.

Ta inte Acitretin Orifarm tillsammans med:

- tetracyklin (läkemedel mot infektioner) eftersom ökat tryck i hjärnan kan uppstå.
- metotrexat (läkemedel vid cancer, psoriasis och reumatiska sjukdomar), eftersom kombinationen kan orsaka leverinflammation.
- så kallade mini-pillar (ett p-pillar med endast låga halter progresteron). Acitretin kan sänka effekten av preventivmedlet och du ska därför inte använda mini-pillar som preventivmetod när du tar Acitretin Orifarm.
- läkemedel eller vitamin A-tillskott som innehåller höga halter vitamin A.
- andra retinoidläkemedel, såsom isotretinoïn

Acitretin Orifarm med mat, dryck och alkohol

Acitretin Orifarm bör tas tillsammans med mat eller med ett glas mjölk.

Du bör inte dricka alkohol under behandlingen med Acitretin Orifarm eftersom risken för biverkningar ökar.

Kvinnor i barnafödande ålder måste helt undvika alkohol (i drycker, livsmedel eller läkemedel) under behandlingen med Acitretin Orifarm och 2 månader efter den avslutats.

Graviditet, amning och fertilitet

Graviditet

Du får INTE ta Acitretin Orifarm om du är gravid, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn.

- Acitretin Orifarm kan orsaka fosterskador. Du måste därför utesluta att du är gravid innan du påbörjar behandling med Acitretin Orifarm.
- Du måste använda effektiv preventivmetod (helst två kompletterande metoder) utan uppehåll i fyra veckor före, under, samt under 3 år efter du avslutat behandlingen med acitretin.

För mer information om graviditet och preventivmedel, se avsnitt 2 ”Graviditetsförebyggande program”.

Amning

Ta inte Acitretin Orifarm om du ammar eftersom acitretin passerar över i bröstmjölk och kan skada barnet.

Körförstånd och användning av maskiner

Ditt mörkerseende kan försämras under behandlingen. Detta kan ske plötsligt. I sällsynta fall har försämringen kvarstått efter behandlingen avslutats. Var försiktig om du framför motorfordon eller använder maskiner på kvällen eller i en tunnel.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förstånd i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

3. Hur du tar Acitretin Orifarm

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Dosen av Acitretin Orifarm bestäms av den förskrivande specialistläkaren som avpassar den individuellt.

Ta Acitretin Orifarm i samband med måltid och helst tillsammans med mjölk.
Svälg kapseln hel.

Rekommenderad dos är:

Vuxna och äldre

- Vanlig startdos för vuxna och äldre är 10 mg, 25 mg eller 30 mg en gång dagligen.
- Efter 2 till 4 veckor kan din läkare öka eller sänka din dos beroende på hur väl den fungerar och hur den påverkar dig.
- Maximal dos är oftast 30 mg per dag (75 mg per dag i enstaka fall).
- De flesta tar Acitretin Orifarm i upp till 3 månader. Din läkare kan emellertid bestämma att du behöver ta den under längre tid.

Du kan använda kompletterande behandlingar lokalt på huden, inklusive hudvårdsprodukter, efter du konsulterat din läkare.

Användning för barn och ungdomar

Acitretin Orifarm ges till barn endast under speciella omständigheter. Om ett barn behandlas kommer läkaren bestämma rätt dos baserat på barnets vikt. Långtidsbehandling av barn rekommenderas inte.

Om du har tagit för stor mängd av Acitretin Orifarm

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 0800 147 111) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du tar för stor mängd Acitretin Orifarm kan du uppleva huvudvärk, yrsel, illamående och/eller kräkningar, dåsighet, irriterbaritet och klåda. Sluta ta Acitretin Orifarm och kontakta din läkare omedelbart.

Om du har glömt att ta Acitretin Orifarm

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett. Om du glömmer att ta en dos, ta den så fort du upptäcker det och fortsätt sedan enligt vanligt dosschema. Om det ändå snart är dags för nästa dos ska du emellertid hoppa över den missade dosen.

Om du slutar att ta Acitretin Orifarm

Din läkare kan bäst avgöra om och hur du måste sluta ta Acitretin Orifarm. Kontakta alltid din läkare innan du slutar ta din medicin.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Biverkningar av acitretin är dosberoende. De flesta biverkningar uppstår i början av behandlingen när dosen fortfarande behöver justeras. De flesta biverkningar försinner när dosen ändras eller när behandlingen avslutas. Det kan hända att symtomen i din hud försämras i början av behandlingen. Eftersom acitretin härstammar från vitamin A, liknar de flesta biverkningar de symptom som uppstår hos någon som tagit för mycket vitamin A.

Sluta att ta Acitretin Orifarm och uppsök läkare om du får något av följande:

Mindre vanliga (kan före komma hos upp till 1 av 100 användare):

- leverinfektion (gulaktig hud och ögonfärg, mörk urin, ljus avföring, magsmärta, aptitlöshet och trötthet)

Mycket sällsynta (kan före komma hos upp till 1 av 10 000 användare):

- förhöjt tryck i hjärnan (huvudvärk, smärta bakom ögonen, synstörningar)
- skelettförändringar (stelhet och skelettsmärta)

Har rapporterats (före kommer hos ett okänt antal användare):

- svullnad runt ögonen, mun och läppar (angioödem)

Andra biverkningar:

Mycket vanliga (kan före komma hos fler än 1 av 10 användare):

- torr näsa, näsblod, snuva
- munorrhett, törst, torra läppar, sprickor i läpparna, torr hud, klåda, hårvälfall, fjällning av hud särskilt på handflator och fotsulor
- ökade nivåer av blodfetter (triglycerider, kolesterol): ökad risk för åderförkalkning
- övergående förändringar i leverfunktionsvärden (blodprov).

Vanliga (kan före komma hos upp till 1 av 10 användare):

- huvudvärk
- torra och infekterade slemhinnor i ögonen (kan medföra att du inte kan använda kontaktlinser)
- inflammation i munnen och läpparna
- magproblem (t ex magsmärter, diarré, illamående, kräkningar)
- ömtålig hud, fet hud, hudinflammation med blåsor, hårförändringar, sköra naglar, nagelinflammation, hudrodnad
- ledsmärta, muskelsmärta
- svullna händer, fötter och anklor

Mindre vanliga (kan före komma hos upp till 1 av 100 användare):

- yrsel
- dimsyn
- tandkötsinflammation
- sprickor i huden, hudinfektion med blåsor, ökad känslighet i huden mot solljus

Sällsynta (kan före komma hos upp till 1 av 1 000 användare):

- svaghet, stickningar, domningar eller förlamning, slutligen smärta i händer och fötter

Mycket sällsynta (kan före komma hos upp till 1 av 10 000 användare):

- sår i hornhinnan med smärta och dimsyn
- nedsatt mörkerseende
- smakförändringar
- blödande ändtarm
- skelettsmärta, trötthet
- gulsort

Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):

- vätskeläckage från hjärt-kärlsystemet, som kan orsaka lågt blodtryck och blodförändringar (systemiskt kapillärläckage/retinoidsyrasyndrom)
- infektion i vagina (torsk)
- överkänslighetsreaktion
- nedsatt hörsel, ringningar i öronen
- rodnad
- små, röda, blödande knölar i huden
- tappade ögonfransar
- nässelutslag
- förtunnad hud
- fjällande eller flagnande hud
- förändringar i hur rösten låter (dysfoni)

Behandling med höga doser av läkemedel som acitretin kan orsaka humörvängningar med irritabilitet, aggression och depression.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar via:

webbplats: www.fimea.fi

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea

Biverkningsregistret

PB 55

00034 FIMEA

Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

5. Hur Acitretin Orifarm ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

- Den aktiva substansen är acitretin. En kapsel innehåller 10 mg eller 25 mg acitretin.
- Övriga innehållsämnen är:

Kapselns innehåll:	Maltodextrin, mikrokristallin cellulosa, natriumaskorbat, dinatriumedetat, poloxamer.
Kapselskal:	Gelatin, titandioxid (E171), röd järnoxid (E172), gul järnoxid (E172), svart järnoxid (E172).
Märkningsbläck:	Shellac, titandioxid (E171), propylenglykol.

Läke medlets utseende och förpackningsstorlekar

10 mg: Brun ogenomskinlig/vit ogenomskinlig kapsel, märkt "U68" i vit text och fyllt med ett gult granulat. Kapselns storlek är cirka 14,3 x 5,3 mm.

25 mg: Brun ogenomskinlig/gul ogenomskinlig kapsel, märkt "U69" i vit text och fyllt med ett gult granulat. Kapselns storlek är cirka 19,4 x 6,9 mm.

Blisterförpackningar:

10 mg: 50 och 100 hårdas kapslar

25 mg: 30, 50 och 100 hårdas kapslar.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Orifarm Generics A/S

Energivej 15

5260 Odense S

Danmark

Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbeotsområdet under namnen:

Danmark, Sverige, Norge, Finland: Acitretin Orifarm

Denna bipacksedel ändrades senast 26.09.2019

Detaljerad och uppdaterad information om detta läkemedel finns tillgänglig på följande webbadress (URL): www.fimea.fi.