

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle

Pantoprazol Viatris 40 mg enterotabletit pantopratsoli

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

- Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
- Jos sinulla on kysyttävää, käännä lääkärin tai apteekkienkilökunnan puoleen.
- Tämä lääke on määritetty vain sinulle eikä sitä pidä antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
- Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkienkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

1. Mitä Pantoprazol Viatris on ja mihin sitä käytetään
2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Pantoprazol Viatris -enterotabletteja
3. Miten Pantoprazol Viatris -enterotabletteja käytetään
4. Mahdolliset haittavaikutukset
5. Pantoprazol Viatris -enterotablettien säilyttäminen
6. Pakkausen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä Pantoprazol Viatris on ja mihin sitä käytetään

Pantopratsoli on ns. selektiivinen protonipumpun estääjä, joka vähentää mahalaukussa muodostuvan hapon määriä. Sillä hoidetaan haponeritykseen liittyviä vatsan ja suoliston sairauksia.

Pantoprazol Viatris -enterotabletteja käytetään:

Aikuisilla ja 12-vuotiailla ja sitä vanhemmillä nuorilla:

- Ruokatorven refluksitulehuksen hoitoon. Ruokatorventulehdus (tila, jossa ruokatorveen nouseva mahansisältö aiheuttaa ruokatorven tulehtumisen).

Aikuisilla:

- *Helicobacter pylori* -bakteerin aiheuttaman infektion hoitoon, kun potilaalla on maha- tai pohjukaissuolihaava. Hoitoon kuuluu myös kaksi antibioottia (häätöhoito). Tavoitteena on häätää bakteeri elimistöstä ja siten pienentää haavaumien uusiutumisen todennäköisyyttä.
- Maha- ja pohjukaissuolihaavan hoitoon.
- Zollinger-Ellisonin oireyhtymän ja muiden sellaisten tilojen hoitoon, joissa mahahappoa erittyy liikaa.

Pantopratsolia, jota Pantoprazol Viatris sisältää, voidaan joskus käyttää myös muiden kuin tässä pakkausselosteessa mainittujen sairauksien hoitoon. Kysy neuvoa lääkäriltä, apteekkienkilökunnalta tai muulta terveydenhuollon ammattilaiselta tarvittaessa ja noudata aina heiltä saamiasi ohjeita.

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Pantoprazol Viatris -enterotabletteja

Älä käytä Pantoprazol Viatris -enterotabletteja

- jos olet allerginen pantopratsolille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6).
- jos olet allerginen muita protonipumpun estäjiä sisältäville lääkkeille.

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai apteekkienkilökunnan kanssa ennen kuin käytät Pantoprazol Viatris -enterotabletteja:

- jos sinulla on vaikeita maksavaivoja. Kerro lääkärillesi, jos sinulla on joskus aiemmin ollut maksavaivoja. Hän seuraa maksaentsyymiä rajojasi tavallista useammin, erityisesti jos käytät pantopratsolia pitkään. Jos maksaentsyymiä rajojasi suurenevat, hoito pitää lopettaa.
- jos elimistösi B₁₂-vitamiinivarastot ovat vähentyneet tai sinulla on B₁₂-vitamiinia vähentäviä riskitekijöitä ja käytät pitkäaikaista pantopratsolihoitoa. Kuten kaikki haponeritystä vähentävät lääkkeet, myös pantopratsoli voi vähentää B₁₂-vitamiinin imetyymistä elimistöön.
- jos käytät atatsanaviiriä (käytetään HIV-infektioiden hoitoon) sisältävästä lääkettä samanaikaisesti pantopratsolin kanssa, kysy neuvoa lääkäriltäsi.
- jos sinulla on joskus ilmennyt ihoreaktioita jonkin toisen, Pantoprazol Viatris -lääkkeen tavoin vatsahappoa vähentävän lääkkeen käytön yhteydessä.
- jos olet menossa tiettyyn verikokeeseen (kromogroniini A).

Kerro lääkärillesi välittömästi, jos huomaat joitakin seuraavista oireista:

- tahaton painonlasku
- toistuva oksentelu
- nielmisvaikeudet
- verioksennukset
- kalpeus ja heikotus (anemia)
- verta ulosteessa
- vaikea ja/tai sitkeä ripuli, sillä pantopratsolin käyttöön on liittynyt tulehdusripulin vähäistä lisääntymistä.

Jos sinulle kehittyy ihottuma etenkin auringonvalolle alttiille ihoalueelle, kerro siitä lääkärille mahdollisimman pian, koska Pantoprazol Viatris -hoito voidaan joutua lopettamaan. Muista mainita myös muut sairauden oireet, kuten nivelpipu.

Lääkäriksi mielestä saatat tarvita lisätutkimuksia, joilla suljetaan pois pahanlaatuinen sairaus. Pantopratsoli lievittää myös syövän oireita ja saattaa viivytä syöpädiagnoosin tekona. Jos oireet jatkuvat hoidosta huolimatta, lisätutkimusten tekemistä harkitaan.

Jos käytät pantopratsolia pitkään (yli vuoden ajan), lääkäriksi haluaa todennäköisesti seurata vointiasi säännöllisesti. Kerro aina lääkärillesi kaikista uusista ja poikkeavista oireista ja olosuhteista.

Protonipumpun estäjän, kuten pantopratsolin, käyttö (erityisesti pitkäaikainen, yli vuoden kestävä käyttö) saattaa lievästi suurentaa lonkan, ranteen tai selkärangan murtuman riskiä. Kerro lääkärille, jos sinulla on todettu osteoporoosi tai käytät kortikosteroideja (voivat suurentaa osteoporoosin riskiä).

Muut lääkevalmisteet ja Pantoprazol Viatris

Kerro lääkärille tai apteekkikenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät, olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkeitä, koska Pantoprazol Viatris -enterotabletit saattavat vaikuttaa näiden tehoon.

- Lääkkeet, kuten ketokonatsoli, itrakonatsoli ja posakonatsoli (käytetään sieni-infektioiden hoitoon) tai erlotinibi (käytetään tiettyjen syöpien hoitoon), sillä pantopratsoli saattaa estää näitä ja muita vastaavia lääkeitä vaikuttamasta kunnolla.
- Varfariini ja fenoprokumoni, jotka vaikuttavat veren hyytymiseen. Sinulle on ehkä tehtävä lisätutkimuksia.
- Atatsanaviiri (käytetään HIV-infektion hoitoon) (ks. kohta 2 Varoitukset ja varotoimet).
- Metotreksaatti (käytetään nivereuman, psoriaasin ja syövän hoitoon), sillä pantopratsoli voi suurentaa veren metotreksaattipitoisuutta.
- Fluvoksamiinia (käytetään masennuksen ja muiden psykkisten vaivojen hoitoon), sillä lääkärin on mahdollisesti pienennettävä annostasi.
- Rifampisiinia (infektioiden hoitoon).
- Mäkikuismaa (*Hypericum perforatum*; käytetään lievän masennuksen hoitoon).

Raskaus ja imetyks

Ei ole olemassa tarkkoja tietoja pantopratsolin käytöstä raskaana oleville naisille. Valmisteen on raportoitu erityvän äidinmaitoon. Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Käytä tätä läkettä vain siinä tapauksessa, että lääkärisi arvioi hoidosta sinulle koituvan hyödyn suuremmaksi kuin mahdollisen riskin syntymättömälle lapselle tai vauvalle.

Ajamineen ja koneiden käyttö

Jos sinulle tulee haittavaikutuksia, kuten huimausta ja näköhäiriötä, älä aja autoa äläkä käytä koneita.

Lääke voi heikentää kykyä kuljettaa moottoriajoneuvoa tai tehdä tarkkaa keskittymistä vaativia tehtäviä. On omalla vastuullasi arvioda, pystykö näihin tehtäviin lääkehoidon aikana. Lääkkeen vaikutuksia ja haittavaikutuksia on kuvattu muissa kappaleissa. Lue koko pakkausseloste opastukseksesi. Keskustele lääkärin tai apteekkienhenkilökunnan kanssa, jos olet epävarma.

Pantoprazol Viatris sisältää natriumia

Tämä lääkevalmiste sisältää alle 1 mmol natriumia (23 mg) per tabletti eli sen voidaan sanoa olevan "natriumiton".

3. Miten Pantoprazol Viatris -enterotabletteja käytetään

Käytä tätä läkettä juuri siten kuin lääkäri on määränyt tai apteekkienhenkilökunta on neuvonut. Tarkista ohjeet lääkärltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Milloin ja miten Pantoprazol Viatris -enterotabletteja otetaan?

Ota tabletti 1 tunti ennen ateriaa. Älä pureskele tai murskaa tablettia vaan niele se kokonaisenä veden kera.

Ellei lääkärisi toisin määrää, suositeltu annos on:

Aikuisille ja vähintään 12-vuotiaalle nuorille:

Ruokatorven refluksitulehduksen hoitoon

Suositeltu annos on yksi tabletti vuorokaudessa. Lääkärisi voi kaksinkertaistaa annoksen ja voit tällöin ottaa 2 tablettia vuorokaudessa. Refluksitulehduksen hoitojakso on tavallisesti 4-8 viikkoa. Lääkäri kertoo, kuinka pitkään lääkkeen käyttöä pitää jatkaa.

Aikuisille:

Lääkettä käytetään yhdessä antimikrobilääkyksen kanssa potilailla, joiden pohjukaissuoli ja mahahaavatautiin liittyy *Helicobacter pylori* -bakteeri (häätöhoito).

Yksi tabletti 2 kertaa vuorokaudessa ja lisäksi kahta antimikrobilääkettä, joko amoksisiiliinia, klaritromysiiniä tai metronidatsolia (tai tinidatsolia). Yhdistelmähoidossa otetaan kahta antimikrobilääkettä kaksi kertaa päivässä pantopratsolitabletin kanssa. Ota ensimmäinen pantopratsolitabletti tuntia ennen aamiaista ja toinen pantopratsolitabletti tuntia ennen ilta-ateriaa. Noudata lääkärin antamia ohjeita ja varmista, että luet antimikrobilääkkeiden pakkausselosteet. Tavallinen hoitojakso on 1-2 viikkoa.

Maha- ja pohjukaissuolihaavan hoito.

Suositeltu annos on yksi tabletti päivässä. Lääkärisi voi kaksinkertaistaa annoksen. Lääkäri kertoo, kuinka pitkään lääkkeen käyttöä pitää jatkaa. Mahahaavan hoitojakso on yleensä 4-8 viikkoa. Pohjukaissuolihaavan hoitojakso on yleensä 2-4 viikkoa.

Zollinger-Ellisonin oireyhtymän pitkääikainen hoito ja muut tautitilit, joissa mahahappoa erittyy liikaa.

Suositeltu aloitusannos on tavallisesti 2 tablettia vuorokaudessa.

Ota 2 tablettia tunti ennen ateriaa. Lääkärisi voi myöhemmin säätää annostasi riippuen mahahapon erityksen määristä. Jos annos on enemmän kuin 2 tablettia vuorokaudessa, se on jaettava kahteen annokseen vuorokaudessa.

Jos lääkärisi määrää annokseksi enemmän kuin 4 tablettia vuorokaudessa, saat tarkat ohjeet siitä, milloin lääkkeen käyttö lopetetaan.

Erityiset potilasryhmät:

- Jos sinulla on munuaisvaivoja, keskivaikeita tai vaikeita maksavaivoja et saa käyttää pantoprotsolia *Helicobacter pylori* häätöhoitoon.
- Jos sinulla on vakavia maksavaivoja, ota enintään yksi 20 mg Pantoprazol Viatris -tabletti vuorokaudessa (pantoprotsolia on saatavilla 20 mg tabletteina).
- Alle 12-vuotiaat lapset: Näitä tabletteja ei suositella alle 12-vuotiaille lapsille.

Jos otat enemmän Pantoprazol Viatris -enterotabletteja kuin sinun pitäisi

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut läkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111) riskin arvioimiseksi ja lisähjeiden saamiseksi.

Yliannostus ei aiheuta mitään tunnettuja oireita.

Jos unohtat ottaa Pantoprazol Viatris -enterotabletteja

Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen. Ota seuraava annos normaalisti tavanomaiseen aikaan.

Jos lopetat Pantoprazol Viatris -enterotablettien käytön

Älä lopeta lääkitystä keskustelematta siitä ensin lääkärin tai apteekkienkilökunnan kanssa.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkienkilökunnan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Jos sinulle tulee joitakin alla mainituista haittavaikutuksista, lopeta tablettien käyttö ja kerro asiasta lääkärille välittömästi tai ota yhteyttä lähimmän sairaalan päivystyspoliklinikkaan:

Harvinaiset (voi esiintyä enintään 1 henkilöllä 1 000:sta):

- **Vakavat allergiset reaktiot:** kielen tai nielun turvotus, nielemisvaikeus, nokkosihottuma, hengitysvaikeudet, allerginen kasvojen turvotus (Quincken edeema/angioedeema), vaikea heitehuimaus, johon liittyy hyvin nopea sydämensyke ja runsasta hikoilua.
- valko- ja punasolujen ja/tai verihiualeiden määrään väheneminen, joka voidaan todeta verikokeissa. Tämä voi aiheuttaa, että saat tavallista helpommin tulehduksia tai mustelia ja verenvuotoja.

Esiintymistihleys tuntematon (saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin):

- **Vakavat ihovaivat:** ihorakkulat ja yleistilan nopea heikkeneminen, silmien, nenän, suun/huulten tai sukupuolielinten pinnalliset haavaumat (myös lievä verenvuoto) (Stevens-Johnson oireyhtymä, Lyellin oireyhtymä, erythema multiforme), ihottuma sekä mahdollinen siihen liittyvä nivelpipu ja valoyliherkkyyts.
- **Muita vakavia tiloja:** ihmisen ja silmänvalkuisten keltaisuus (vakava maksasolujen vaurio, keltatauti) tai kuume, ihottuma ja munuaisten suureneminen, johon joskus liittyy virtsaamiskipua ja alaselkäkipua (vakava munuaistulehdus, joka voi johtaa munuaisten vajaatoimintaan). Paksusuolen tulehdus, joka aiheuttaa jatkuvaan vetistä ripulia.

Jos käytät pantoprotsolia yli kolmen kuukauden ajan, on mahdollista, että veren magnesiumpitoisuus laskee. Matala magnesiumpitoisuus voi aiheuttaa väsymystä, tahattomia lihassupistuksia, ajan ja paikan tajun hämärtymistä, kouristelua, huimausta ja sydämen sykkeen nousua. Ota pikaisesti yhteyttä lääkäriin, jos sinulla esiintyy jokin näistä oireista. Matala veren magnesiumpitoisuus voi myös pienentää veren kalium- ja kalsiumpitoisuksia. Lääkäri arvioi tarvitseeko magnesiumpitoisuutta seurata verikokeilla.

Muita haittavaikutuksia:

- **Yleiset (voi esiintyä enintään 1 henkilöllä 10:stä):**

- mahalaukun hyväntaatuiset polyypit
- **Melko harvinaiset** (voi esiintyä enintään 1 henkilöllä 100:sta):

päänsärky, heitehuimaus, ripuli, pahoinvohti, oksentelu, vatsan turpoaminen ja ilmavaivat, ummetus, suun kuivuminen, kipu ja epämukava tunne vatsassa, ihottuma, rokkoihottuma, ihottuman puhkeaminen, kutina, heikotuksen, uupumukseen tai yleisen huonovointisuuden tunne, unihäiriöt, lonkka-, ranne- tai selkärankamurtuma
 - **Harvinaiset** (voi esiintyä enintään 1 henkilöllä 1 000:sta):

makuaistin muutokset tai häviäminen, näköhäiriöt, kuten näön hämärtyminen, nokkosihottuma, nivelkipu, lihaskipu, painon muutokset, lämmönnousu, turvotus raajoissa (ääreisturvotus), masennus, rintojen suureneminen miehillä
 - **Esiintymistihesys tuntematon** (saatavissa oleva tieto ei riitä arvointiin):

hallusinaatiot, sekavuus (erityisesti jos potilaalla on ollut aiemmin näitä oireita), pistely.

Verikokeissa todettuja haittavaikutuksia:

- **Melko harvinaiset** (voi esiintyä enintään 1 henkilöllä 100:sta):

maksaaentsyyymiарvojen suureneminen
- **Harvinaiset** (voi esiintyä enintään 1 henkilöllä 1 000:sta):

bilirubiiniarvon suureneminen, veren rasva-arvon suureneminen
- **Esiintymistihesys tuntematon** (saatavissa oleva tieto ei riitä arvointiin):

natriumin määrän väheneminen veressä.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkäriille tai apteekkienhenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 Fimea

5. Pantoprazol Viatris -enterotablettien säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä pakkaussessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (EXP) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Läpipainopakkaus: Tämä lääkevalmiste ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita.

Tablettipurkki: Käytä avatun tablettipurkin sisältö 100 vuorokauden kuluessa. Pidä pakkaus tiukasti suljettuna. Herkkä kosteudelle.

Lääkkeitä ei pidä heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Nämä menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Pantoprazol Viatris sisältää

- Vaikuttava aine on pantopratsolinatriumseskvihydraatti vastaten 40 mg pantoprotsolia.
- Muut aineet ovat natriumkarbonaatti, mannitoli, krospovidoni, povidoni ja kalsiumstearaatti. Päälysteen aineet ovat metakryylihappo-etyyliakryylaattikopolymeeri (1:1), natriumlauryllisulfaatti, polysorbaatti 80, trietyylisitraatti, hypromelloosi, titaanidioksidi, makrogoli 400 ja keltainen rautaoksidi.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Tabletti on banaaninkeltainen, päälystetty, soikea (noin 5,7 mm x 11,6 mm) ja kaksoiskupera eikä sen kummallakaan puolella ole merkintöjä. Pantoprazol Viatris -tabletteja on saatavilla muovipurkeissa ja läpipainopakkauksissa.

Tablettipurkki on valkoinen HDPE-purkki, jossa on kierrekorkki. Tablettipurkit sisältävät 14, 28, 30, 50, 56, 60, 90, 98, 100 tai 250 enterotablettia. Tablettipurkissa on lisäksi pieni muovinen silikageeliä sisältävä kapseli tai silikageeliä ja aktiivihiiltä sisältävä pussi, joka suojaa tabletteja kosteudelta. Tätä kapselia tai pussia ei saa niellä tai poistaa purkista.

Pahvikoteloa sisältää alumiiniset läpipainoliuskat, joissa voi olla kuivatusainekerros.

Läpipainopakkaukset sisältävät 7, 7 x 1, 14, 14 x 1, 28, 28 x 1, 30, 56, 70, 70 x 1, 96 tai 98 enterotablettia.

Kaikkia pakkauskokoja ei vältämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Myyntiluvan haltija:

Viatris Limited
Damastown Industrial Park
Mulhuddart
Dublin 15
DUBLIN
Irlanti

Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan
haltijan paikallinen edustaja:

Viatris Oy
infofi@viatris.com

Valmistaja:

Gerard Laboratories, 35/36, Baldoyle Industrial Estate, Grange Road, Dublin 13, Irlanti

Mylan Hungary Kft, H-2900 Komarom, Mylan utca 1, Unkari

**Mylan Germany GmbH, Zweigniederlassung Bad Homburg v. d. Höhe,
Benzstrasse 1, 61352 Bad Homburg v. d. Höhe, Saksa**

Logiters, Logistica Portugal, S.A.
Estrada dos Arneiros, 4, Azambuja, 2050-306, Portugali

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 3.11.2023.

Bipacksedel: Information till patienten

Pantoprazol Viatris 40 mg enterotabletter pantoprazol

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.
- Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.
- Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad Pantoprazol Viatris är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du tar Pantoprazol Viatris
3. Hur du tar Pantoprazol Viatris
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Pantoprazol Viatris ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Pantoprazol Viatris är och vad det används för

Pantoprazol Viatris är en ”selektiv protonpumpshämmare” som minskar mängden syra som bildas i din magsäck. Det används för behandling av syra-relaterade sjukdomar i magsäck och tarm.

Pantoprazol Viatris används för behandling av:

Vuxna och barn över 12 år:

- refluxesofagit. En inflammation i matstruppen åtföljt av sura uppstötningar.

Vuxna:

- infektion orsakad av bakterien *Helicobacter pylori* hos patienter med sår i tolvfingertarm och magsäck i kombination med två antibiotika (utrotningsterapi). Syftet är att få bort bakterien och på så sätt minska risken för att såren ska återkomma.
- sår i magsäcken och tolvfingertarmen.
- Zollinger-Ellisons syndrom och andra tillstånd med för mycket syra i magsäcken.

Pantoprazol som finns i Pantoprazol Viatris kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2. Vad du behöver veta innan du tar Pantoprazol Viatris

Ta inte Pantoprazol Viatris:

- om du är allergisk mot pantoprazol eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).
- om du är allergisk mot andra läkemedel som innehåller protonpumpshämmare.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Pantoprazol Viatris:

- om du har allvarliga leverproblem. Tala om för din läkare om du någonsin har haft problem med din lever. Din läkare kommer då att kontrollera dina leverenzymers oftare, särskilt om du tar pantoprazol som långtidsbehandling. Om leverenzymerna ökar ska behandlingen avbrytas.

- om du har minskad möjlighet att lagra vitamin B12 i kroppen eller riskfaktorer för minskad vitamin B12 och får pantoprazol som långtidsbehandling. Som med alla läkemedel som minskar syramängden kan pantoprazol leda till minskad absorption av vitamin B12.
- om du samtidigt med pantoprazol tar ett läkemedel som innehåller atazanavir (för behandling av HIV-infektion) bör du tala med din läkare för särskild rådgivning.
- om du någonsin har fått en hudreaktion efter behandling med ett läkemedel liknande Pantoprazol Viatris som minskar magsyran.
- om du ska genomgå en specifik blodprovstagning (kromogranin A).

Ta omedelbart kontakt med din läkare om du märker något av följande symtom:

- oavsiktlig viktminkning
- upprepade kräkningar
- svårighet att svälja
- blodiga kräkningar
- du ser blek ut och känner dig svag (blodbrist)
- du noterar blod i avföringen
- allvarlig och/eller ihållande diarré, då man funnit ett samband mellan pantoprazol och en liten ökning av smittsam diarré.

Om du får hudutslag, särskilt i områden som utsätts för sol, ska du tala om det för din läkare så snart som möjligt eftersom du kan behöva avbryta behandlingen med Pantoprazol Viatris. Kom även ihåg att nämna eventuella andra biverkningar, såsom ledsmärta.

Din läkare kan besluta att du behöver genomgå några undersökningar för att utesluta allvarlig sjukdom eftersom pantoprazol också kan lindra symtom på cancer och skulle kunna försena en sådan diagnos. Om dina symtom kvarstår trots din behandling ska ytterligare undersökningar övervägas.

Om du tar pantoprazol som långtidsbehandling (längre än 1 år) kommer din läkare troligen att kalla dig till regelbundna kontroller. Du ska berätta för din läkare om nya och ovanliga symtom och sjukdomshändelser.

Användning av protonpumpshämmare som pantoprazol och särskilt om du använder pantoprazol i mer än ett år, kan öka risken något för att få höft-, handleds- eller kotfraktur (benbrott). Berätta för läkare om du har benskörhet (osteoporos) eller om du använder läkemedel som kallas kortikosteroider eftersom de kan öka risken för benskörhet.

Andra läkemedel och Pantoprazol Viatris

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel eftersom Pantoprazol Viatris kan påverka effekten av dessa.

- Läkemedel såsom ketokonazol, itrakonazol och posakonazol (för behandling av svampinfektioner) eller erlotinib (för behandling av vissa typer av cancer) eftersom pantoprazol kan orsaka att andra liknande läkemedel inte fungerar som de ska.
- Warfarin och fenprocumon som påverkar blodets konsistens. Du kan behöva ytterligare kontroller.
- Atazanavir (för behandling av HIV-infektion) (se avsnitt 2 Varningar och försiktighet).
- Metotrexat (för behandling av reumatoid artrit, psoriasis och cancer) eftersom pantoprazol kan öka nivåerna av metotrexat i blodet.
- Fluvoxamin (för behandling av depression och andra psykiatiska sjukdomar). Om du tar fluvoxamin kan din läkare minska dosen.
- Rifampicin (för behandling av infektioner).
- Johannesört (*Hypericum perforatum*) (för behandling av lindrig depression).

Graviditet och amning

Det finns inga data från användning av pantoprazol på gravida kvinnor. Utsöndring i bröstmjölk har rapporterats. Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Du ska bara använda detta läkemedel om din läkare anser att fördelarna för dig överväger riskerna för fostret eller babyn.

Körförstånd och användning av maskiner

Om du upplever biverkningar som yrsel och synstörningar ska du inte köra bil eller använda maskiner.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förstånd i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Pantoprazol Viatris innehåller natrium

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per tablett, d.v.s. är näst intill ”natriumfritt”.

3. Hur du tar Pantoprazol Viatris

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

När och hur ska du ta Pantoprazol Viatris?

Ta medicinen en timme före en måltid utan att tugga eller krossa tabletten. Svälj tabletten hel med lite vatten.

Om din läkare inte meddelat något annat så är rekommenderad dos:

Vuxna och ungdomar över 12 år:

För behandling av refluxesofagit:

Rekommenderad dos är en tablett dagligen. Din läkare kan dubbla din dos till två tabletter per dag. Behandlingsperioden för refluxesofagit är vanligtvis 4 till 8 veckor. Din läkare kommer att informera dig om hur länge du ska ta medicinen.

Vuxna:

För behandling av en infektion orsakad av bakterien *Helicobacter pylori* hos patienter med sår i tolvfingertarm eller magsäck i kombination med två antibiotika (utrotningsterapi):

En tablett två gånger per dag plus två antibiotikatabletter av endera amoxicillin, klaritromycin, metronidazol (eller tinidazol), som ska tas två gånger per dag med pantoprazoltablett. Ta första pantoprazoltablett den timme före frukost och den andra pantoprazoltablett den timme före kvällsmaten. Följ läkarens instruktioner och läs bipacksdelnarna för dessa antibiotika.

Vanlig behandlingstid är en till två veckor.

För behandling av sår i tolvfingertarm och magsäck:

Rekommenderad dos är en tablett dagligen. Dosen kan dubblas, efter instruktioner från din läkare. Din läkare kommer att informera dig om hur länge du ska ta medicinen. Vanligtvis behandlas sår i magsäcken under 4 till 8 veckor och sår i tolvfingertarmen under 2 till 4 veckor.

För långtidsbehandling av Zollinger-Ellisons syndrom och andra tillstånd där för mycket syra bildas i magsäcken:

Rekommenderad startdos är vanligtvis två tabletter dagligen.

Ta de två tabletterna en timme före en måltid. Din läkare kan senare ändra dosen beroende på hur mycket syra som bildas i magsäcken. Om du ska ta fler än två tabletter dagligen ska dessa tas två gånger per dag.

Om din läkare skriver ut en dosering på mer än fyra tabletter per dag ska du få instruktioner om exakt när du ska sluta ta medicinen.

Särskilda patientgrupper:

- Om du har njurproblem eller måttliga eller allvarliga leverproblem ska du inte ta pantoprazol mot *Helicobacter pylori*.

- Om du har allvarliga leverproblem ska du inte ta mer än en tablett 20 mg pantoprazol dagligen (det finns tablettor med 20 mg pantoprazol).
- Barn under 12 år: Dessa tablettor rekommenderas inte till barn under 12 år.

Om du har tagit för stor mängd av Pantoprazol Viatris

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (i Sverige tel. 112, i Finland tel. 0800 147 111) för bedömning av risken samt rådgivning.

Det finns inga kända symtom på överdosering.

Om du har glömt att ta Pantoprazol Viatris

Ta inte dubbeldos för att kompensera för glömd dos. Ta nästa dos som vanligt.

Om du slutar att ta Pantoprazol Viatris

Sluta inte att ta medicinen utan att först diskutera med läkare eller apotekspersonal.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Om du får någon av följande biverkningar ska du sluta ta tabletterna och omedelbart meddela din läkare eller ta kontakt med akutmottagningen på närmaste sjukhus:

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare):

- **Allvarlig allergisk reaktion:** svullnad av tunga och/eller hals, svårighet att svälja, nässelutslag, andningssvårigheter, allergisk ansiktssvullnad (Quinckes ödem/angioödem), svår yrsel med mycket snabba hjärtslag och kraftig svettning.
- En minskning av antalet vita och röda blodkroppar och/eller blodplättar, som kan ses vid blodprov. Du kan lägga märke till en ökad förekomst av infektioner, eller att du får fler blåmärken eller blöder mer än normalt.

Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):

- **Allvarliga hudreaktioner:** blåsbildning i huden och snabb försämring av ditt allmäntillstånd, ytliga sår (med lätt blödning) i ögon, näsa, mun/läppar eller könsorgan (Stevens-Johnsons syndrom, Lyells syndrom, erytema multiforme), hudutslag, eventuellt med smärta i lederna och ljuskänslighet.
- **Andra allvarliga tillstånd:** gulfärgning av hud eller ögonvitor (allvarlig skada av leverceller, gulrot) eller feber, utslag och förstorade njurar ibland med smärta i samband med urintömning och värk i nedre delen av ryggen (allvarlig njurinflammation som kan leda till njursvikt). Inflammation i tjocktarmen, som ger upphov till ihållande vattnig diarré.

Om du använder pantoprazol i mer än tre månader kan magnesiumnivåerna i blodet sjunka. Låga nivåer av magnesium kan visa sig som trötthet, ofrivilliga muskelrörelser, tillstånd av oklarhet i tid och rum, kramper, yrsel och snabb hjärtrytm. Om du får något av dessa symtom, kontakta läkare omedelbart. Låga nivåer av magnesium kan också leda till minskade nivåer av kalium eller kalcium i blodet. Läkaren kan komma att mäta magnesiumnivån i blodet med hjälp av regelbundna blodprov.

Andra biverkningar är:

- **Vanliga** (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):
 - godartade polyper i magsäcken.
- **Mindre vanliga** (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

- huvudvärk, yrsel, diarré, illamående, kräkningar, väderspänning, förstopning, muntrorrhett, smärta och obehag i magen, hudutslag, nässelutslag, utbrott av hudutslag, klåda, känsla av svaghet, matthet eller allmän sjukdomskänsla, sömnbesvär, höft-, handleds- eller kotfrakturer.
- **Sällsynta** (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare): förändrat smaksinne eller total smakförlust, synstörningar som dimsyn, nässelfeber, ledvärk, muskelvärk, viktförändringar, förhöjd kroppstemperatur, svullnad av armar och ben (perifera ödem), depression, förstorade bröst hos män.
 - **Har rapporterats** (förekommer hos ett okänt antal användare): hallucinationer, förvirring (särskilt hos patienter som tidigare haft sådana symtom), stickningar och domningar.

Biverkningar som identifieras med blodprov:

- **Mindre vanliga** (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare): högre nivåer av leverenzymer
- **Sällsynta** (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare): ökning av bilirubin, högre nivåer av blodfetter
- **Har rapporterats** (förekommer hos ett okänt antal användare): minskad natriumhalt i blodet

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen

webbplats: www.fimea.fi

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea

Biverkningsregistret

PB 55

00034 Fimea

5. Hur Pantoprazol Viatris ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen och förpackningen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

För blister: Inga särskilda förvaringsanvisningar.

För plastburk: Innehållet i öppnade plastburkar ska förbrukas inom 100 dagar. Tillslut burken väl.

Fuktkänsligt.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

- Den aktiva substansen är pantoprazolnatriumsesquihydrat motsvarande 40 mg pantoprazol.
- Övriga innehållsämnen är natriumkarbonat,mannitol,krospovidon,povidon och kalciumstearat. Tabletdrageringen innehåller metakrylsyra-etylakrylatsampolymer (1:1), natriumlaurilsulfat, polysorbat 80, trietylcitrat, hypromellos, titandioxid, makrogol 400 och gul järnoxid.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Tabletterna är banangula, filmdragerade, avlånga, cirka 5,7 mm x 11,6 mm, bikonvexa och omärkta. Pantoprazol Viatris finns tillgängligt i plastburkar och blisterförpackningar.

Plastburkar av HDPE med skruvlock innehållande 14, 28, 30, 50, 56, 60, 90, 98, 100 och 250 enterotabletter. Burken innehåller även en liten plastbehållare med kiselgel, eller en påse med kiselgel och aktivt kol, som skyddar tabletterna mot fukt. Behållaren eller påsen kan inte ätas och bör inte avlägsnas från burken.

Kartonger med blisterförpackningar av aluminium med eller utan ett lager av torkmedel innehållande 7, 7 x 1, 14, 14 x 1, 28, 28 x 1, 30, 56, 70, 70 x 1, 96 och 98 enterotabletter.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning:

Viatris Limited
Damastown Industrial Park
Mulhuddart
Dublin 15
DUBLIN
Irland

För ytterligare upplysningar om detta läkemedel, kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning:

Viatris Oy
infofi@viatris.com

Tillverkare:

Gerard Laboratories, 35/36, Baldoyle Industrial Estate, Grange Road, Dublin 13, Irland.

Mylan Hungary Kft, H-2900 Komarom, Mylan utca 1, Ungern

**Mylan Germany GmbH, Zweigniederlassung Bad Homburg v. d. Höhe,
Benzstrasse 1, 61352 Bad Homburg v. d. Höhe, Tyskland**

Logiters, Logistica Portugal, S.A.
Estrada dos Arneiros, 4, Azambuja, 2050-306, Portugal

Denna bipacksedel ändrades senast 3.11.2023.