

ZIVEREL™-liuos on tarkoitettu nieltäväksi

KÄYTTÖAIHEET: Ruokatorven limakalvon suojaavaan hoitoon. Helpottaa limakalvon parantumista ja lievittää oireita, kuten polttelua ja kipua. Ziverel on lääkinällinen tarvike, joka tarjoaa nopean lievityksen ruokatorven refluksitautin oireisiin, kuten närästyksen, ylävatsan kipuihin, hapon nousemiseen ruokatorveen, ärsytysyskään ja äänihäiriöihin.

Ruokatorven refluksitauti (GERD) on yleisin ruokatorven limakalvosairaus.

GERD:lle tunnusomaisia ovat tietyt oireet (kuten närästys, hapon nouseminen ruokatorveen, ärsytysyskä ja äänihäiriöt), jotka voivat ilmetä yhdessä ruokatorven limakalvon eroiivisten tulehdusvaurioiden kanssa.

Refluksitauti tavallisesti pahenee makuulla, joten oireet saattavat tuntua voimakkaammin öisin.

Ziverel on hyaluronihapon ja kondroitiinisulfaatin yhdistelmä, jotka yhdessä tarjoavat mekanismin ruokatorven limakalvon suojaamiseen ja sen parantumisen edistämiseen.

Limakalvolle hyvin kiinnittyvän eli bioadhesiivisen ainesosan (poloksameeri 407) ansiosta Ziverel valmiste mahdollistaa hyaluronihapon ja kondroitiinisulfaatin pysymisen ruokatorven seinämässä ja vaikuttaa osaltaan suojaavasti vatsan erittämän suolahapon ja pepsiinin vaikutuksia vastaan.

Kondroitiinisulfaatilla on myös ruokatorven limakalvojen paranemisprosessia edistävä vaikutus.

KOOSTUMUS/AINESOSAT: Hyaluronihapon natriumsuola, natriumkondroitiinisulfaatti, polyvinyylipyrrolidoni, ksylitoli C, natriumbentsoaatti, kaliumsorbaatti, aromi, vesi ja poloksameeri 407.

PAKKAUS: 14 tai 20 kpl 10 ml:n annospussia otettavaksi suun kautta. Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

ANNOSTUS JA KÄYTTÖOHJEET: Ota yhden annospussin sisältö jokaisen aterian jälkeen ja ennen nukkumaanmenoa tai terveydenhuollon ammattilaisen antamien ohjeiden mukaisesti.

VASTA-AIHEET: Erityisiä vasta-aiheita ei ole. Jos olet herkistynyt jollekin tuotteen aineosalle, lopeta tuotteen käyttö ja ota yhteyttä terveydenhuollon ammattilaiseen. Vaikka tunnettuja haittavaikutuksia ei ole, tätä tuotetta ei tule käyttää raskauden aikana tai ensimmäisten imetykskuukausien aikana. On aina suositeltavaa keskustella aiheesta terveydenhuollon ammattilaisen kanssa ennen käyttöä.

VAROITUKSET: Älä ylitä suositeltua annosta. Jos oireet pitkittyvät, ota yhteyttä terveydenhuollon ammattilaiseen. Älä käytä tuotetta pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Säilytä tuote viileässä, kuivassa paikassa. Älä säilytä lämmönlähteiden läheisyydessä. Älä pakasta. Säilytä tuote poissa lasten näkyviltä ja ulottuvilta.



APHARM s.r.l. Via Roma, 26 28041 Arona - IT

Jakelija: Norgine Danmark A/S,
Lyskær 1, 3., 2730 Herlev, Tanska



Tarkistus 01, päivätty toukokuu 2017.