

## Utipro® PLUS

### SE

#### Avsedd användning

UrinCUR - Utipro® Plus är avsedd att användas för att behandla och förebygga urinvägsinfektioner orsakade av patogener som E. coli och andra gramnegativa bakterier som kan orsaka urologiska infektioner.

Medlet, som baseras på Xyloglucan (hemicellulosa) och gelatin, verkar mekaniskt i tarmen så att kontakt mellan patogener och tarmens slemhinna förhindras, vilket är det första steget vid spridning av bakterier till urinvägarna.

UrinCUR - Utipro® Plus ska tas oralt från att de första symptomen på urinvägsinfektion visar sig för att minska spridningen av patogener, vilket kan leda till en infektion. UrinCUR - Utipro® Plus är även avsedd att förhindra nya urinvägsinfektioner orsakade av upprepad patogenspridning.

#### Beskrivning

Blisterförpackning som innehåller 15 eller 30 kapslar.

#### Innehåll

Varje kapsel innehåller: 100 mg Xyloglucan, 50 mg gelatin (från gris), 100 mg propolis, 100 mg Hibiscus sabdariffa, kiseloxid, magnesiumstearat (vegetabiliskt ursprung) och majsstärkelse.

#### Bruksanvisning

Svälj kapseln med vätska.

#### Dosering

Hos patienter som uppvisar de första urinvägssymptomen ska UrinCUR - Utipro® Plus tas oralt i form av 2 kapslar per dag (1 kapsel var 12:e timme) under fem dagar.

För att förhindra återkommande infektioner ska en kapsel per dag tas under minst 15 dagar i följd per månad. Behandlingen kan upprepas vid behov.

#### Varningar

- Diagnos på urinvägsinfektion ska ställas av en läkare. Kontakta läkare om symptomen varar mer än 5 dagar.
- En akut urinvägsinfektion kan kräva behandling med antibiotika. Den här produkten har inga baktericida eller bakteriostatiska egenskaper och kan därför inte ersätta antibiotikabehandling. UrinCUR - Utipro® Plus kan dock ges parallellt med antibiotika.
- Det är rekommenderat att inte använda produkten under graviditet eller amning, såvida inte annat anges av läkare.
- Använd inte produkten efter utgångsdatumet som står tryckt på förpackningen.
- Använd inte produkten om blisterförpackningen har öppnats eller är skadad.
- Förvaras vid högst 25 °C. Får inte förvaras i frysd.
- Förvaras utom räckhåll för barn.

#### Kontraindikationer

UrinCUR - Utipro® Plus får inte användas av patienter med känd överkänslighet mot Xyloglucan, gelatin eller någon annan av produktens ingredienser.

### FI

#### Käyttötarkoitus

UrinCUR - Utipro® Plus on tarkoitettu tavallisesti urologisten infektioiden etiologiaan liittyvien E. colin ja muiden gramnegatiivisten bakteerien kaltaisten patogeneien aiheuttamien virtsatieinfektioiden hallintaan ja ehkäisyyn.

Ksyloglukaaniin (hemiselluloosa) ja gelatiiniin perustuva yhdiste vaikuttaa mekaanisesti suoliston ontelossa välttämällä patogeneien kontaktia suoliston limakalvojen kanssa, mikä on niiden leviämisen ja myöhemmän virtateihin siirtymisen ensimmäinen vaihe.

UrinCUR - Utipro® Plus otetaan oraalisesti virtsateiden häiriöiden ensimmäisten oireiden ilmenemisestä lähtien. Tavoitteena on sellaisten patogeneien leviämisen vähentäminen, jotka saattavat johtaa infektiioihin. Toistuvien infektioiden kohdalla UrinCUR - Utipro® on tarkoitettu myös uusien episodien ehkäisyyn, kun patogenein leviäminen aiheuttaa toistuvia virtsatieinfektioita.

#### Tarjontamuoto

15 tai 30 kapselia sisältävä läpipainopakkaus.

#### Koostumus

Jokainen kapseli sisältää: 100 mg ksyloglukaania, 50 mg gelatiinia (peräisin siasta), 100 mg propolista, 100 mg teehibiskusta, silikonidioksidia, magnesiumstearaattia (kasvipäriäinen) ja maissitärkkelystä.

#### Käyttöohjeet

Niele nesteitä sisältävä kapseli.

#### Annostus

Potilailla, joilla ilmenee ensimmäisiä virtsaamiseen liittyviä epämuokavuudentunteita, UrinCUR - Utipro® -valmistetta on otettava oraalisesti 2 kapselia vuorokaudessa (1 kapseli 12 tunnin välein) viiden vuorokauden ajan.

Infektion toistumisen ehkäisemiseksi on otettava vuorokaudessa yksi kapseli vähintään 15 perättäisen vuorokauden ajan kuukaudessa. Hoito voidaan tarvittaessa toistaa.

#### Varoituksia

- Lääkärin on diagnosoitava virtsatieinfektio (VTI). Jos oireet jatkuvat yli viisi päivää, ota yhteys lääkäriisi.
- Akuutti VTI saattaa edellyttää antibioottihoidoa. Tällä tuotteella ei ole bakterisidisiä tai bakteriostaattisia ominaisuuksia eikä näin ollen voi korvata antibioottihoidoa. UrinCUR - Utipro® -valmistetta voidaan kuitenkin antaa samanaikaisesti antibioottien kanssa.
- Vaikka tunnettuja sivuvaikutuksia ei ole, on suositeltavaa, että tuotetta ei käytetä raskauden tai imetyksen aikana, ellei terveydenhoitoalan ammattilainen muuta neuvo.
- Älä käytä tuotetta pakkaukseen painetun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen.
- Älä käytä tuotetta, jos läpipainopakkaus on avattu tai vahingoittunut.
- Säilytä alle 25 °C:ssa. Älä pakasta.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.

#### Kontraindikaatiot

UrinCUR - Utipro® -valmistetta ei saa käyttää potilailla, joilla on tunnettu yliherkkyys ksyloglukaanille, gelatiinille tai muulle tuotteen aineosalle.